

御纂醫宗金鑑

竹部

卷四十一



御纂醫宗金鑑卷四十一

編輯雜病心法要訣目錄

神病

癲狂癇

諸氣

遺精

赤白濁帶

痰飲

欬嗽

喘急哮吼



北京中医药大学图书馆版权所有

行氣  
脹滿水腫



北京中医药大学图书馆版权所有  
1951

御纂醫宗金鑑卷四十一

編輯雜病心法要訣

神之名義

形之精粹處名心中含良性本天眞天眞一氣精神神是精  
今用是神

註動植之物一有其形則形之至精至粹之處。名曰心。動  
物之心者形若垂蓮中含天之所賦虛靈不昧之靈性也。  
植物之心者卽中心之芽中含天之所賦生生不已之生  
意也。此形若無此心則形無主宰而良性生意亦無着落  
矣。此心若無更無生意則心無所施用不過是一團死肉。

一枯草木之芽耳。蓋人雖動物之貴，而其中含良性與一切動物皆同。本乎天真也。天真之氣分而言之，爲精氣神。故曰以精爲體，以神爲用也。合而言之，渾然一氣，故曰天眞一氣精神之祖也。

### 神之變化

神從精氣妙含有。隨神往來，魂陽靈並精出。人陰靈魄，意是心機動未形。意之所專，謂之志。志之動變乃思名。以思謀遠，是爲慮。用慮處物，智因生。

註：魂陽之靈隨神往來，魄陰之靈並精出人。蓋神機不離乎精氣，亦不離乎精氣。故曰妙合而有也。故指神而言，則神

超乎精氣之外。指精氣而言。則神寓乎精氣之中。意者。心之機動。而未形之謂也。志者。意所專注也。思者。志之變動也。慮者。以思謀遠之謂也。智者。以慮處物之謂也。此皆識神變化之用也。

### 五藏神情

心藏神。兮脾意智。肺魄。肝魂。腎志。精氣和。志達。生喜笑。氣暴志。憤恚怒生。憂思繫心。不解散。悲哀苦悽然。情內生懼。恐求人伴。外觸駭。然響動驚。

註五藏所藏七神。心藏神。脾藏意與智。肺藏魄。肝藏魂。腎藏精與志也。五藏所生七情。心生喜。肝生怒。脾生憂。思。肺生

悲。腎生恐也。氣和則志達。故生喜笑。氣暴則志憤。故生怒。聚心不解散。故生憂思。悽心則哀苦。故生悲哭。內觸非常事物。故生恐懼驚駭也。

### 神癆治法

#### 硃砂安神丸

內生懼恐心跳悸。悸更驚惕是怔忡。善忘前言曰健忘。如昏似慧恍惚名失志。傷神心膽弱。痰飲九氣火相乘。清熱硃連歸地草。餘病他門治法精。

註驚悸怔忡。健忘。恍惚失志。傷神等病。皆因心虛膽弱。諸邪得以乘之也。心氣熱者。先用硃砂安神丸以清之。其餘虛



實諸邪則當與虛損九氣癲癇痰飲等門。含證揀方。自有妙法之處。

仁熟散

恐畏不能獨自臥。膽虛氣怯。用仁熟。柏子仁。地榆。黃芩。枸杞子。五味子。山茱萸。桂心。人參。茯神。菊花。相爲末。老酒調服。

註

恐畏不能獨自臥者。皆因氣怯膽虛也。仁熟散。謂柏子仁。熟地黃。枸杞子。五味子。山茱萸。桂心。人參。茯神。菊花。相爲末。老酒調服也。

癲癇總括

經言癲狂本一病。狂乃陽邪。癲是陰。癲疾始發意不樂。甚則神



大英中華書局

医药大学图书馆版权所有

癲語不倫。狂怒兒狂多不臥。目直罵詈不識親。癇發吐涎。口噤  
倒抽搐。省後若平人。

註李時珍曰。經有言癲狂疾者。又言癲疾爲狂者。是癲狂二病。兼病也。邪人於陽者狂。邪人於陰者癲。蓋癲疾始發。志意不樂。甚則精神呆癡。言語不倫。而瞞如平時。以邪併於陰也。狂疾始發。多怒不臥。甚則兒狂欲殺。目直罵詈。不識親疎。而夜多不臥。以邪併於陽也。然俱不似癇疾。發則吐涎。神昏。卒倒無知。口噤牙緊。抽搐時之多少不等。而省後起居飲食。皆若平人爲別也。癇雖分而爲五。曰雞馬牛羊猪名者。以病狀偶類故也。其之痰火自驚回者而已。所以爲

治同乎癲狂也。

三聖散 青州白丸子

滾痰丸 遂心丹

礬鬱丸 控涎丹

抱膽丸 鎮心丹

癲狂癇疾三聖吐風痰白丸熱滾痰。痰實。心氣礬鬱。痰驚須用控涎丹。無痰抱膽鎮心治。發矣。百會自然安。初發皂角灌鼻內。涎多欲止點湯鹽。

註 癲狂癇疾初起多痰者先以三聖散吐之風盛有痰者用青州白丸子熱盛有痰者用礞石滾痰丸。痰而形氣實者



用遂心散。用遂砂。猪心也。夾而兼氣鬱者。用礬鬱丸。礬鬱金也。燃而兼驚者。用控涎丹。無痰神輕。因而驚。半  
用鎮心丹。抱膽丸。皆成方也。癇病發時。灸百會。不拘壯數。  
以甦爲主。再發再灸。以愈爲度。初發用皂角汁灌鼻內。其  
風涎卽從鼻口中涕唾而出。若甦後其涎不止。以鹽湯服  
之自止。

諸氣總括

寒氣

火氣

喜氣

怒氣

驚氣

思氣

悲氣

恐氣

驚氣

梅核氣

一氣觸爲九寒矣。喜怒勞思悲恐驚驚。寒收外東肢理。悶悶。氣內

蒸腠理通。喜則氣緩。虛極散。勞耗思結。氣難行。怒氣逆上。甚則血下乘脾。虛殞瀉成。恐則氣下傷精志驚。心無倚附。則氣榮衛不散布。壯行弱者病叢生。

註一氣流行。不爲邪觸。何病之有。若爲寒觸。外束皮膚。腠理閉。其氣收矣。卽兼病也。戾火也。若爲火觸。熱蒸汗出。腠理開。其氣泄矣。卽暑病也。若爲喜觸。壹則氣和。志達。其氣緩矣。素中虛極者。緩則氣散。卽暴脫也。若爲勞觸。勞則呼息且汗出。其氣耗矣。卽勞倦也。若爲思觸。心有所存。氣留不行。其氣結矣。卽鬱氣也。若爲怒觸。怒則氣逆。甚嘔血。其氣上矣。上極而不乘脾之虛。則爲飧泄也。若爲恐觸。恐則精

却傷精志其氣卜矣若爲驚觸心無所依神無所歸慮無所定其氣亂矣怔忡心動不安之病也若爲悲觸心肺氣戚樂衛不散其氣消矣凡此九氣叢生之病壯者得之一行而愈弱者得之氣著爲病也

諸氣辨證

短氣氣短不能續少氣氣少不足言氣痛走往內外痛氣鬱失志怫情間上氣氣逆蘇干降下氣氣陷補中宜臭甚復食腸胃鬱減食消導自然安

註短氣者氣短而不能續息也少氣者氣少而不能稱形也皆爲不足之證氣痛者氣爲邪阻氣道不通或在經絡或

在藏府攻衝走注疼痛也。上氣乃濁氣上逆。下氣爲清氣。  
下陷氣鬱者。或得於名利失志。或得於公私佛情。一者  
間也。濁氣上逆。蘇子降氣湯。清氣下陷。補中益氣湯。二者  
加訶子五味子。然清氣下陷。下氣不甚臭穢。惟傷食下氣  
其臭甚穢。乃腸胃鬱結。穀氣內發。而不宜通於腸胃之外。  
鬱在胃者。上噫氣也。鬱在腸者。下失氣也。補中益氣湯方。

見內傷門

諸氣治法

寒熱熱寒結者散。上抑下舉驚者平。喜以愁勝悲以喜勞溫短  
少補皆同。

註寒者熱之。麻黃理中是也。熱者寒之。白虎生鹹是也。結督  
散之。越鞠解鬱是也。上者抑之。蘇子降氣是也。下者  
補中益氣是也。驚者平之。鎮心妙香是也。喜以恐勝。以  
喜勝以情治情是也。勞者溫之。短氣少氣者補之。保元  
君是也。

### 木香流氣飲

木香流氣調諸氣。快利三焦榮衛行。達表通裏。開胸膈。腫脹喘  
嗽氣爲疼。六君丁皮沉木桂白芷香附果蘇青大黃枳朴檳蓬  
水麥冬大腹木瓜通。

註桂香統氣飲調治一切諸氣爲病。其功能快利三焦。通行

榮衛外達。未氣內通。裏氣中開。胸膈之氣。其水肺脹。

壅喘。嗽氣痛走注。內外疼痛。並皆治之。卽人參白朮大

炙草。橘皮。半夏。丁皮。沉香。木香。中桂。白芷。香附。草果。  
青皮。大黃枳殼。厚朴。檳榔。蓬米。麥冬。大腹皮。木瓜。木通也。

### 分心氣飲

分心氣飲治七情氣滯。胸腹不流行。正減芷朴通木。附麥桂青

### 桑櫟殼蓬

註 分心氣飲治七情氣滯。胸腹之病。正者。謂藿香正氣散也。

正減者。謂卽藿香正氣散方減白芷。厚朴。加木通。木香。香

附。麥冬。官桂。青皮。桑皮。檳榔。枳殼。蓬木也。

蘿子降氣湯

越鞠湯

蘿子降氣氣上攻。下虛上盛氣壅喘咳涎嗽胸膈滿氣秘氣逆嘔鮮紅橘半肉桂南蘿子前朴沉歸甘草同鬱食氣血痰火熱越鞠芩梔麴附芎。

註

蘿子降氣湯治下虛上盛氣壅上攻喘咳涎嗽胸膈滿悶氣秘便難氣逆嘔血卽橘皮半夏肉桂南蘿子前胡厚朴沉香當歸甘草也。越鞠湯治六鬱食鬱氣鬱血鬱痰鬱濕鬱熱鬱卽蒼朮山梔神麴香附撫芎也。夫氣鬱之病若久必與血痰濕熱飲食相合故治鬱之方可治氣鬱也其氣