

張仲景金匱要略

卷十五
六十七
六十八

張仲景金匱要畧卷十五

樵李沈明宗曰南甫編註

黃痺

寸口脉浮而緩，浮則爲風，緩則爲痺。痺非中風，四肢苦煩，脾色必黃，瘀熱以行。

此辨風濕成痺也。寸口主氣，氣分受邪，其脉則浮。曰浮則爲風，而緩脉爲濕。此風多於濕，故脉浮而緩。風濕鬱結，邪正爲痺。痺者，閉也。因風拒閉，營衛爲痺，非內經風寒濕三氣之痺。謂痺非中風，但風入脾胃，風濕鬱蒸，邪化爲熱而越於外，四肢苦煩。

卽風淫末疾之義然脾鬱困極真色走於肌膚脾
色必黃故爲瘵熱以行
跌陽脉緊而數數則爲熱熱則消穀緊則爲寒食卽
爲滿尺脉浮爲傷腎跌陽脉緊爲傷脾風寒相搏食
穀卽眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰
被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀痺

此以跌陽脉辨痺病在於脾胃也痺病始於脾胃
故以跌陽脉辨見脉緊而數者緊爲寒邪傷營而
入脾數爲風邪傷衛入胃而化熱然胃風化熱爲
熱則消穀脾寒不磨食則爲滿寒熱壅逆正氣不

能宣行脾濕下流致傷腎水曰尺脉浮而傷腎然
外寒傳入脾胃而寒屬陰以陰從陰則跌陽脉緊
爲傷脾乃脾受寒而胃受風表裏通氣故爲風寒
相搏若脾單受寒而胃單受風與內濕相合皆致
成痺非盡受風寒也但食穀入胃風熱互蒸上衝
於目故食穀卽眩寒邪傷脾穀氣不消津液停滯
於胃化爲苦濁濁氣下流膀胱濕熱壅閉則小便
不通也若脾之寒濕下流於腎爲陰被其寒或胃
中風濕流於膀胱則爲熱流膀胱氣鬱熱蒸黃色
走於肌表則一身盡黃矣此因酒食穀麴內傷脾

胃招邪致病。故曰穀痺。然非盡屬風寒兩受所致。乃明或風或寒侵入脾胃而合內濕以致成痺。此仲景立言章法之妙。諸篇類皆如此。

師曰。病黃痺。發熱煩喘。胸滿口燥者。以病發時火劫其汗。兩熱所得。然黃家所得從濕得之。一身盡發熱而黃。肚熱熱在裏。當下之。

此以火劫他病致痺也。火熱以挾外邪入裏。與內濕相合。表未解而裏熱熾盛。故發熱煩喘。胸滿口燥。火濕相蒸。爲從濕得之。故身發熱而黃也。蓋太陰主腹。外邪傳裏。太陰受之。則肚熱。爲熱在裏。故

當下之，卽梔子大黃湯之意也。

脉沈渴欲飲水，小便不利者，皆發黃。

此言他病將變發黃也。邪熱傳裏，故脉沈而渴欲飲水，濕熱鬱於中宮，氣不下達，則小便不利，熱蒸外越，勢將發黃也。

腹滿舌

疑是身字

痿黃，燥不得睡，屬黃家。

此熱鬱於內也。邪傳太陰，濕熱鬱蒸，則腹滿身痿，而陽明熱逆，則津血枯燥，土色外越，故黃燥不得睡，爲屬黃家。

黃痺之病，當以十八日爲期，治之十日已上瘥，及劇

爲難治

此取陽病陰和、陰病陽和爲大綱也。十八乃三六陰數之期也。十日者二五陽土之數也。黃痺乃濕熱鬱蒸、陽邪亢極、脾陰大衰、故治之須候一六二六三六陰氣來復、制火之期而爲定期。若至十日已上、土陰氣復、則當瘥而反劇者、乃脾陽亢極、陰機化滅、故爲難治。

痺而渴者、其痺難治。痺而不渴者、其痺可治。發於陰部、其人必嘔。陽部、其人振寒而發熱也。

此言表病易治、裏病難治也。胃中濕熱、蒸越皮膚、

則一身盡黃。雖發於外。當以表裏陰陽辨證。則知可治。與難治。若瘧而渴者。邪雖外越。胃中濕熱。半居於內。耗竭津液。則渴。津枯血燥。陽火亢極。表裏皆邪。故曰難治。不渴者。熱邪一發盡越於表。裏無餘蘊。一解表而卽散。故曰可治。然邪在胸膈胃腑之裏。爲發陰部。內逆上衝。其人必嘔。其邪盡發皮殼之表。爲陽部。乃太陽所主。故振寒而發熱也。陽明病。脉遲者。食難用飽。飽則發煩。頭眩。小便必難。此欲作穀瘕。雖下之。腹滿如故。所以然者。脉遲故也。此乃傷寒論中正虛邪實致瘕也。陽明病而見脉

遲者。是因脾濕氣虛而不健運。故食難用飽。飽則風熱壅遏於胃。上衝則發煩頭眩。流於膀胱則小便難。風濕鬱蒸不散。欲作穀痺。然正虛邪實。不當

下而下之。則正愈虛而邪愈盛。腹滿如故。察其所

以然者。因氣虛脉遲所致故也。

穀痺之病。寒熱不食。食即頭眩。心胸不安。久久發黃。為穀痺。茵陳蒿湯主之。

此穀痺證而出方也。邪在太陽之表。當發寒熱而能食。此濕熱在胃。流於所勝之膀胱。故寒熱不食。食則胃邪上衝。而為頭眩。濁氣內壅。所以心胸不

安不安者卽懊懣熱痛之類也。濕熱已自鬱蒸，相延日久，必致發黃而爲穀瘡。故用茵陳苦寒善解表裏之濕熱，梔子性涼能瀉屈曲之火下行，以大黃微利而助梔子開鬱解熱，擊其半渡而已。

茵陳蒿湯

茵陳蒿

六兩

梔子

十四枚

大黃

二兩

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分溫三服。小便當利，尿如皂角汁狀，色正赤，一宿腹減，黃從小便去也。

心中懊懣而熱不能食，時欲吐，名曰酒瘴。

前云穀食傷於脾胃招邪而爲穀痺此傷酒濕招邪故爲酒痺酒味濕熱鬱蒸中宮上衝於心陽火不寧則心煩懊懣而熱濕熱壅胃故不能食邪機上逆則時欲吐欲吐者乃欲吐而不能吐也若肌皮未黃而見此證卽是欲發酒痺之徵矣

夫病酒黃痺必小便不利其候心中熱足下熱是其證也

此補上條酒痺之未備也酒爲熟穀之液其毒入胃先傷其陰濕熱互蒸而爲黃痺然母病移子肺亦受熱不得通調水道下滲膀胱故必小便不利

或胃熱流於膀胱、亦不利也。邪熱衝心、則心中熱、下。桂腎水則足下熱。若酒客在他病、而見小便不利、心熱足熱、卽知將成瘴證矣。

酒黃瘴者、或無熱、靖

恐是清字

言了了、腹滿欲吐、鼻燥、其

脈浮者、先吐之、沉弦者、先下之、

此酒瘴當分濕熱多少而治也。外無惡寒發熱、裏無懊懣譫妄、神思不昏、爲無熱。清言了了、而熱少濕多、邪鬱於脾、故腹滿欲吐、風消津液、上薰肺竅、則鼻燥也。當審脈之浮沉而施吐下、則無誤治之患。然浮者乃風多、主病其性輕揚、邪機上逆、當先

吐之沉弦者屬陰在裏乃濕多主病濕性濁而下
流故當下之卽梔鼓茵陳蒿湯之類也然詳先字
要知吐下之後再以清解餘熱不待言矣
酒痺心中熱欲吐者吐之愈

此邪機上向之治也邪熱瀰滿於胃上衝胸膈之
間則心中熱偏於風多濕少其機上行故欲吐也
則當乘其上行之勢以從高而越之則邪去所以
吐之愈

酒痺心中懊憹或熱痛梔子大黃湯主之

此酒痺而出方也酒熱之毒傷積於胃薰蒸心膈

之間則懊懣或熱痛其勢非輕若緩時日必傷心
血故用梔鼓宣發在上之邪而清其標大黃枳實
蕩滌胃熱而下奪其本

梔子大黃湯

梔子

十四枚

大黃

一兩

枳實

五枚

鼓

一升

右四味以水六升煮取二升分溫三服

酒瘰下之久久爲黑瘰目青面黑心中如噉蒜齏狀
大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮弱雖黑微黃故知
之

此酒瘰大下而變證也酒瘰妄投大下傷動胃腎

津○精○血○氣○濕○熱○隨○虛○下○趨○腎○間○耗○竭○真○陰○膀○胱○氣○
鬱○腎○火○上○逆○變○爲○黑○瘰○也○然○腎○傷○則○肝○氣○亦○傷○肝○
主○色○發○露○於○外○所○以○肝○傷○則○血○不○上○榮○而○目○青○腎○
傷○則○陰○火○上○炎○而○面○黑○陰○水○既○虧○陽○光○獨○焰○於○心○
胃○之○間○濕○熱○薰○蒸○嘈○雜○酸○辣○譬○如○噉○蒜○齏○之○狀○但○
腎○傷○則○陰○火○煎○熬○故○外○證○面○黑○內○則○大○便○正○黑○是○
無○雜○色○相○兼○肺○傷○則○津○液○不○輸○於○皮○毛○而○皮○膚○黃○
燥○肝○傷○則○血○不○濡○筋○爪○之○不○仁○矣○蓋○瘰○病○邪○氣○在○
胃○是○當○下○奪○何○致○變○證○耶○然○酒○瘰○乃○熟○穀○之○液○陳○
腐○之○毒○胃○氣○先○傷○臟○腑○資○生○久○已○無○賴○所○以○一○下○

則諸臟盡傷故當嚴戒夫濕熱成痺脉得沈洪數
大乃爲正氣不虧此傷陰血反浮弱矣若酒痺變
黑其色必有微黃相兼較女勞傷腎純黑不同故
謂雖黑微黃故知之耳

諸病黃家但利其小便假令脉浮當以汗解之宜桂

枝加黃芪湯主之

方見水氣

此風多濕少邪機向表通治之方也諸病黃家乃

胃中濕熱釀成而濕性下流當從下驅爲順故但
利小便而爲常法假令脉浮則濕少風多而風性
輕揚邪機在表當以汗解不可拘利小便爲常矣

故用桂枝湯和營衛而解肌表之邪。風爲表虛，加黃芪而實腠理，歠熱稀粥爲助，使周身微微小汗，則肌表之邪去，而雖有裏濕亦從下滲矣。黃痺腹滿，小便不利而赤，自汗出，此爲表和裏實，當下之，宜大黃消石湯主之。

此邪居裏實，通治之方也。黃痺腹滿，小便不利而赤，濕熱壅逆中州極矣。但自汗乃表氣開通一面，爲表和裏實，然裏實必當下奪，故用大黃消石，善文濕熱，瘀凝氣血之結。黃栢苦寒，以清下焦濕熱，梔子輕浮，能使上焦屈曲之火下行爲助也。