

吳氏醫學述第三種本草從新目錄

卷五上

金石部

金類

玉類

石類

鹵石類

金

銀箔

自然銅

鐵落

鐵華

鐵精

鐵砂

鐵霜

雲母

白石英

雄黃

雌黃

石膏

滑石

赤石脂

白石

禹餘糧

爐甘

古文錢

鐵

鐵落

鐵華

鐵精

鐵砂

鐵霜

雲母

白石英

雄黃

雌黃

石膏

滑石

赤石脂

白石

禹餘糧

爐甘

紫石英

硃砂

水銀

輕粉

銀硃

雄黃

雌黃

石膏

滑石

赤石脂

白石

禹餘糧

爐甘

石

無名異

鍾乳

石炭

石灰

古礬

海石

石膽

砒石

陽起石

慈石

代赭石

空青

石膽

砒石

陽起石

慈石

代赭石

空青

石膽

砒石

石

無名異

鍾乳

石炭

石灰

古礬

海石

石膽

砒石

陽起石

慈石

代赭石

空青

石膽

砒石

陽起石

慈石

代赭石

空青

石膽

砒石

陽起石

慈石

代赭石

空青

石膽

砒石

陽起石

慈石

代赭石

空青

石膽

砒石

陽起石

慈石

代赭石

空青

石膽

砒石

陽起石

慈石

代赭石



砒黃 砒霜 礬石 青礬石 花蕊石 石燕 石蟹

食鹽 光明鹽 木鹽 蓬鹽 石鹽 戊鹽 凝水石 元精石

相硝 苳硝 風化硝 元明粉 硃砂 蓬砂 石硫

黃土硫 白礬 礬華 綠礬 絳礬 消石



吳氏醫學述第三種

門人周蘭九生庭

武原吳儀洛遵程輯

男

有杜雋望

本草從新

金石部

金類

玉類

石類

幽石類

重鎮心肝

金

以下金類

辛平有毒

磨屑頓服不過三錢而斃

重鎮怯故鎮心

肝安魂魄

能辟除惡祟

金制木故能治驚癇風熱肝

膽之病

銀功用相倣

丸散用箔為衣煎劑



重續筋

加入藥者畏錫水銀

遇鉛則碎五金皆畏水銀

自然銅

辛平主折傷續筋骨

散瘀止痛

折傷血必

有死傷血必

瘀滯經絡然須審虛實佐以養血補氣溫經之藥

銅非煅不可用

然

火毒金毒

相煽復挾香藥熱毒內攻

雖有接骨

神功頗多燥烈之損大宜慎用

產銅坑中火

煅醋淬七次細研甘草水飛

酸平微毒內科吐風痰之聚外科止

金瘡之血女科理血氣之痛眼科主風熱之痰

殺蟲有效疳證亦宜

色青入小專主東方之病

銅青

一名銅絲

服之損血

此為試讀，需要完整PDF請訪問：

www.ertongbook.com

重風痰

殺蟲有效疳證亦宜

色青入小專主東方之病

服之損血

此為試讀，需要完整PDF請訪問：

www.ertongbook.com

重隊痰解
毒

鉛

以醋製銅刮用

頭上生風銅青明礬末摻之良

甘寒屬腎稟壬癸之氣水中之金金丹之可

八石之祖

丹憲家必用之

墜痰解毒安神明目殺蟲烏

鬚

制為梳以梳鬚

性帶陰毒傷人心胃

解硫黃毒煎鉛湯服即解

毒內用鐘
心隊痰外
用解熱按
毒

鉛丹

即黃丹

鹹寒沉重味兼鹽礬內用鎮心安魂

墜痰消積殺蟲治驚癇瘧痢外用解熱拔毒止

痛去瘀長肉

性味沉陰損陽氣

黑鉛加硝

黃鹽礬鍊成凡用以水漂去鹽硝砂石微火炒

紫礬攤地上去火毒

鉛粉主治略同

亦名胡粉錫粉

重氣

雲母

以下玉類

甘平色白

入肺下

氣堅肌續絕治瘡

痢癰疽

同黃丹熬膏貼之千金翼用敷金瘡

有五色以色白

瑩者為上澤瀉為使

惡羊肉

金瘡出血雲母粉傅之絕妙

重潤肺

白石英

甘辛微溫潤

以去燥

白石英紫石英之

屬是也

利小便實大腸

治肺痿吐膿欬逆上氣

石藥終燥祇可暫用

潤藥頗多而徐之才取二石英為潤劑存其意可也

白如水晶者良

養肝一重領心潤

紫石英

甘辛而溫重

以去怯濕以去枯心神不

安肝血不足女子血

海虛寒不孕者宜之衛為



重鎮心定
驚瀉熱

朱砂

石以下
石類

甘涼體陽

性陰

內含陰永鄭康成註
周禮以丹砂雄黃石

膽礬石慈
石為五毒

色赤屬火

性反涼者離中虛有陰也
味不苦而甘者火中有土

也
瀉心經邪熱分主

藥鎮心定驚辟邪清肝明

目祛風止渴解毒

胎毒宜之定癲狂止牙疼下死

胎

博救方水煮
一兩研酒服

獨月多用令人呆悶

辰產

任主胞胎經疏云女子係胞於賢及心包絡虛
則風寒乘之故不孕
寒鎮下焦為煖
子宮之要藥

色

淡紫

石英辛溫走二經散
各入五臟

瑩徹五稜

火煨醋淬七次研末

水飛

二英俱畏附子

畏黃

連

日華本草方癰腫
醋淬為末生薑米

毒氣紫石英火煨
醋煎敷之摩亦得

南京中醫藥大學

重外用殺

燥劫痰涎
外用殺蟲

明如箭鏃者良

名箭鏃砂

細研水飛三次

若火鍊則有毒服之

常殺人

畏鹽水惡慈石忌一切血

水銀

辛寒陰毒功顛殺蟲治瘡疥蟻虱解金銀

銅錫毒

能消五金

墮胎絕孕

性滑重直入肉

頭瘡切不

可用恐入經絡令人筋骨拘攣若近男陽陽痿無氣唯以赤金係患處水銀自出

從

丹砂燒煨而出得鉛則凝得硫則結併棗肉入

唾研則碎散失在地者以花椒末茶末收之畏

慈石砒霜

輕粉

辛冷而燥有毒殺蟲治瘡劫痰消積

能消凝積

燥破積
痰

善入經絡癰瘰藥有用之

不可輕服

時珍曰水銀陰

毒用火煅鍊丹砂而出再加鹽礬鍊為輕粉
揚燥烈走而不守今人用治楊梅毒瘡雖能切
風痰濕熱從牙齦出邪鬱暫解然毒氣竄入經
絡筋骨血液耗亡筋失所養變為筋攣骨痛腫
腫漏遂成廢痼貽害無窮。上下齒齦薄嫩之
足陽明腸胃經毒氣循經上行至齒齦薄嫩之
處而出。土茯苓黃連黑鉛鐵槩陳醬能制其毒

粉霜功過略同

銀硃

辛溫有毒破

積滯劫痰涎散結胸療疥癬

惡瘡殺蟲及虱

其性燥烈能爛齒攣筋其功

過與輕粉粉霜同

今厨人往往以之
染色供饌宜去之

重解尋殺
蟲

雄黃 辛溫有毒獨入厥陰氣分搜肝氣而散肝

風殺百毒辟鬼魅治驚癇痰涎積聚頭痛眩暈

暑瘧癖癰泄瀉痢堅志云虞雍公道中見暑瘧連月夢至仙居延之坐壁下

有詞云暑毒在脾濕氣連脾不泄則痢不痢則癰獨鍊雄黃蒸餅和藥甘草作湯食之安樂別

作治療醫家大錯又能化血為水燥濕殺蟲治

勞疳蛇傷焚之蛇皆遠去敷楊梅疔毒疥癬痔瘡血

虛者大忌生山之陽赤似雞冠明徹不臭重

三五兩者良醋浸入萊菔汁煮乾生山之陰者

名雌黃功用略同劣者名黃黃燒之則臭只堪

體重濕火
氣輕解

蕪瘡疥殺蟲虱

陰腫如斗。雄黃礬石各二兩。甘草一尺。水五升。煮二升。浸之。

石膏

甘辛而淡

體重而降足陽明經胃

太寒之

藥色白入肺兼入三焦

諸經氣分

寒能清熱降火

辛

能發汗解肌

甘能緩脾生津止渴治傷寒鬱結

無汗陽明頭痛發熱惡寒日晡潮熱陽狂壯熱

經云陽盛生外熱

小便赤濁大渴引飲中暑自汗

能止

舌焦

胎厚無津牙痛

陽明經熱為

又胃主肌肉

肺主皮毛

嘉言曰極清肺熱

為發斑疹之要品

色赤如錦紋者

為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹輕率由胃熱所致然亦有陰陽二證陽證宜用石膏又有

為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹輕率由胃熱所致然亦有陰陽二證陽證宜用石膏又有

為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹輕率由胃熱所致然亦有陰陽二證陽證宜用石膏又有

為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹輕率由胃熱所致然亦有陰陽二證陽證宜用石膏又有

為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹輕率由胃熱所致然亦有陰陽二證陽證宜用石膏又有

為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹輕率由胃熱所致然亦有陰陽二證陽證宜用石膏又有

為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹輕率由胃熱所致然亦有陰陽二證陽證宜用石膏又有

為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹輕率由胃熱所致然亦有陰陽二證陽證宜用石膏又有

為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹輕率由胃熱所致然亦有陰陽二證陽證宜用石膏又有

為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹輕率由胃熱所致然亦有陰陽二證陽證宜用石膏又有

為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹輕率由胃熱所致然亦有陰陽二證陽證宜用石膏又有

為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹輕率由胃熱所致然亦有陰陽二證陽證宜用石膏又有

為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹輕率由胃熱所致然亦有陰陽二證陽證宜用石膏又有

為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹輕率由胃熱所致然亦有陰陽二證陽證宜用石膏又有

為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹輕率由胃熱所致然亦有陰陽二證陽證宜用石膏又有

為斑隱隱見紅點者為疹斑重而疹輕率由胃熱所致然亦有陰陽二證陽證宜用石膏又有

內傷陰證見斑疹者色微紅而稀少此胃氣極虛通其無根之火游行於外當補益氣血使中散若作熱治死生反掌

少壯火熱者功交

甚速老弱虛寒者禍不旋踵

東垣曰立夏前服白虎湯令人小便

不禁降令太過也極能寒胃胃弱血虛反病邪未入陽

明者切勿輕投

成無已解大青龍湯曰風陽邪傷寒陰邪傷營營衛陰陽俱

傷則非輕劑所能獨散必須重輕之劑同散之乃得陰陽之邪但夫營衛俱和石膏乃重劑而

又顯達肌表也東垣曰石膏足陽明藥仲景用治傷寒陽明證身熱日痛鼻乾不得臥邪在陽

明肺受火制故用辛寒以清肺氣所以有白虎之名肺主西方也按陽明主肌肉故身熱脉交

額中故目痛脉起于鼻循鼻外金燥故鼻乾胃不和則臥不安故不得臥然亦有陰虛發熱及

脾月虛勞傷寒陰盛格陽內寒外熱類白虎湯
證映投之不可救也按陰盛格陽陽盛格陰
證至為難辨蓋陰盛極而格陽於外外熱而
寒陽盛極而格陰於外外冷而內熱經辨諸重
陰必陽重陽必陰重寒則熱重熱則寒是也當
於小便分之便清者外雖燥熱而中實寒便赤
者外雖厥冷而內實熱也再看口中之燥潤及
舌胎之淺深胎黃黑者為熱宜白虎湯然亦有
舌黑屬寒者舌無芒刺口有津液
也急宜溫之誤投寒劑則死矣 有軟硬二

種瑩白者良研細甘草水飛近人因其寒或用

火煨則不甚傷胃但用之甚少則難見功白虎湯以

之為君或自一味淡難出若入煎劑須雞子為

使惡巴豆畏鐵今茶食內俱加石膏粉取其價

通和發行
水體重瀉

滑石

淡滲濕滑利竅寒瀉熱色白入肺清其化

源而下走膀胱以利水通六腑九竅津液為是

太陽經本藥治中暑積熱嘔吐煩渴非實止

利竅滲去濕熱則脾胃中和而渴自止耳若無

濕小便利而渴者內有燥熱宜滋潤或誤服此

則愈凶其津液而渴轉甚矣故好古以為至燥之劑

偏主水瀉熱痢六一散加紅麴治赤吐血衄血

石淋諸瘡腫毒為蕩熱除濕之要藥時珍曰滑石上

除中上之濕熱下利精溺之竅是除中下之濕
熱濕熱去則三焦寧而表裏和闌門通而陰陽
利矣河間益尤散治表裏上下諸病蓋是此意
益元散一名大水散一名六一散取天一生水

地六成之之義也。滑石六錢甘草一錢或加辰砂。

消暑降火散結通乳。

滑胎。凡脾虛下陷及精滑者禁之病。

有黃白面滑。

表者尤忌。

其時珍土材俱謂其能發表。刺菴亦謂其氣輕解肌。不過以其能利。

白面滑。

不知表邪得此滲泄重降之品必愈。陷入裏而成敗。諡矣。切勿信以為然。

白面滑。

者良石葦為使宜甘草。

走泄之性宜并以和之。言曰天水散取其一。

其一寒之意也。陰下溼半兩枯白礬五分研摻之。

汗滑石一兩石膏煨。脚指縫爛方同上。

赤石脂。

甘溫酸澇能收濕。

止血而固下。

經疏云大小腸。

小腸。

下後虛脫非瀉劑無以固之。其他瀉藥輕浮不能達下。惟赤石脂體重而瀉直入下焦陰分。故。

為久痢泄。

療腸澼泄痢崩。

帶遺精癰痔潰瘍收。

淋要藥。

上。

石鍾。

口長肉催生下胞胞經疎云能去惡血惡血化則胞胎無阻東垣曰胞胎不掛

瀉劑可以下之又云固腸胃有收斂之能下胞衣無推蕩之峻細膩黏者

良赤入血分白入氣分五色石脂研粉亦有水

飛畏羌花惡大黃松脂經水過多赤石脂故組等分爲末米飲下二錢

禹餘糧 甘平性濇手足陽明大腸血分重劑治

欬逆下痢血閉癥瘕血崩能固下李先知云下焦有病入難會須

用餘糧赤石脂又能催生不中黃粉生於池澤無砂

者佳脩治同上身面癰瘡同半夏末鷄子黃和敷先以布拭赤避風日出日効

爐甘石 甘溫陽明胃經藥受金銀之氣金勝水

重瀉圖下
李先知活人書括

燥濕治目疾