

孫氏醫學叢書

傷寒雜病論章句

冊一

孫氏醫學叢書序

醫之爲道求愈人之病而已自鍼灸按蹻諸法漸廢而僅存方藥則求盡愈諸病也難况又往往各執寒熱補寫之偏或揣摩病家好惡或專用平淡之方倖其自愈遷延致變以至不治於是羣然視中醫爲畏途而惟西法之趨無怪其然也夫以今日之中醫與西醫之有實驗者較其不及固矣若語以古先聖帝之道又豈習西醫者所能知哉易曰形而上者謂之道形而下者謂之器器則有規矩易循道則奧妙而難識凡今西人之學皆恃其器用者也醫特其一耳舉世盲然從之遂令千古一綫之傳于茲絕斬不大可痛也乎余少時承父師之教求通經致用之學不識醫藥爲何物也自己亥歲先妣侍先嚴疾嚴冬得寒庸醫誤以戴陽爲熱竟以不起哀痛之餘於是專宗張書上稽靈素難經下逮隋唐以來之籍欲使斯世患傷寒者無苦如吾母也每遇一證必溯其源而折衷焉施人輒愈未嘗不自喜

乙巳湘陰郭復初世丈訪先嚴於家猝發疾幾殆爲處方得痊因言
於巡撫端公咨送日本俾參知西法會取締事起憤然曰中法獨不
能活人耶遂拂衣歸侍奉暇取古醫書窮治之爲之編注甲子來滬
攜六種以視中華書局高君欣木許爲印行舒君新城襄贊之命曰
孫氏醫學叢書越九載壬申始克竣事其目曰傷寒雜病論章句傷
寒雜病論讀本難經章句明堂孔穴鍼灸治要脈經鈔醫學三言遭
家不造先嚴見背倏忽六年不及嘗藥而歸嗚呼余之汲汲於醫究
何補乎然區區活人之志固未少殺也顧念是書也其文博其義廣
心力有限錯謬實多後之君子儻有以糾正而發揮之是則私心所
大願也嗟乎國學之存者希矣樂德禮教足以移風俗而正人心者
且弁髦之况一技之微孰能遠紹旁搜以全民命乎吾爲此懼矣壬
申十月壬午湘潭孫鼎宜序

孫氏醫學叢書總目

傷寒雜病論章句十六卷

傷寒雜病論讀本三卷

難經章句三卷

明堂孔穴鍼灸治要二卷

脈經鈔二卷

醫學三言一卷

傷寒雜病論章句卷一

湘潭孫鼎宜撰

【六經總論】

【論六經見證大略一章】

病有發熱惡寒者發于陽也

出太陽上出字上空一字不作圈○章一

內另起一證者以圈識之另起一證而又別出一項者以△識之

無熱惡寒者發于陰也

陽三陰三

經也細分之一經之中一陽病一證之內又復各有陰陽內經所謂數

之可千推之一可萬也三陽經亦有無熱三陰經亦有發熱然大略則

以四逆外臺一引此二語謂發于陽可攻表以桂枝發于陰宜溫內

發見也此即現證于陽現證于陰之謂非原始之詞近人以

右以有熱無熱分出六經見證之常

【論六經愈期一章】

○本與上為一章又發于陽者七日愈發於陰者六日愈

六日七日

數言故下文曰以陽數七陰數六故也

此牽合五行之說約略言耳

傷寒雜病論章句

卷一

六經總論

中華書局聚

之得宜六七日間無不可愈者過期不愈皆治之不得其法所以或傳經或變證種種見證不可窮極以致治法千端聚訟不息故論中治傷寒正方不過數首餘皆救誤治之變證也

右按陰陽之日數以定病愈之期

仍陳語

【藉日數以分六經轉屬之層次六章】

傷寒一日太陽脈弱○至四日大陰脈大

據千金九及翼方補○傷寒外感通稱一日四

日藉以明傳經之次第非實以日數拘大陽為受病之始大陰為陽去入陰之期故舉此二經也弱者正氣虛大者邪氣盛○總病論亦載此條龐自注云脈大而旬滿多痰者宜吐之無此證者宜汗之則非也

右先言太陽太陰受病之脈

傷寒一日

出太陽上

太陽受之

二冒證

○脈若靜者為不傳

靜者謂整見緊

太陽病

已愈則靜如平人緊緩俱去矣柯云脈靜證亦靜無也○頗

逆煩躁

可知今有發熱頭痛一日而愈者正此不傳之謂也○頗

欲歐

歐逆之作機見矣今頗有吐經意則若躁煩重可知脈數急者六至

為數急即數也據證與脈皆邪盛之象迺為傳也得拘定陽明一定不而欲生熱也成云寒邪變熱傳於陽明通有故必脈定為憑柯云欲以表裏傳定在少陰也歐數吐急是診其已然此因脈定證之法也

右因脈定證以辨太陽受病之傳與不傳

傷寒

出太陽上章省

二三日陽明少陽證不見者為不傳也

論中凡數

約有三義一藉以明傳經之次第第二則代言某經受病之淺深而病證竟一毫皮不見故知太陽所轄程應旄曰傷寒之有六經無非從淺而病定部署以皮膚為大知所轄故署之太陽肌肉有傷寒一所轄故署之太陽肌肉有傷寒二之陽明筋膜為少陽所轄故署之太陽肌肉有傷寒三之少陽筋膜為太陰所轄故署之太陰肌肉有傷寒四之太陰筋膜為少陰所轄故署之少陰肌肉有傷寒五之少陰筋膜為厥陰所轄故署之厥陰肌肉有傷寒六之厥陰筋膜為太陰所轄故署之太陰肌肉有傷寒

傷寒雜病論章句

卷一

六經總

一一中華書局聚

右據證以言陽明少陽之不傳類餘可推

〔傷寒〕

〔出少陽〕上章省

三日少陽

張錫駒曰三日乃

脈小者欲已也

成云少陽

脈當弦緊小者邪氣微欲已也內經曰大則邪至小則平柯云弦細屬少陽小即細也若脈小而無頭痛發熱等證是少陽不受邪為欲愈矣按小字當活看成說是也

右據脈以言少陽病之欲已

類餘推經

〔傷寒二日〕

〔出少陽〕三日正少陽上章省○陳云

三陽當盡三陰當受邪

此以

言究不可拘統曰三陰不復受細分者以三陰病氣相通治法出一○不比三陽之證治各殊也○復受猶收也千金作收當盡一作為盡

〔其人〕

省反能食而不歐

云反謂少不相合應上章頗欲歐與此對文喻

吐利經必

此為三陰不受邪也

汪琥曰邪在少陽原氣不能食今陽

之邪自解也少陽之邪解則其不傳三陰斷斷可必按多主不能食在

太陽與陽明亦通有之因王熙以此章屬少陽故注家多主少陽立

右一章二節首言陰陽相傳之常次言三陰不受邪之證舉

能食不歐以概其餘

〔傷寒〕〔出少陽蒙〕

六七日

周之經氣

無大熱

則謂全熱已將退也若無躁煩

徐云外熱輕

○其人躁煩者

發成躁煩者先煩漸至躁也躁煩者先

此一定或單著

○其各本不同校以脈經千金等又復有異惟

足句不

此為陽去入陰故也

退去躁煩三陽經故無大熱將入三陰經故

也陳云○

注家多主少陽入太陰立說以不知此為熱總論三陰三陽言

或陽而太陰少陰厥陰豈知經氣之傳有表裏變動不居難概論也

右言三陽受病傳入三陰之證舉煩躁以概其餘

【再辨六經愈期一章】

〔風家〕

〔出太陽上〕○統太陽總言省柯表解而不了了者

愈或謂之差或謂之了柯云不了者餘未盡也如大陽

七日病衰頭痛少愈曰衰曰少皆表解而不了了之謂也

愈顧云內經曰十二日大氣皆去病復過一矣喻云見當靜養以需不

右言表解後再定全愈之期仍陳就太陽以例其餘

【太陽總論】六頭經起止詳見內經朱肱曰足并正陽別脈上經從目內眥

行于背與身此其大略也

【大陽病提綱一章】

大陽之為病出太陽上冒下四證○府病統所經獨難言不言小便脈浮

浮為頭項彊痛三而惡寒後○頭項大陽經脈所過說文頭首也項

堅硬不能俯仰左顧也後漢董宣傳帝初襲不叩頭謝陽湖公主宣

兩手據不肯俯因勅強項令出漢董宣傳風寒初襲不能再勝外忤故惡

右大陽病定脈定證注仍喻

【論七日當愈不愈則行針一章】

【大陽病】出太陽上既在太陽篇不應贅題大陽病此等敘法疑多皆

可證然當其亂相比附之時猶肯以仲景原如次時標出之俾後之人

合病中其頭痛太陽病不舉頭痛者省文此等敘法亦疑出王

即持其所謂對病之○至七日已上自愈者病成衰云頭痛少愈七日其

已也上二字無以行其經竟故也

之謂也七日乃太陽一經行盡之期不是大陽傳少其明證矣○復傳

大陽如環之無端也內經七日太陽病衰頭痛少愈其明證矣○若欲再作經者

云六行過他經曰傳一舉大陽以爲例○按本盡經○若欲再作經者

曰行經過他經曰傳一舉大陽以爲例○按本盡經○若欲再作經者

作傳字誤一本經若欲作再經者蓋因誤而乙之也病源七云再經

病者是陰陽諸經絡重受病自謂厥陰盡而傳大陽則謂之再經非

大陽病而傳此本經自鍼足陽明不刺其當補寫亦脈證及四時五

云再經也與此本經自鍼足陽明不刺其當補寫亦脈證及四時五

補足陽明三里使經不傳則愈所刺治未病也○愈行在太陽而針

也顧云衝陽穴使經不傳則愈所刺治未病也○愈行在太陽而針

在陽明奇法亦奇

右一章二節首言大陽病經竟自愈之理次言針足陽明使

【論愈有定狀一章】

若欲自解者解猶愈也柯云寓不可必當先煩

甚故有發煩更煩反煩迺有汗邪正相爭作汗較輕同一隨汗而解柯

煩復煩內煩等證反煩迺有汗邪正相爭作汗較輕同一隨汗而解柯

或煩而不汗或汗而不解則審脈定證麻桂青龍隨所施而恰當矣

沈明宗曰自解證有從鉅解有從下血及大小便而解者此即戰汗

傷寒雜病論章句卷一

乃有一端○八字傷寒經作「何以知之」脈浮故「知汗出當解」也九字

身三陰病解亦有戰汗者此就太陽以爲例喻云天地鬱蒸而雨作人

之煩悶而汗作氣機一動脈必與證相應設脈不浮其煩又爲內入

勿遽妄投湯劑汗出則陽自勝而寒邪自解矣○煩見大陽中與脈經有七

皆合誤灸脈浮當以汗解名
右言大陽病解必煩而汗出之理除承氣證外多從汗解

【論愈有定時一章】

「大陽病」出太陽上欲解時從巳盡未上一上者語助詞也翼方無上字盡

辨證篇日中得病夜半愈夜半得病日中愈又經日寅至戌陽道饒時

刻及六經矣成云六經皆以三時爲解而三陽經從日寅至戌陽道饒時

也三陰經從亥至卯陰道乏也喻云凡病皆陰于見陽氣兩相和協與陰

獨從其生則陽進陰退之義也內經取陽見陰陰見陽氣兩相和協與陰

此陽得義互相發明
右大陽病解之時

【大陽經病】

【桂枝湯正治十三章】

〔大陽病〕

〔出太陽證〕

發熱

熱甚

風中

傷寒

必鬱

而後

發汗

汗出

○

衛病則惡風

三○傷風自惡風惡風時猶見寒也

脈緩者

兼浮

浮是

必

是

必

必

必

大陽本脈緩不能鼓

名曰中風

可喻

按楚

宋玉

九辯

云薄

寒之

中人

亦

是古通用也

右大陽中風定脈定證

注仍喻

〔大陽中風〕

〔其〕脈

知其

陰二

字據

千金

補注

家不

陽浮

而

陰弱

有陰陽謂尺寸也

即營陰脈弱

○弱互

一文

徐濡

云風

經作

陰濡

弱下

句同

人濡

強分

濡弱為二脈

失後

陽浮

者熱

自發

熱徐

桂枝

風為

辛陽

汗自出

之徐

甘草芍藥之酸以收

奮奮惡寒

據詩

桑柔

箋知

奮奮

○千

金作

寒

瀋瀋淅淅惡風

云廣雅釋詁二淅洒也

惡風

通作

灑論

中又

通云

灑淅

成

所以傷寒證中亦互云惡風

後人相傳

傷風

顧云

風傷

寒惡

寒誤

人

多

桂須知不挾寒者即風

翁翁發熱

三狐

惑病

乍赤

乍白

乍黑

乍源

十

也

溫證也○千金作惡寒

翁翁者忽然貌觀麻黃證之或未發熱

自明

喻甚

○千

金寒

乾熱

不通

謂其熱而有微汗也

徐云其熱亦不如陽明之甚

傷寒雜病論章句

卷一

大陽經

五

中華書局聚

作喻鼻鳴喻云陽乾歐者喻云陽邪上蓋逆○徐云鼻鳴似屬陽明但乾
不甚桂枝湯主之方在桂枝輩

右桂枝湯定脈定證

〔大陽病〕

陽上太

頭痛

項喻

不強

風之傷人

也

按證屬

太陽

先受之

顧云

止言

頭痛

則

之

〔發熱汗出惡風〕

柯中云

頭痛

發熱惡風

不出

便非桂枝證

〔若惡

寒者〕

四字据脈經補

宋本

可汗家謂桂枝證

寒者

翼方作惡寒

注一

其風可知

〔桂枝湯主之〕

凡云主之者

更無

上別

方喻

云代

重互

其文

以見

其風可知

〔桂枝湯主之〕

凡云主之者

更無

上別

方喻

云代

重互

其文

以見

其風可知

〔桂枝湯主之〕

凡云主之者

更無

上別

方喻

云代

重互

其文

以見

其風可知

〔桂枝湯主之〕

凡云主之者

更無

上別

方喻

云代

重互

其文

以見

其風可知

〔桂枝湯主之〕

凡云主之者

更無

上別

方喻

云代

重互

〔桂枝湯主之〕

凡云主之者

更無

上別

方喻

云代

重互

其文

以見

其風可知

〔桂枝湯主之〕

凡云主之者

更無

上別

方喻

云代

重互

其文

以見

其風可知

〔桂枝湯主之〕

凡云主之者

更無

上別

方喻

云代

重互

右申明桂枝湯定證

〔大陽病〕

陽中大

發熱汗出者

此為營弱衛彊

方云

即陽浮陰弱

喻云

〔大陽病〕

陽中大

發熱汗出者

此為營弱衛彊

方云

即陽浮陰弱

喻云

〔大陽病〕

陽中大

發熱汗出者

此為營弱衛彊

方云

即陽浮陰弱

喻云

〔大陽病〕

陽中大

發熱汗出者

〔大陽病〕

陽中大

發熱汗出者

此為營弱衛彊

方云

即陽浮陰弱

喻云

〔大陽病〕

陽中大

發熱汗出者

此為營弱衛彊

方云

即陽浮陰弱

喻云

〔大陽病〕

陽中大

發熱汗出者

此為營弱衛彊

方云

即陽浮陰弱

喻云

〔大陽病〕

陽中大

發熱汗出者

〔大陽病〕

陽中大

發熱汗出者

此為營弱衛彊

方云

即陽浮陰弱

喻云

〔大陽病〕

陽中大

發熱汗出者

此為營弱衛彊

方云

即陽浮陰弱

喻云

〔大陽病〕

陽中大

發熱汗出者

此為營弱衛彊

方云

即陽浮陰弱

喻云

〔大陽病〕

陽中大

發熱汗出者

〔大陽病〕

陽中大

發熱汗出者

此為營弱衛彊

方云

即陽浮陰弱

喻云

〔大陽病〕

陽中大

發熱汗出者

此為營弱衛彊

方云

即陽浮陰弱

喻云

〔大陽病〕

陽中大

發熱汗出者

此為營弱衛彊

方云

即陽浮陰弱

喻云

〔大陽病〕

陽中大

發熱汗出者

右釋桂枝證內發熱汗出之理并主治之方

病人藏無他病見發熱汗出兩證久作舊字誤謂從來別無他病而惟

句法時發熱自汗出而不愈者汗出云時以暫言有時不發熱有時不

常自汗者不同此衛氣不和也以上明其理陳云每熱則汗出與無熱

時發汗則愈桂枝湯主之必蒙上句省○徐云無他病太陽諸證不

令詔云桂枝湯能和營衛而發汗亦能和營衛而止汗也柯云合時

一條一屬陽虛一屬陰虛皆自汗出但以無熱有熱別之以常汗時

右釋平時發熱汗出之理并主治之方

病常自汗出者出太陽中○方云上條以暫言此以常言謂無時不

固不能衛此為營氣和即衛氣不和互文徐云言營氣和而外不解

者以外當作汗涉下文誤此僅一常自汗證也此衛氣不和也上句同營行

脈中為陰主內衛行脈外為陽主外四語道營衛之常然千金無

復發汗衛和則愈徐云自汗與發汗迥別自汗乃營衛相離發汗便

而復發之則營衛不和而自汗反止矣○以上八句傷寒論作營氣和而外不諧以衛氣不共營氣和諧故爾以營行脈中衛行脈外復發汗營衛和則愈今從人筆削是也
〔宜桂枝湯〕
啜稀熱粥是陽不

經尤明恐本論為後人筆削是也
于足溫之以氣食入
陰長氣于陽也

右釋平時無熱汗出之理并主治之方并上二章皆營衛自病
治外邪而然者與外邪之
治法方雖同而理則異

〔大陽病〕脈浮者病在表可發汗〔宜桂枝湯〕
蒙上

脈浮而數者千金九浮可發汗〔宜桂枝湯〕
〔補〕注一章據宋本可汗篇

脈經七同今本傷寒論僅於麻黃證內載之然在桂枝證內亦解
可不知有此法喻氏謂桂枝湯祇能解肌據此足正其誤究之解

肌即發汗互文
無庸強辨也

〔大陽病〕三四日不吐下見浮脈乃汗之
〔補〕据翼方

凡脈浮者言以凡者統諸經
〔病在表〕可發汗〔宜桂枝湯〕
〔据千金補〕

〔大陽病〕
〔出太〕外證未解
外即表也張令韶曰病有在表在外之不同

惡寒
等證脈浮弱者
方云即陽
當以汗解
人桂枝湯可以為解肌誤也○此章

證有冒不兼病曰外證曰脈浮弱則有裏
云而汗解之必用桂枝湯不可誤行別法也徐
云病雖過期脈證屬大陽仍不離桂枝法

右五章憑脈以定桂枝之治

〔大陽病〕出太陽初服〔桂枝〕二字湯升柯云初服者不取方三升先服一

亦可但三齊煩即謂服完也一齊反煩不解者成云汗後身當涼和反煩服是

藥熱鬱不如法魏者謂之云但添一煩則太陽證俱在桂枝非傳中用也煩以柯

外感之風邪重內之陽氣亦重耳先刺風池風府陽之經陽池維之少

戰汗針天柱而解者今此是解之煩先刺風池風府陽之經陽池維之少

聰曰風池風府雖非大陽穴維諸煩先刺風池風府陽之經陽池維之少

衰大徐云風勢一柯穴在項上入髮際一寸大筋內宛宛中風來府二穴出

在顛顛後髮卻與〔桂枝湯〕則愈服卻若初服也再增煩不為不齊分三

陽之不盡齊柯云却與者盡其二升也徐其結蓋非誤治因風寒凝結太

以而在經刺之藥力不能流通故刺以解其結蓋非誤治因風寒凝結太

右明服藥反煩當兼刺以盡其變就桂枝證以例其餘