

傷寒經解卷之四

漢南陽張機仲景氏撰

勾吳逋人集註

少陽經全篇

少陽之為病口苦咽乾目眩也

少陽胆為風木之經木動生火火上炎上作苦故口苦少陽往上挾咽故咽乾少陽木生火而主風旋則目眩也此乃少陽經病亦一篇之總綱也

少陽中風耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸  
嘔逆陽中風症也

而煩

少陽之脉從耳後入聳中出前耳前其支者下胸中合肝應木  
其經本少血風為陽而主氣血少氣寒故耳無聞風熱陽亢故  
目赤而煩滿也少陽不出不入故禁吐下吐下則重亡津液木  
苦火焚故心神慄忡而恐煩也

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則讞語此  
屬胃和則愈胃不和則煩而悸

外感六淫之邪皆名傷寒脈弦細者細則少血弦則為風中風  
病也風為陽邪故頭痛發熱少陽少血主風故脈弦細曰屬少  
陽以少陽脉弦也汗乃血化血少所以忌汗也汗之則血涸胃

燥則讙語讙語所以曰屬胃○和則燥退而愈胃不和則中焦  
營血不化故主血之心木火交熾煩而恐怖也

傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛者先用小建中湯不差者與  
小柴胡湯主之

寸為陽濇者陽氣有餘也尺為陰弦者陰血少也血少氣滯也  
故腹中急痛小建中湯益血而緩急也不差則病原非血少蓋  
因胆氣欲升不能升鬱于下而尺脉弦也故用小柴胡以達之

小建中湯 桂枝三兩芍藥六兩酒洗甘草二兩大棗十二枚膠鴆  
一升右六味以水七升煮取三升去渣內飴更上微火消烊溫服

一升日三服

中者陽之守也。建中者建立中之陰而為陽之守也。蓋脾為陰氣之原。甘草白芍甲己以化血。桂枝辛以潤之。飴糖甘以和之。姜枣以和陰陽氣。和血盈而中陰建立矣。

傷寒二三日心中悸而煩者。小建中湯主之。嘔家不可用建中湯。以甜故也。

傷寒二三日猶言外感病二三日也。心中悸而煩者。邪入少陽。少陽經貫心。風為陽邪。心血少不能制陽邪。而悸煩也。小建中湯解陽邪以益血也。嘔家平素有嘔逆溫勝之人也。建中味甘。

心悸

能引溫雖有慄煩亦必因溫不可用建中也

傷寒四五身熱惡風頭項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡湯主之

身熱惡風頭項強中風本症也脇下滿少陽循脇邪入少陽也少陽有風一為陽邪則陽甚陰弱手足諸陽之本故溫陽弱津竭故渴小柴胡以解少陽之風也

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或心下悸或脇下痞鞕小便不利或不渴身有微熱或咳者小柴胡湯主之若胸中煩而不嘔去半

夏人參加括姜炙一枚若渴者去半夏加人參合前成四兩半括  
姜根四兩若腰中痛者去黃芩加白芍三兩若脇下痞硬去大東  
加牡蠣四兩若心下悸小便不利去黃芩加茯苓四兩若不渴外  
有微熱者去人參加桂枝三兩溫覆取微汗愈若咳者去人參大  
棗生姜加五味半升乾姜二兩

少陽經行半表半裡風傳少陽則入併于陰則寒出併于陽則  
熱一出一入故寒熱往來也少陽往下胸貫膈絡腸風邪湊之  
故胸膈苦滿少陽之氣東方生之氣邪湊則生氣不揚且胆  
為清淨之官故默也少陽之氣不升則胃氣不發故不欲飲

食少陽貫心風為陽邪入心故心煩風性上行故嘔則風木之氣條暢故喜之此少陽中風本症其或之云者隨所兼之邪而見也小柴胡湯柴胡解表黃芩解裡人參扶元甘草和中半夏溫內總以守其閑樞使邪無內向也如煩而不嘔風薰熱也在胸邪在陽位也人參扶陽半夏溫燥故去之加括萎以清心包絡渴者肺津液苦也去半夏之燥加花粉增人參以潤之腹中痛脾血少也去黃芩之苦燥加白芍以收脾氣脇下痞鞕風薰濕也去大棗之甘潤加牡礪以堅心下悸小便不利膀胱水氣乘心也去黃芩之陰寒加茯苓以伐水不渴外有微

热邪在表而不在于内也。去人参之内补加桂枝以解表。啖者阴火乘肺也。去人参姜枣之温补加北味乾姜以歛之。

伤寒六七日。发热微恶寒。肢节烦疼。微呕心下支结。外症未去者。

柴胡加桂枝汤主之。

以上二三日三四日四五日五六日六七日。邪传速之日期也。发热恶风。寒中风本症也。肢节四肢关节也。烦疼风邪乘之。血不濡也。呕者风邪上连也。支结于心下也。风性强直也。外症即发热恶寒未去也。柴胡以入少阳加桂枝以解风邪也。

柴胡加桂枝汤。桂枝一两。黄芩一两。人参一两。甘草一两。夏

二合  
半  
芍藥一兩  
大棗一枚  
生姜一兩  
半  
柴胡四兩  
右九味以水升煮取  
三升去渣分溫服

少陽宜小柴胡一定不易者也。以煩痺支結甚而惡寒微已見  
血少之徵。不勝重亡津液故加桂枝。雖曰中風本方。實建中之  
胚胎養血之神劑也。

傷寒六七日無大熱。其人躁煩者此為陽氣入陰故也。

六七日當陰陽極而來復之時。如不復則入陰分矣。無大熱。  
入內也。热邪入陰故躁煩。出于心躁出于腎也。少陽乃陰陽  
之界。風為陽邪。風邪入陰經故曰陽氣入陰也。

發汗。亡陽。讞語者不可下。與柴胡桂枝湯和其營衛以通津液。後自愈。

風症為陽，盛則陰虛。汗乃血化。故風症在太陽已不可汗。況少陽少血之經乎。故發汗。多則亡津液。而胃燥讞語也。不可下者。內無結屎也。胃燥。故用柴胡桂枝湯。則津液通而愈也。

傷寒中風。有榮胡症。但見一症便是不必悉具。

傷寒水經中風症。但有一少陽症。即用柴胡和之。不必諸症具。方為少陽中風也。以上十節少陽中風症也。

以下歸人少陽傷寒婦人中風發熱惡寒。經水蓬來。得之七八日。熱退除而脉遲身涼。

胸脇下滿如結胸狀讙語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之

婦人中風正發。热寒。適值徑行。徑行七八日。則血海乾枯。因而热入血海。外体热除。身凉。中风脉浮缓者邪。既入内。一病而緩脉变遲也。血海又血室。即衝脉。起于氣街。少陰夾脰上行至胸中。而散。故热入血室。即胸脇滿如結胸也。讙語者。血乾枯而热入。則胃火燔也。期門二穴。在不容兩旁。各去同身寸之一寸五分。肝之膜也。肝藏血。室屬肝。刺期門以瀉血室之邪也。

婦人中風七八日。續得寒熱。發作有時。注水適逝者。此為熱入血室。其血必瘀。故使如瘡狀。發作有時。小柴胡湯主之。

前之熱入血室。由中風在血來之前。血去邪入。血室無血。而渾是邪。故用刺法以瀉。實此之熱入血室。由中風在血來之後。邪乘血半離血室而入之。血與熱搏。所以血結。正與邪爭。有如瘡狀。而休作有時也。邪半實而血半虛。故用小柴胡和解之。蓋血係衝脈。係于肝經。少陽屬胆。上附肝。小柴胡和解少陽。故入衝脉。解血結也。

血弱氣盡。腠理開。邪氣因入。與正氣相搏。結于脇下。正邪分爭。注

來寒熱休作有時默々不欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也小柴胡湯主之

陰者中之守也徑水逕來適斷則血弱而中之守空所以陽氣亦不能固腠理以衛外氣亦盡而外邪因入血室也血室肝之所主攝入血室肝部有邪氣與本經正氣相搏相搏結于腸下肝胆之部分與正氣相爭并于陰并于陽注來寒熱休作有時也邪正交爭則少陽生氣不揚故默々胆氣不升胃陽不發故不欲飲食也血室屬肝連入腸下胆經故曰藏府相連邪結腸下結處必痛雖在下邪入必上衝木性善升肝胆屬木

男子入血室由子熱

熱歸陽

女子入血室由風

風歸少陽

木病其邪必高故上升而嘔吐也小柴胡主之者十一藏皆決于胆况血室肝部之邪肝胆同帰一治者乎男子熱病熱入血室在陽明例中女子中風熱入血室在少陽例中同一熱入血室也何有少陽之殊蓋男子下血無常女子經行有定期于熱歸陽明一由于風歸少陽以類而分也以上三節婦人少陽中風熱入血室也

鈔汗之法  
傷寒五六日頭汗出微惡寒手足發心下滿口不欲食大便硬脈細者此為陽微結必有表復有裡也脉沉在裡也汗出為陽微假令純陰結不得復有外症悉人在裡此為半在裡半在表也脉

雖沉緊不得為少陰病。所以然者。陰不得有汗。今頭汗出。故知非少陰也。可與小柴胡湯。設不了了者。得屎而解。

陽微結者。陽衰邪結于半表半裡也。結則上下不通。故津液壅上。而汗出于頭。津不通下。而便燥于內。結則陽不和于陰。故心下滿而不食。脉細而沉緊。陰不和于陽。故惡寒而手足冷也。汗出惡寒表症也。便鞕滿而不食。裡症也。表裡俱病。故為陽衰邪結。少陽之症也。汗出雖陽微。而非無陽之症。如純陰無陽。則結在裡。而外無症。今症半在表。半在裡。即知非無陽。而屬一陽之少陽。經症矣。脉雖沉緊。因屬寒邪。而非純陰結少。

陰症也。陰結屬少陰者少陽之樞也。蓋陰主內而無活。今有活故知非少陰也。症屬半表半裡。雖係寒邪。亦可用小柴胡。和其樞也。服藥後仍不精明者。結屎未去。胃陽未和也。屎去則胃陽和。必寒散而愈矣。

太陽病十日已去。脉浮細而嗜卧者。外未解也。設胸滿脹痛者。與小柴胡湯。但浮者與麻黃湯。

太陽病已十日之久。脉浮細而嗜卧。外無他症。此係病後陰虛神倦。表解欲愈之形也。若脉浮細而嗜卧。兼胸脹滿痛。胸脹乃少陽經行之地。則邪入少陽。少陽少血。神昏而嗜卧也。宜以小

崇胡湯和解之。若嗜卧而脉但浮，乃表解病在太陽。  
虛寒甚而嗜卧也。仍用麻黃湯以散其寒也。以上二節少陽  
傷寒症也。

婦人傷寒發熱。經水遣來。晝日明。暮則譫語。如見鬼狀。熱入室  
故也。母犯胃氣及上二焦必自愈。

寒為陰邪。發熱者太陽表氣蒸熱也。經水遣來。血去之後。而血  
室空虛。標熱入內。因而胃燔。暮者申酉戌時也。申酉成陽。卯  
旺時陽明屬胃。故至暮則胃燔。如見鬼而妄言。然陰症屬陰寒  
標氣之熱。邪甚輕。故除陽明王時即當晝日正陽之候。胃往