

豫醫雙璧

傷寒補亡論三

三冊



傷寒補亡論卷第十

不可下四十七證

只寔理中証

仲景曰脉濡而弱弱反在關

關云關下三分也

濡反在巔

關上三分也

微反在上

寸口也

濇反在下

尺部也

微則陽氣不足濇則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩濇則無血脈而且寒

陽微不可下下之則心下痞鞭

陽氣已虛陰氣內甚故心下痞鞭

龐氏以氣血俱不足用小建中湯

常氏云下后心下痞鞭用增損理中丸

又曰動氣在右不可下下之則津液內竭

肺之動也下之傷胃動脾故津液內竭

咽燥鼻乾

肺屬金頭主燥也

眩心悸也

肺主氣而虛也

龐氏以咽燥鼻乾宜竹葉湯

又曰動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇

肝之動也下之損脾而肝氣益勝復乘于脾故

腹內拘急食不下動氣更劇也

雖身有熱臥則欲蹠

以裏氣不足故身雖有熱而臥則欲蹠

龐常皆云先服乾姜甘草

湯后服小建中湯

又曰動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自息欲得水自灌常氏云

宜小建中湯

心之動也下之則傷胃內動心氣心為火主熱經曰心所生病者掌中

之陽病則身上浮冷而熱肝自泄欲得水自灌作表寒裏熱也

又曰動氣在下不可下下之則腹脹滿卒起頭眩食則下清谷心下痞也

腎之動傷也

脾腎氣則動腎寒乘脾故有腹滿頭眩下清谷心下痞之証也 龐常皆云心下痞宜半夏瀉心湯

又曰咽中閉塞

胃已不利也

不可下下之則上輕下重

閉塞之邪為上輕傷氣為下重

水漿不下臥則

欲蹠身急痛下利日數十行

水漿不下等症皆虛寒也

常氏云咽中閉塞可烏扇煎下利宜四逆

湯

又曰諸外實者不可下

表熱下下之為逆

下之則發微熱

下後裏虛表熱內陷

亡脉厥者當臍握熱

陽氣沉陷

故亡脈厥而當臍熱

雍曰宜服去白朮理中湯以朮利腰臍間血故也

又曰諸虛者不可下下之則大渴求

引一作

水者易愈惡水者劇

虛家下之為重虛內竭津液故令大渴求

水者陽氣未竭猶可愈弱水者陽氣已竭則難可制

雍曰宜小建中湯

又曰脉濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦為陽運微為陰寒上實

宜桂枝湯加
茯苓小豆

未下桔梗湯
合豬膚湯下
后甘草干姜
合麻黃

宜柴胡桂枝
干姜湯

下虛意欲得溫微弦為虛虛者不可下也微則為欬欬則吐涎下之則欬止而利因

不休

威於寒則受病微則為欬甚則為泄肺受微寒為欬則脈亦微也下之氣下欬雖止而利因不休奪正氣而成危惡也

利不休則胸中如

重齧粥入則出小便不利兩脇拘急喘息為難

裏氣損也

頸背相引臂則不仁極寒反汗

出身冷若冰

表氣損也

眼睛不慧語言不休

表裏損後陰陽俱脫

而谷氣多入此名除中

應不能入而谷多入

是胃氣除去也一云消中

口雖欲言舌不得前雍曰此不治之証故諸家無治法惟龐氏云諸脉

濡弱微虛細相搏俱不可下

又曰脉濡而弱弱反在關

陰氣弱

濡反在巔

陽氣外弱

浮反在上數反在下浮為陽虛數為

無血

浮為虛浮在上則衛不足故云陽虛數亦為虛數在下則營不足故云亡血

浮為虛數為熱浮為虛自汗出而惡寒

表虛不在風寒

數為痛振寒而慄微弱在關胸下為急喘汗而不得呼吸呼吸之中痛在於

脇振寒相搏形如瘡狀醫反下之

亡血則不能濡潤經絡溫養腑藏邪氣傳裏也裏虛遇邪胸下為急喘汗脇痛振寒如瘡此裏邪未

延表邪未解之時醫反下之裏氣益虛邪熱內陷

故令脉數發熱狂走見鬼心下為痞

此熱陷於中焦者也

小便淋瀝

少腹甚鞭小便則尿血也

若熱氣深陷則客于下焦

常氏云可小柴胡湯鵲石散延胡索散

又曰脉濡而緊四字題濡則衛風微緊則營中寒陽微衛中風發熱而惡寒營緊胃氣

冷微嘔心內煩醫為有大熱解飢而發汗一誤亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛喘

裏先不足發汗又虛卒起而頭眩客熱在皮膚悵悵不得眠不知胃氣冷緊寒在關元技巧無

所施汲水灌其身再誤客熱應時罷慄慄而振寒重被而覆之三誤汗出而冒巔體惕而

又振愈使陽氣虛小便為微難亡陽也寒氣因水發清谷不容間下為清谷嘔變又脹出上為嘔吐顛

倒不得安手足為微逆外為厥逆身冷而內煩內為煩燥遲欲從后救安可復追還此條胃冷營寒陽微

中風發熱惡寒微嘔心煩當先溫其胃而後和其表醫不救裏但責表熱所以誤也常氏云可灸關元雍曰仍服通脉四逆湯

又曰脉浮而大浮為氣實大為血虛血虛為無陰孤陽獨下陰部者陽乘陰虛下至陰部小便

當赤而難胞中當虛今反小便利而大汗出法應衛家當微今反更寔津液四射營

竭血盡乾煩而不眠血薄肉消而成暴液一作黑液醫復以毒藥攻其胃此為重虛客陽

去有期孤陽因下而脫去必下如污泥而死常氏云可小建中湯已經下者不治

又曰脉浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷營營衛俱病骨節煩疼當發

當與理中四逆湯

此營衛俱傷宜桂枝麻黃各半湯

宜用導法若邪熱內陷不得解涼亭故下之乃將錯就錯之法也

利不止用白頭翁湯

此附子湯証

宜桂枝人參湯

其汗不可下也常氏云可桂枝麻黃各半湯雍曰仲景可汗證中只用麻黃湯

又曰跌陽脉遲而緩胃氣如經也跌陽脉浮而數浮則傷胃數則動脾此非本病醫

特下之所由也營衛內陷其數先微脉反但浮其人必大便鞭先透一句氣噫而除

何以言之本以數脉動脾其數先微故知脾氣不治解便鞭氣噫之故大便鞭氣噫而除今

脾反浮其數改微邪氣獨留心中則飢邪熱不殺谷潮熱發渴此又脾氣不治之故更補說一段病情

數脉當遲緩此句是說跌陽之脈本當遲緩脉因前後度數如病者則飢數脉不時則生惡瘡也常

氏云可小柴胡湯惡瘡漏蘆湯

又曰脉數者久數不止止則邪結正氣不能復正氣却結于藏故邪氣浮之與皮毛

相得脉數者不可下下之必煩利不止常氏云可柴胡桂枝湯止歇止也脈數而止邪結陽分故不可下

又曰少陰病脉微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脉弱濇者復不可下之雍曰宜建

中湯此為少陰汗下者辨脈而防其誤也

又曰脉浮大應發汗醫反下之此為大逆雍曰誤下宜四味理中丸誤下則中氣受

傷故用是湯

屬藏者涼膈
散下之屬府
者先桂枝湯
汗之後承氣
湯下之

先與桂枝湯
次大柴胡湯

可與桂枝人
參湯只寔理
中湯

此麻黃湯症

又曰脉浮而大心下反鞭有熱屬藏者攻之不令發汗屬府者不令洩數洩數則大便鞭汗多則熱愈汗少則便難脉遲尚未可攻常氏云可小柴胡湯雍曰此一證中有誤字脉經云攻之不令微汗屬府洩數則堅汗多則愈汗出小便難文皆有悞不能通今脉經盡改如前文不如此語不可考矣俟求舊本證之

又曰二陽併病太陽初得病時微發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續微汗出不惡寒若太陽證不罷者不可下下之爲逆常氏以爲太陽證不罷宜柴胡桂枝湯

又曰結胸証脉浮大者不可下下之則死常氏云可小陷胸湯增損理中丸經餅灸法

又曰太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下常氏云可麻黃杏子甘草石羔湯

又曰太陽與少陽併病心下鞭頸項強而眩者不可下常氏云可小柴胡湯雍曰仲

景刺大椎肺俞肝俞見太陽證中

先與四逆散
後有下証然
後下之

此桂枝湯証

又曰諸四逆厥者不可下之虛家亦然常氏云可當歸四逆湯龐氏云若下證悉見
四逆者是失下后氣血不通使然手足微厥掌心常溫時復指梢溫即可下之內有
熱也

又曰病欲吐者不可下常氏云可半夏加橘皮湯

又曰太陽病有外證未解不可下下之爲逆常氏云可桂枝麻黃各半湯雍曰依可
汗證中用桂枝二麻黃一湯

又曰病發于陽而反下之熱入因作結胸病發于陰而反下之
下之因作痞常氏云結胸可大陷胸湯痞可半夏瀉心湯

之一作汗及脉經皆作
官本

又曰病浮而緊而復下之緊反入裏則作痞常氏云可小陷胸湯瀉心湯雍曰半夏
瀉心湯

瀉心則可小
陷胸則不可
可涼膈散

可甘草干姜
湯

又曰夫病陽多熱者下之則鞭常氏云可小柴胡湯

又曰本虛攻其熱必噦雍曰宜半夏生姜湯類要四味橘皮湯

可與只寔理
中不可用桂
枝芍藥

此烏梅丸証

可吐瓜蒂散
不可吐四逆

四逆加人參
湯証

又曰无陽陰强大便鞭者下之結陽必清谷腹滿常氏云可蜜煎導之

又曰太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞭常氏

云可桂枝加芍藥湯胸中結鞭增損理中丸太陽之脈布胃中邪氣壅而爲腹滿不得降吐而食不下下不得升則自

利腹痛本經表邪傳裏故不常痛而時或痛也若下之則陽邪結于胸下爲結鞭若脈浮可桂枝湯

又曰厥陰之爲病消渴木盛氣上沖心肝氣通心木生火也心中疼熱飢不欲食食則吐螬邪木

胃干下之利不止常氏云下之利不止宜四逆湯餘見厥陰本証

又曰少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐邪在胸中故飲食入口始得之手足寒

脉弦遲者此胸中實不可下也陽受氣于胸中邪留于胸中陽氣不得宣發故常氏手足寒而脈弦遲蓋熱實可下寒實不可下也

云飲食入口則吐可瓜蒂散餘見少陰本証

又曰傷寒五六日不結胸腹濡脉虛復厥者不可下此爲亡血下之死常氏云可小

建中湯已下不治此當歸四逆湯証若謂久寒者加吳茱萸

又曰傷寒發熱但頭痛微汗出發汗則不識人重之則喘不得小便下之則短氣小

宜五苓湯加
葱豉或葛根
黃芩黃連湯

黃連湯連理
湯并用

小柴胡証

便難頭痛背強或腹滿加溫針則呾常氏云可小柴胡湯已汗者桂枝加附子湯汗
出而喘者麻黃杏子甘草石羔湯已汗者五苓散加溫針者芍藥地黃湯
未可攻

又曰藏結无陽証不往來寒熱或寒而不熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也常氏
云可刺關元穴在臍下又曰可刺大赫在腹部第二行雍曰灸尤奇

又曰傷寒嘔多雖有陽明証不可攻之雍曰不可攻之恐厥逆也小半夏加茯苓湯
生姜橘皮湯

又曰陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭者不可與之若不大便六七日
恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若
不轉失氣者此但初頭鞭后必溏不可攻攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則
噦其后發熱者大便必復鞭而少宜小承氣湯和之不轉失氣者切不可攻也

又曰傷寒中風醫反下之其人下利日數十行谷不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾

嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也屬甘草瀉心湯

又曰下利脉大或浮大者虛也以強下之故也設脉浮革因而腸鳴屬當歸四逆湯
又曰陽明病面合赤色不可攻之攻之必發熱色黃小便不利也常氏云可五苓散
又曰陽明病當心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈常氏云心下鞭滿者可半夏瀉心湯已攻而利者四逆湯

又曰陽明病自汗出若發汗小便自利者此爲津液內竭雖鞭不可攻之當須自欲大便宜蜜導而通之若土瓜根及豬胆汁皆可爲導龐氏云不當下而強下之令病人腸胃洞泄而死

可下四十九証

仲景曰大法秋宜下

又曰凡服下藥宜用湯勝丸散中病便止不必盡劑也

又曰陽明病發熱汗多者急下之宜大柴胡湯龐氏云發熱不惡寒汗多邪熱迫津入腑

又曰少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯日甚後而邪熱傳少

則腎水不供而胃土之
尅制太過故下之急

虛用理中湯
實用承氣湯

又曰陽明少陽併病必下利其脉不負者順也負者失也互相尅賊名爲負也龐氏曰陽明土其脉大少陽木其脉弦若合病土被木賊加之下利則胃已困矣若脉不弦爲土不負弦者爲土負必死雍曰此合病一証下至名爲負也而終按本論原誤錄宿食一証相連者非也脉經以宿食別作一証爲當蓋脉滑數有宿食故仲景可用承氣湯若胃爲木尅因而下利安有用承氣之理今依脉經離而爲二宿食証依仲景用承氣湯惟合病下利缺治法今以負不負宜理中丸厥者宜四逆湯仍瀉丘墟陽陵泉補三黑穴龐朱二氏依舊本合爲一証疑其非大抵讀仲景論仍須以脉經參校之



又曰少陰病下利清水

陽邪暴瘧之極反與陰邪無異

色純青心下必痛口乾燥者可下之

此則陽邪之驗

也宜大承氣湯餘見少陰本証更詳之

又曰下利三部脉皆平按之心下鞭者急下之宜大承氣湯龐氏曰凡脉沉細數爲熱在裏又兼腹滿咽乾或口燥舌乾而渴者或六七日不大便小便自和或目中瞳子不明无外証者或汗后脉沉實者或下利三部脉皆平按之心下堅者或連發汗不惡寒者或已經下其脉沉按之有力者皆宜大承氣湯

又曰下利脉遲而滑者內實也利未欲止當下之宜大承氣湯雍曰常氏疑本論之誤故欲以葛根黃芩治下利殊不思仲景以承氣下宿食而合病下利原无治法也葛根黃芩湯以太陽未解誤下之利不止者既協熱下利之表証未退故可用今合病下利胃氣傷困只當救胃宜用溫藥故雍以理中四逆補其胃氣已而不加以寒之則胃谷絕矣仲景于此一証特論脉負不負蓋欲後人當思陽明少陽土木尅賊之理而治之可謂盡善矣以是知合併病之論雖二陽俱受病邪氣俱當去又須審

二經五行之氣母金相尅賊抑強扶衰以致和氣不使復生一秦助桀爲虐也如是則吳越可同舟共濟矣此証和二經退邪氣與人事不少異非天下至精不能與于此然生胃氣制少陽木亦用金石藥嘗見明醫治少陰自汗自利不止用金液湯大効既非古藥不敢以爲然必不得已而用亦須七鍊九鍊必力重者用之其鍊力輕者復可下宿食以虛人老人不敢用此承氣也仲景問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脉浮而大按之反濇尺中亦微而濇故知有宿食當下之宜大承氣湯又曰下利不欲食者以有宿食故也當下之宜大承氣湯

又曰下利已差至其年月日時復發者以病不盡故也當下之宜大承氣湯

又曰病腹中滿痛者此爲實也當下之宜大承氣湯大柴胡湯

又曰下利脉反滑當有所去下之乃愈宜大承氣湯

又曰腹滿不減減不足言當下之宜大柴胡湯大承氣湯雍曰減不足言者言不甚減也論言太陽發汗不徹不足言與此同意俗語所謂不濟事者是也

又曰傷寒後脉沉沉者內實也下解云宜大柴胡湯雍曰須沉數有力可下之雖沉而微弱遲皆不可下也

又曰傷寒六七日目不了了睛不和无表裏証大便難身微熱者此爲實也急下之宜大承氣湯大柴胡湯

又曰太陽病未解脉陰陽俱停必先振慄汗出而解但陰脉微一作尺脈實者下之而解

宜大柴胡一法用調胃承氣湯脉經云但陰微者先下之而解羅氏作陰實雍曰文當從脉經及龐

氏雍謂當作但陰脉微而尺脉實者先下之而解

又曰脉雙弦而遲者必心下鞭脉大而緊者陽中有陰也可下之宜大承氣湯

又曰結胸者項亦強如柔瘕狀下之則和龐氏曰宜大陷胸丸又曰病人无表裏証

發熱七八日雖脉浮數者可下之宜大柴胡湯

又曰太陽病六七日表証仍在脉微而沉反不結胸其人發狂者必熱在下焦小腹當鞭滿而小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏也宜下之以抵

當湯

又曰太陽病身黃脉沉結少腹鞭滿小便不利者爲无血也小便自利其人如狂者血証諦也屬抵當湯

又曰傷寒發熱少腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之宜抵當湯

又曰陽明病發熱汗出者此爲熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴飲水漿者以瘀熱在裏身必發黃宜下之茵陳蒿湯雍曰先服茵陳五苓散黃退則不須更下

又曰陽明証其人喜忘者必有蓄血所以然者本有久瘀血故令喜忘尿雖鞭大便反易其色必黑宜抵當湯

心爲清虛之府有久瘀血則氣不清故令喜忘

又曰汗出譫語者以有燥屎在胃中此爲風也須下之過經乃可下之下之則愈宜大柴胡大承氣湯過經乃可下下之若早語言必亂以表虛裏實故也

又曰病人煩熱汗出則解復如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脉實者可下之宜大

柴胡湯大承氣湯

又曰陽明病譫語有潮熱反不能食者

熱實則不能食

胃中必有燥屎五六枚也若能食者

熱未實

但鞭耳屬大承氣湯証

又曰下利譫語者有燥屎也屬小承氣湯初一服譫語止若更衣者停后服不爾盡與之

又曰得病二三日脉弱无太陽柴胡証煩躁心下痞至四五日雖能食以承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞭后必澹此未成鞭也攻之必澹須小便利尿定鞭乃可攻之宜大承氣湯又曰太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漿漿汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也屬十棗湯

又曰太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外未解尙未可攻當先解其外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯龐云不惡寒爲外解