

名方類證醫書大全卷十九

癰疽瘡瘍

凡瘡之痛痒自屬虛實寒熱故痛而實者爲熱虛而痒者爲寒
經云諸瘡痛癢皆主於心以心主血而行氣氣血凝滯而爲瘡
疽瘡瘍闊大一寸已上曰癰疽一寸以下曰瘡瘍諸瘡之中惟
背疽丁瘡最爲急證其初發也使身體或先熱而後惡寒或先
瘡而後痛若其不痛最爲惡證且如背疽始生如黍粟粒大終
有莖時使用艾於痛處灸之痛則灸至痒痒則灸至痛使毒氣
隨火而散若失之於初瘡勢已成又當審其虛實寒熱實則
清之虛寒則溫之後毒消膿潰方爲可治之證丁瘡者必發於
手足之間生黃泡其中或紫黑色有一條如紅線直上倉卒之

際急宜以針於紅線所至之處刺出血然後以蟾酥乳膏
等於正瘡上塗之針時以病者知痛出血為好否則紅線入腹
攻心必致危困至若瘰癧頸疽脉癰之類皆毒氣鬱積於內發
而為此治之皆須解毒潰膿若氣血弱者又須生之此一定之
法瘡癰疥癬之類隨其臟腑所受冷熱調之所貴氣血宣流自
失其痛痒矣如脚外癰瘡久年不愈者多是腎水流注又有脾
水潰溢治各有方隨證選擇

初發

一

冬酒

治癰疽發背不問疽發何處一切癰腫及

婦人乳癰皆有奇効

忍冬藤生取一把以葉入沙盆內爛研入餅子酒少許生餅
酒尤佳調和稀稠得所塗付四圍中心大留一口洩其毒氣
其藤只用五兩用木槌微打換不犯鐵器

右二味入砂瓶內以水二碗文武火慢煎至一碗入無灰酒

進一服如無生者可用乾者但力輕耳

(二) 治癰疽初發腫痛或少年熱盛發背等皆宜宜

毒利下熱退為度

紫背車熬一 及鹽泥固濟火煨紅地上出火毒 輕粉

甘草 各一多 大黃 五多 黃芩 漏芦 瓜根 各半兩

右為末每二多薄荷湯或酒下

(三) 治一切積熱結核瘰癧癰疽瘡癤

沉香 不見火 連翹 去蒂 射干 桑寄生 升麻 以丁香 去枝煨

獨活 蒸活 木通 去節 升麻 大黃 蒸各三分 甘草 生一分

乳香 研一分 麝香 一多半研 舶上青木香 不見火一分

右吹咀每服四錢水一盞煎七分空心熱服以利下惡毒為

度本方有竹瀝芒硝隨熱輕重當自添減

四 治一切癰疽瘡癤腫毒因氣滯血熱而生者

赤芍藥 白芷 當歸 川芎 大黃

甘草 生乾地黄 苡蓂 黃芩 各等分

右咬咀每服四錢水一盞酒一盞煎至兩盞去滓熱服兼治

婦人乳癰等瘡

五 治氣体虛弱之人患

背瘡頸疽不知痛痒瘡勢不依急宜服此以生血潰膿有熱者

不可服

宣熱 六 治癰疽發背及一切熱毒成瘡赤腫者

漏蘆 黃芩 白及 麻黃 各二兩 大黃 三兩

白欬 升麻 枳殼 去炒 芍藥 粉草 各二兩

右咬咀每服四盞水一盞煎七分空心熱服本方有芒硝今

去之若見熱而實者加大黃五兩或加芒硝皆可

(七) **宣熱拔毒大黃湯** 宣熱拔毒大便秘者方可用此

大黃剉如豆大每服三錢水煮服即快利

追毒 (八) **追毒** 專治癰疽發背附骨疽諸般惡漏等瘡

雄黃 一兩 金頭蜈蚣 七個 頭尾脚足黃黃色研如泥

乳香 別研一兩 烏金石 即石炭袁州萍鄉縣有之二兩

沒藥 別研一兩 鯉魚膽 七個 乾者用之去皮臘月者尤佳

蟾酥 二兩 狗膽 一個 乾者用之去皮純黑狗膽月者尤佳

硃砂 一兩 狗寶 一兩 生用額狗腹中得之

輕粉 一兩 麝香 一兩 黃蠟 三兩 粉霜 一兩 別研

鉛白霜 一兩 頭首孩兒乳 一合

右先將頭首兒乳黃臘放在鉢內文武火化開用前藥末和成劑要用旋圓如麻子大每服二圓至五圓用白丁香七箇直者以新汲水化開送下狗寶圓腰以下病食前服腰以上

食後服如人行五里用熱葱白粥投之即以衣被蓋定汗出
為度已後只喫白粥常服十奇散留頭與四邊以烏龍膏貼
九
治癰疽疔漏諸惡瘡黑陷者先服狗寶圓次貼
以烏龍膏收腫散毒去赤暈然後用針刀開瘡納追毒丹使之
潰然後去敗肉排膿隨證治之

巴豆 七粒去皮心腹不去油研如泥 白丁香 一多

雄黃 黃丹 各一多 輕粉 一多 加蟾酥尤神速

右研和加白麪三多滴水為圓如麥狀針破瘡納之上覆以
乳香膏追出膿血毒物漏瘡四壁死肌不去不可治者亦以
此法追毒去死肌生新肉疾小者用一粒大者加用之

十
治癰疽發背一切惡瘡服此毒氣不內攻

麻油半斤銀器內煎十沸出候冷用無灰酒兩掬侵油內重
湯溫稍熱通口急服一日盡之為妙

十一

治癰疽發背及魚臍瘡人多不謂治諸

癰癧赤腫卅癰能解一切毒被狐狸毒鼠毒惡國河純毒食疫死牛馬肉毒或蛇犬惡虫所傷

五倍子 三兩 山慈姑 二兩 續隨子 去壳研去油取霜一兩

大戟 一兩半 射香 三錢

右除射香續隨霜外為末却入二味研勻用糯米煮濃飲為丸分作四十粒每一粒研生薑薄荷汁并花水研服合時宜用端午七夕重陽日合或遇天德月德日尤佳要在淨室焚香至誠端製毋令婦人雞犬孝子不具足人見之乃衛生之寶也

止痛 治發背癰疽一切瘡癰爛潰痛不可忍

當歸 川芎 桂 白芷

真桑豆粉 羌活 獨活 五靈脂 各五錢

乳香 沒藥 各三錢 白膠香 五錢

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸薄荷湯嚥下手足諸般損痛不能起者加草烏五錢用木瓜煎湯下

(十二) 追膿血消惡毒

木鱉子

去殼細剉

當歸

各一兩

柳枝

七八寸剉之

以上以清油四兩慢火煎令黑色次用

乳香

沒藥

各半兩

白膠香

明淨者四兩共研細入油

煎化以綿濾之

右再治淨鐵銚又傾前藥油蠟在內候溫入黃丹一兩半以兩柳枝攪極勻再上火煎不住手攪候油沸起住攪直待注在水中成珠不散為度秋冬欲軟春夏欲堅傾在水盆中出火毒搜成劑收之遇用貼開

(十四)

治發背肉潰及諸惡毒衝心痛不可忍多令人

嘔吐應手毒瘡並皆治之

藁豆粉 四兩 乳香 好者二兩

右同研極細每服二錢新汲水濃調食後服

〔未潰〕

〔十五〕

瘡腫毒方專用塗諸瘡疽

川烏

蚌粉

草烏

海金沙

赤小豆

天南星

右為末用生地黄汁調塗患處

〔十六〕

〔非膿〕

治一切瘡癰癰毒已破未破悉皆治之

地蜈蚣

赤芍藥

當歸

甘草

各等分

右為末每服二名溫酒調下不拘時

〔十七〕

〔復〕氣散治諸氣逆耳聾腹癰便癰瘡疽無頭止痛

消腫

青皮

陳皮

各四兩

川山甲

炮

括萎根

各三兩

加金銀花

連翹

各一兩

甘草

三兩

生熟

各半

右為細末熱酒調下

治發背惡瘡

懸萎 一个
大黃 一两
當歸 五钱
金銀花 一
皂角刺 一两

右剉碎用酒一椀煎至七分去滓溫服如有頭者加黍粘子

十九 因破血散治一切癰疽瘡毒未成者自然消之

已成者能令速潰凡瘡瘍者多是血虛此藥最能消風生血

人參去芦黃耆鹽湯洗當歸洗焙各二兩厚朴姜製甘草生用

黃耆鹽湯燉當歸洗焙各厚朴姜製甘草生用

桂心不見 桔梗去芦 川芎
防風去芦 白芷各一兩

右同爲末每服三分熱酒調下不飲者木香湯調服

二十
胎前
金湯治發背瘡潰後因飲食有傷發熱不止

漏芦
連翹
梔子
黃芩
防風

石韋無以衆白皮代白茯苓生甘草升麻

人參
各二錢
黃耆
二兩

爲粗末每服四大盃水一錢煎六分去滓溫服

二十一 湯 瘡疽已潰大渴不止

綿黃芪

六兩 鹽水潤濕飯上蒸三炷 焙乾剉粉 草生半炙

右為末每二錢白湯下當湯水服

二十二

治証同上方見虛勞門

二十三

通治 治諸瘡腫發背癰疽 一味洗淨去心焙乾為末酒調二

錢澄清服以滓傳患處治一切癰疽發背癰毒惡候

二十四

治發背已潰未潰者最有神效及一切癰疽

厚朴

二兩 薑汁製 陳皮 二兩 蒼朮 五錢 甘草 二兩 炙

右入桑黃菰五子同為末瘡潰則乾摻之未潰則油調塗之

二十五

治發背癰疽一切惡瘡

甘草

鮮切為末 沒藥 一分 研 大瓜蔓 一枚 去皮

右用無灰酒三升熬至一升放溫頓服如一服不盡作三次

二十六

治諸瘡腫發背癰疽

乾柞木葉 乾荷葉 乾萱草根 甘草 地榆各一兩

右剉每服五升水煎服未成者自消已成膿者自乾

二十七 **瘰癧** 治一切癰疽服至一兩已上無不効辟毒止痛

生肌末潰已潰皆可服

白礬 一兩 黃蠟 半兩

和丸梧子大每服十九丸漸加至二十九丸白湯或酒下

洗方 二十八 **瘰癧** 治一切癰疽腫壞消毒氣去惡肉凡瘡有

口便要此湯洗

白芷 生甘草 羌活 露蜂房

黃芩 赤芍 當歸各等分

右用猪前蹄兩隻一斤水煮汁湯以湯煎此藥去滓以湯溫洗

二十九 **瘰癧** 治諸癰癤

越桃 一名梅子 黃芩 甘草 當歸 羌活 白芷 各等分

右吹咀每用一兩水五椀煎至四椀去渣溫洗

三十一 **黃蜀葵** 治癰疽腫毒以黃蜀葵花用鹽摻收入磁器密

封經年不壞每用患處傳之若無花葉皆可

三十二 **透骨散** 治諸癰瘡及貼骨癰不破者不用針刀一服不

多時自透累有效驗

蛾口蠶用出子蛾兒蠶兒

右將蠶兒一個燒灰用酒調服即透切勿不可兩個三個蠶兒

燒服若服一個只一個瘡口若服兩個三個即兩個三個瘡

口切勿輕忽

傳貼 三十二 **龍膽** 治一切腫毒癰疽收赤暈

木鱉子 半夏 各一兩 水粉 四兩 草烏 半兩

右於鐵銚內慢火炒令轉焦為末出火毒再研以水調傳瘡

三十三 **龍膽**

黃栢

川山甲 炒焦各一兩

檀香

木香

各半兩 雞肚至七枚生用焙

右為末每用少許候大膿出盡方可搽瘡口上

三十四

神異膏

治癰疽壞爛及諸瘡口不合

雄黃

一兩

滑石

煨半兩

右為末洗后搽瘡上以綿子覆護足洗後破爛者用此貼之

乳癰

三十五

瓜蒌仁

三錢酒搗爛入乳香末一錢熱酒調服熱甚者加石

膏末少許

三十六

蔓荊子

一味以酒搗爛去滓溫酒熱服以滓封傳患處

心癰 治心癰作寒熱口乾飲水渾身痛腹內作熱頭面

赤先以

回生膏

次服

乳香散

五香連翹散

已潰者多服

內開

前之前按根於既愈之後大能順氣均血先服此使氣血和暢然後隨治疾無不安

何首烏

當歸

木通

赤芍

白芷

茴香

土烏藥

枳殼

甘草 各等分

每服四錢水酒相半煎病在上食後服病在下食前服熱多者水多酒少冷多者酒多水少煎 治証詳見外科精要補遺

發背

三十九治腎虛嗜飲過度外挾寒邪發為癰腫不可施以

涼劑宜入藥酒中煎服之兼用葱白橘葉椒葉酒洗

仍以酒洗貼之方並見前

肺癰

四十一治男子婦人嗽而胸膈隱痛兩脚腫滿咽乾口燥

煩悶多渴時出濁唾腥臭小便赤大便秘是肺癰宜先投

六神散四服虛者先投
方並咳嗽門

〔四十一〕
〔藥〕
治肺癰吐膿

薏苡仁
瓜蒌仁
桃仁各等分

右判每四錢先以葦葉一握水二錢煎取一半去滓入藥
煎七分食後服 一方不用葦葉用側柏

〔楊〕
〔四十二〕
治腸癰壯熱微汗氣急小腹痛大便澀已成未成

皆可用

當歸
甜瓜子 一合
蛇退皮 一尺

以咀每四錢水煎服利下惡物為妙

〔四十三〕
治腸癰未成膿腹中痛不可忍

木香
牡丹皮
敗醬
甜瓜子

赤芍
桃仁
芒消
大黃