

百代医宗

六

永樂太醫院頒行內外諸科方論百代醫宗目錄

甲集卷之一

原病賦

諸証綱目論

亢則害承乃制論

古養論

真中風河南山東風土之氣論

類中風証論

類中風江西浙江楚地南直四處地方總論

火証方論

飲食勞倦論

辯筋骨四肢論

氣少氣短論

失聲啞聲不同論

酒病論 聲音論

手背手心辯熱論

氣升論

隨証治血藥論

隨証治火藥論

木腎論

腎癢論

內外因脈歌

不內不外因脈歌

血榮氣衛論

火濕分治論

治病必求其本論

受胎論

婦人病原論

經病論

崩漏論

赤白帶下論

胎前論

胎前諸症論

產後三証論

硬乳論

藥性賦

乙集卷之二

診脈切要

左右手寸關尺三部診法

上下來去至六脈解

七種怪病歌

驗止斷死歌

五臟六腑人迎氣口分別論

四字脈訣

浮沉遲數診脈切要訣

十二支年分運氣

五運時行民病証治方畧

六氣時行民病証治方畧

五運主病切要

六氣為病切要

按四季順時節宣論

十二經見証切要

十二經絡臟腑病情藥性切身要錄

天千臟腑所屬定位

地支臟腑所屬流注

藥方名條治病捷應賦

瘡門捷徑用藥法

六經用藥確法

用藥根身稍三法

五味用法

五入五走

五多五傷

煮煉鹿角霜膠法

辯用硝黃巴豆誤人論

治十腫水氣病根主藥

丙集卷之三

風論

該傳大附子性

寒論

瘟疫論

附中寒論

暑論

附注夏論

濕論

燥論

火論

六鬱論

痰論

咳嗽論

哮論

喘論

丁集卷之四

癰論

痢疾論

嘔吐論

泄瀉論

霍亂論

水腫論

陰腫論

脹滿論

積聚論

癥瘕論

虛損論

癆瘵論

怔忡論

顛狂論

諸癇論

血論

五痺麻木論

秘結論

黃疸論

戊集卷之五

剛柔二症論

翻胃膈噎論

頭痛論

腹痛論

腰痛論

腸痛論

胸氣論

痛風論

痿論

盜汗自汗論

厥論

三消論

內傷論

吞酸吐酸論

新增木腎論

便濁遺精論

新增漏濁論

已集卷之六

淋閉附遺尿小便不禁論

欬逆論

嘈雜論

痞滿論

邪崇論

眩暈論

惡心論

惡寒論

發熱論

諸氣論

丹溪活套云

傷食論附傷酒方

關格論

結核論

梅核論

癰風論

跌撲傷損論附金瘡湯火等瘡

破傷風論

心痛胃脘痛論

注夏論

胃風論

脫肛論

腸風臟毒論

痼冷論

與集卷之七

耳論

鼻論

口舌唇三論

丹溪活套

牙齒論

面論

咽喉論

目疾証候

眼科所用藥性

目論

各臟所屬宜用某方并附詩訣

鍼灸類

服藥合藥煎藥訣

用蜜煉蜜法

點眼藥訣

辛集卷之八

婦人科總論

疝瘕論

血風肢體骨節痛疼論

疝瘕論

血膈論

經脈論

崩漏論

赤白帶下論

胎前論

期嗣論

轉胞論

產育論

生產分症七產論

產後論

附血分水分論

產後胎法病機要畧

謹按伯岐論

乳汁不通論

附婦人陰瘡交接出血陰挺陰癢陰蟲等症論

小產論

附產後一十九症問答奇方出自葛奎亭秘書

頸項強痛論

流注論

赤白遊風論

壬集卷之九

小兒脈法總歌

小兒科論

五癰論

諸疳論

黃疸論方

遺尿尿濁二論

語遲牙遲行遲總論

膿耳論

癰疾論

附小兒五疳病源妙方

附錢仲陽小兒諸疳論

諸蟲論

蠱毒論

鼻病論

大小便閉論

桃生論

吐瀉論

腹脹論

啼論

解顙論

脫囊論

脫肛論

疳論

弄舌論

龜背論

癸集卷之十

痘疹論

疹論

外錄痘疹方論于后

附陳氏痘瘡症

方論

痘疽瘡瘍論

乳硬乳癰論

痔漏論

癰論

疥瘡論

楊梅瘡論

背發腦發鬚發髭發四總論

疥癬論

臙瘡論

鎖喉瘡論

發乳瘡論

赤瘡瘡論

纏腸瘡論

骨槽風瘡論

五疳論

火赤瘡論

魚脊瘡論

喉閉瘡論

火殞瘡論

鴉跖瘡論

紅絲瘡論

陰蝕瘡論

漏睛瘡論

新刊大醫院頒行內外諸科百代醫宗十卷目錄終

新刻太醫院頒行內外諸科方論百代醫宗卷之六

太醫院醫官

金谿

省吾

徐紳

著述

振吾

張文英

參訂

金陵

少泉

李潮

刻行

淋閉論附遺尿小便不禁論

天淋症有五皆屬有熱小便淋瀝澀痛欲去不去不去又來曰淋瀝皆曰膏淋美味濕熱之物醇酒炙博之類鬱遏成疾以致脾土受害不能運化清濁相混故使肺金無助而水道不清漸成淋閉之患或七情鬱結以致心腎不交水火無制清陽不升濁陰不降而成天地不交之否前所謂淋有五者之別氣砂血膏勞是也若夫氣淋為病則小便澀滯常有餘瀝砂淋為病壅中有砂石而痛溺不得出是精氣結成砂石與溺俱出砂石出痛乃止血淋為病遇熱則發甚則溺血小便澀痛是也有血不痛者名曰溺血也膏淋為病溺濁如膏浮凝如脂勞淋為病遇房

勞則發痛引氣衝是也其有鼻準色黃者知其爲小便難也又云小腸
有氣則小便脹小便有血則小便澀小腸有熱則小便痛法當行滯清
熱疎利小便不可用補氣之藥氣得補愈脹血得補愈澀熱得補愈
又按冷而淋者其狀先寒戰而後小便所以冷氣與正氣交爭冷氣勝
則寒戰而淋正氣勝則寒戰解而得便溺也治當遂散寒邪扶助正氣
以爲主所謂淋者因腎虛而膀胱生熱水火不交心腎氣鬱陰陽乖舛
清濁相干畜在下焦故膀胱受病風寒濕熱之和客於胞中則不能化
而出故作五淋之症矣治法並宜流行滯氣疎利小便清解邪熱其於
調平心火此爲治之大綱領也心清則小便自利心平血不妄行晁不
可過用補藥是其法也閉者小便急滿不通其有氣虛血虛有痰有熱
有風閉者晁宜吐法以提其氣氣升則水自降蓋氣承載其水譬猶滴
水之器必上竅開而後下竅之水出焉使其吐之是開上竅之法所以
肺爲上焦膀胱爲下焦上焦閉而下焦塞以藥吐之開竅之義明矣

虛以參朮升麻等先服後用參芪諸藥調理有痰氣閉塞者用二陳加
香附木通探吐之有實熱者宜利之或用八正散所云大便動而小便
自通矣東垣曰分在氣在血而治之以其渴以其不渴而辯論之耳渴
而小便不利者熱在上焦氣分肺金主之宜用淡滲之藥茯苓澤瀉琥
珀燈心通草車前瞿麥扁蓄之類以清肺金之氣瀉其火以滋水之上
元也不渴而小便不利者熱在下焦血分腎與膀胱主之宜用氣味俱
陰之藥知母黃柏之類滋腎丸是也除其熱通其塞以滋膀胱腎水之
下元也治淋之法無越於此矣丹溪曰淋瀝有五皆屬於熱宜解熱利
小便山梔子之類慎不可發汗汗之必便血也如有年老氣虛淋閉者
參朮中帶木通山梔子取効尤捷屬腎虛極而淋者當補腎精而利小
便不可獨用利藥有瘀血而作淋者用牛膝膏及破血之藥詳証加減
痰熱隔滯中焦淋瀝不通用二陳湯煎服再探吐之以提其氣淋瀝者
有血因火之燥下焦無血氣不得降而滲泄之令不行焉宜補陰降火

以四物湯加黃柏知母或用四物湯煎下滋腎丸或曰熱鬱小便不通而成淋者宜用赤茯苓黃芩澤瀉車前麥門冬肉桂滑石甘草木通氣虛者加黃芪木香淋痛加黃柏生地黃夏月宜益元散甚中病情丹溪曰小便不通有熱有濕有氣結于下者宜清宜燥宜升有隔二隔三之治如曰肺燥不能生水則當清金此隔二也如不曰肺燥但膀胱有熱則宜瀉之此正治也如曰脾濕不運而精不升故肺不能生水則當燥脾健胃此隔三也用車前子茯苓清肺經黃柏知母瀉膀胱蒼朮白朮燥脾健胃是其治也又考淋之爲病或曰房勞或曰忿怒或曰醇酒厚味所致房勞者陰虛火動也忿怒者氣動生火也醇酒厚味者釀成濕熱也積熱久結下焦所以小便淋瀝痛不可忍初則熱淋血淋久則煎熬水液稠濁如膏如砂如石諸方散熱利小便爲主但能治熱淋血淋二症其膏其沙其石三者必須開鬱行氣破血滋陰古方用鬱金琥珀開鬱藥也用青皮木香行氣藥也用蒲黃牛膝破血藥也黃柏生干薑

陰藥也東垣用藥例法曰小腹作痛必用黃柏青皮疎肝黃柏滋陰益小腹小便俱屬肝腎之部不可不知也其遺尿失禁之症經曰膀胱不利爲癃不約爲遺大抵燥澀爲癃寒則不禁爲遺癃者卽淋也遺者卽失也亦有虛熱而滑者法當溫補其溺自禁東垣曰小便遺失者肺氣虛也宜以參芪補之小便不禁或頻數者古方多以爲寒而用溫澀之藥殊不知屬熱者多曰膀胱火邪妄動水不得寧故不禁頻數而來也年老之人多有此疾是膀胱血虛少陽之火偏旺也治當補膀胱陰血瀉火邪爲主而佐以收澀之藥如牡蠣山茱萸五味子之類是也不可用溫藥也病本屬熱故宜瀉火回水不足故火動而致之是以小便多來水益虧矣本宜補血瀉火治其本也收之澀之治其標也又者脉經曰少陰脈細而數爲氣淋症婦人則陰中生瘡脉見盛大而堅者生虛細而澀者必其所謂淋閉小便失禁遺尿同附一論學者宜審心玩索前哲之書爲良模一徹耳不可浪漫以聰明自恃者乎

多溺方 治腎虛多溺或小便不禁而濁

葫蘆巴 炒

故紙 炒

熟羊

益智仁

鹿茸 酒炙

川練子肉

用牡蠣粉炒去牡蠣

山茱萸

代赭石

酒浸淬七次研細末

赤石脂

各三分

海螵蛸

熟艾

醋炒

丁香

沉香

乳香

各二分

禹餘糧

煨醋淬五次研細

右為末煮糯米為丸梧桐子大每服五十九丸薑酒湯下

溲利湯

治諸淋

山梔

一錢五分

白朮

茯苓

朱苓

澤瀉 各一錢

滑石

二錢

甘草

二分

燈草

木通

八分

右切一劑煎服

五淋散

治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或如膏如砂如石

如豆汁等症

赤茯苓

赤芍

一錢

山梔仁

二錢

當歸

錢

甘草

生用一錢

條芩

八分

右切一劑煎服

車前子散

治諸淋小便痛不可忍

車前子

五錢

淡竹葉

二錢

赤茯苓

二錢

燈草

一錢

荊芥穗

二錢

右切一劑煎服

參苓琥珀湯

治淋莖中痛不可忍引脇下而痛

人參

五分

茯苓

五分

琥珀

二分

生甘草

一錢

玄胡索

七分

澤瀉

柴胡

各三分

川練子

一錢

當歸

四分

右切一劑煎服

滋腎丸

治小便閉而不渴此邪熱在血分也

黃栢

三兩

知母

二兩

肉桂

一錢

右栢母二味屬陰以同腎氣故能補腎而瀉下焦人桂與火邪同體故

曰寒曰熱用丸諸病在下焦者皆不作渴曰在血分故也熟水為丸梧

桐子大每服六十九丸白沸湯下

老人氣短小便不通四物湯加黃芪人參煎湯吞下此丸尤妙
八正散 治大人小兒心經蘊熱臟腑閉結小便赤澀癃閉不通五淋皆
能取効

車前

瞿麥

扁蓄

滑石

甘草

山梔子

大黃

木通 各等分

右切一劑燈心煎服

立効散 治下焦結熱小便淋秘痛而尿血

甘草

三兩

瞿麥 一兩

山梔仁

五錢

右爲末每服五錢薑蔥燈心煎湯調下

血餘散

治血淋若單小便出血爲莖衄皆主之婦人轉胞不尿最能

亂髮不拘多少燒灰入射香少許每服米醋調滾湯入髮香末少許

調下如治淋用葵子末等分合髮末空心米飲調下婦人轉胞不能

小使用前藥末如法調下如神

琥珀散 專治血淋神効

琥珀

一兩

當歸

一兩 五錢

生苳

一兩 五錢

蒲黃

二兩

瞿麥

一兩

血餘

四兩 燒灰

梔子

一兩

大小蓊

各一兩 五錢

甘草

三錢

酸漿草

自然汁 五兩

右為末用漿汁和藥曬乾全為末每服三錢空心米飲調下

高尚書方 專治血淋多是濕熱即効無越於此

五苓散加蒼朮五分

右一服見愈自高尚書驗之姑錄以遺後世之法

散滯小茴湯 治諸淋及婦人赤白帶下

小茴

一錢

當歸

一錢

烏藥

一錢

荊芥

錢

黃連

一錢

木通

一錢

扁竹

一錢

砂仁

八分

薄荷

八分

香附

一錢

淡竹葉

十個

右切一劑煎服

通關丸 治小便不通熱在下焦血分及諸淋等症

黃柏

二兩 炒

知母

二兩 炒

肉桂

三錢

滑石

二兩

木通

一錢