

徐氏醫書八種

S2942

647



蘭臺軌範卷四

目錄

麻黃加朮湯

防己黃耆湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

二妙散以上濕

白虎人參湯

一物瓜蒂湯

香薷飲

十味香薷飲

黃連香薷飲

枇杷散

蟾酥丸

千金丹

又刮痧法以上

蠶甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

柴胡去半夏加栝實湯

柴胡桂薑湯

蜀漆丸

陵鯉湯

療瘡病醫不能救者方

療瘡常山湯

牡蠣湯

清脾湯

常山飲

烏梅引子

集驗瘡必從四肢始療方

四獸湯以上痰瘧

桃花湯

白頭翁湯

紫參湯

訶梨勒散

甘草瀉心湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

乾薑黃連黃芩人參湯

赤石脂禹餘糧湯

雄黃丸

柴胡加芒硝湯

瓜蒌散

蘭臺軌範

卷四目錄



療熱毒痢血片臍下絞刺痛方

主赤白痢方

療五疳蒸下痢方

薤白湯

訶梨勒丸以上痢

生鐵洛為飲

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

治癲狂百病

萸薢子散

抱膽丸

琥珀壽星丸

控涎丹

獨效苦丁香散

甘遂散

苦參丸以上癲狂痢

苓桂甘朮湯

甘遂半夏湯

十棗湯

小青龍湯

木防己湯

木防己去石膏加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

小半夏湯

小半夏加茯苓湯

葶藶大聚瀉肺湯

桂苓五味甘草湯

苓甘五味薑辛湯

苓甘五味薑辛半夏湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁大黃湯

厚朴大黃湯

痰飲頭痛往來寒熱方

赤石脂散

前胡丸

范汪大甘遂丸

礬石湯

金珠化痰丸

葛花解醒湯以上痰飲

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯



杏仁煎

十味丸

療上氣方

鯉魚湯

觀音應夢散

補肺阿膠散

清音丸

葶蘇丸

蘇子煎

蘇子降氣湯

治久嗽上氣心胸煩熱吐膿血方

以上咳嗽

烏頭桂枝湯

蜘蛛散

大烏頭煎方

洗陰腫核痛

麝香大戟丸

濟生橘核丸

川楝子丸

礪砂圓

蟬脫散

以上疔



蘭臺軌範卷四

吳江徐靈胎洞溪著

濕

金匱

太陽病關節疼痛而煩脈沈而細者此名濕痺濕痺之候小便不利大便反快但當利其小便濕家之

為病一身盡疼發熱身色如熏黃也

此黃與黃疸各別

濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則曠

或胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒渴欲得飲而不能飲則口燥煩也濕家下之

頸上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不

止醫云此可發汗汗之病不愈者何也蓋發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者

發其汗但微微欲出汗者風濕俱去也濕家病身疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食

腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞納藥鼻中則愈

納鼻之藥金匱未載俟廣求其法以補之亦不過牙皂瓜蒂之類

濕方

麻黃加朮湯

金匱

濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗為宜慎不可以火攻之



中醫藥大學圖書館藏

麻黃三兩 去節桂枝二兩 去皮甘草一兩 炙杏仁七十個 去皮尖白朮四兩右五味以水九升先煮麻黃減二升去上

沫納諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗此濕家發汗之主方

防己黃耆湯金匱風濕脈浮身重汗出惡風者此湯主之

防己一兩甘草半兩 炙白朮七錢 半黃耆一兩一分 去蘆右剉麻豆大每抄五錢匕生薑四片大棗一

枚水盞半煎八分去滓溫服良久再服喘者加麻黃半兩胃中不和者加芍藥三分氣上衝者

加桂枝三分下有陳寒者加細辛三分服後當如蟲行皮中從腰下如冰後坐被上又以一被繞

腰下溫令微汗差

麻黃杏仁薏苡甘草湯金匱病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷

所致也

麻黃半兩 去節 湯泡甘草一兩 炙薏苡仁半兩杏仁十個 去皮尖 炒右剉麻豆大每服四錢水一盞半煮八分去滓

溫服有微汗避風

桂枝附子湯金匱傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而澀者桂枝附子湯

主之若大便堅小便自利者去桂加白朮湯主之

桂枝四兩 去皮 生薑二兩 切 附子三枚 炮去皮破八片 甘草二兩 炙 大棗十二枚 擘 右五味以水六升煮取二升去滓分温

三服

白朮附子湯金匱

白朮二兩 附子一枚 半 炮去皮 甘草一兩 炙 生薑一兩 半 切 大棗六枚 右五味以水三升煮取一升去滓分温三

服一服覺身痹半日許再服三服多盡其人如冒狀勿怪卽是朮附並走皮中逐水氣未得除故耳

甘草附子湯金匱 風濕相搏骨節疼痛掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣

或身微腫者此湯主之

甘草二兩 炙 附子二枚 炮去皮 白朮二兩 桂枝四兩 去皮 右四味以水六升煮取三升去滓温服一升日三服

初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者服六七合爲妙此風濕而兼寒者

二妙散丹溪 治筋骨疼痛因濕熱者如有氣加氣藥如血虛加血藥如痛甚以薑汁熱辣服之

黃柏炒 蒼朮炒去皮 右爲末生薑研沸湯調服如表實氣實者少酒佐之在表之濕當散之在裏之濕當燥之諸方之義

不外乎此

黑地黃丸方見通治



喝

金匱

太陽中喝發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細扎遲小便已灑灑然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發其汗則惡寒甚加溫針則發熱甚若下之則淋甚

此中喝乃中時行之熱氣與本然中暑病象如霍亂者不同當別之

喝方

白虎人參湯

金匱

太陽中熱者喝是也汗出惡寒身熱而渴此湯主之

知母

六兩

石膏

一斤

甘草

二兩

粳米

六合

人參

三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一

升日三服

熱入裏則外惡寒清裏熱則惡寒自解然亦須詳審有表無表方為精密況凡屬汗出多之病無不惡寒者以其惡寒汗出而誤認為寒用大順散等熱劑則立危矣

一物瓜蒂散

金匱

太陽中喝身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也

瓜蒂

二十個

右剉以水一升煮取五合去滓頓服

此方服之當吐

香薷飲

局方

治暑熱乘涼飲冷陽氣為陰邪所遏頭痛發熱惡寒煩躁口渴腹滿吐瀉者

香薷

一斤

厚朴

薑汁炒

白扁豆

炒各半斤

右水煎浸冷服

此治時行暑病之主方其分兩則五錢至一兩止

十味香薷飲

即前方加人參甘草黃耆木瓜陳皮白朮茯苓



黃連香需飲 卽香需飲加黃連

四兩薑汁同炒黃色

枇杷散局 治中暑伏熱煩渴引飲嘔逆惡心頭目眩暈

枇杷葉 陳皮 丁香 厚朴

各五錢

白茅根

麥冬

木瓜

甘草

炙各一兩香茹半錢

右爲末每二錢薑三片煎湯調服溫服亦可如煩躁并水調下小兒三歲以下服五分量大小加減

蟾酥丸

祕方

茅朮

雄黃

各一兩

辰砂

五錢

麝香

一錢

丁香

牙皂

各三錢

蟾酥

五錢

右用火酒化蟬酥打丸

如鳳仙子大辰砂爲衣放舌底化下重者二三丸

千金丹

祕方卽人馬平安散

麝香

冰片

各二錢

硃砂

五錢

雄黃

硼砂

硝

各一兩

金箔

一百張或加牛黃

右七味爲末或水服

二三分或嗅少許於鼻內

又刮痧法 用薄錢蘸香油刮胸背及臂股灣令色紫疹起爲度或用婦人縛髮油繩蘸油刮亦可

紫金錠

蘇合丸

局方

藿香正氣散

局方

生脈飲

六一散

以上俱見通治

痰瘡

蘭臺軌範

卷四

瘡瘡

三

素問

瘧論黃帝問曰夫瘧瘧皆生於風其畜作有時者何也岐伯曰瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲帝曰何氣使然岐伯曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽并於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頷也巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱外內皆熱則喘而渴故欲冷飲也此皆得之夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此榮氣之所舍也此令人汗空疎腠理開因得秋氣汗出遇風及得之以浴水氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作帝曰其間日作者何也岐伯曰其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作也帝曰其作日晏與日早者何氣使然岐伯曰邪氣客於風府循膂而下衛氣一日一夜大會於風府其明日日下一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此日作稍稍益晏其出於風府日下一節二十五日下至骹骨二十六日入於脊內注於伏膂之內其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益早其間日發者由邪氣內薄於五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日乃作

也帝曰夫子言衛氣每至於風府腠理乃發發則邪氣入入則病作今衛氣日下一節其氣之發也不當風府其日作者奈何岐伯曰此邪氣客於頭項循膂而下者也故虛實不同邪中異所則不得當其風府也故邪中於頭項氣至頭項而病中於背氣至背而病中於腰脊氣至腰脊而病中於手足氣至手足而病衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣之所發必開其腠理邪氣之所合則其府也帝曰善夫風之與瘧也相似同類而風獨常在瘧得有時而休者何也岐伯曰風氣留其處故常在瘧氣隨經絡沈以內薄故衛氣應乃作帝曰瘧先寒而後熱者何也岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱病以時作名曰寒瘧帝曰先熱而後寒者何也岐伯曰此先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰溫瘧其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧內經之文亦論其理如此其實病變不同不可執一岐伯曰瘧之且發也陰陽之且移也必從四末始也陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪氣不得入陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之此真往而未得并者也帝曰時有間二日或至數日發或渴或不渴其故何也岐伯曰其間日者邪氣與衛氣客於六腑而有時相失不能相得故休數日乃作也其以秋病者寒甚以冬病者寒不

甚以春病者惡風以夏病者多汗 瘧脈緩大虛便宜用藥不宜用鍼凡治瘧先發如食頃乃可以治過之則失時也諸瘧而脈不見刺十指間出血血去必已先視身之赤如小豆者盡取之

瘧疾藥當在未來時前服刺瘧之法

簡易可學不必習針法者能之亦治瘧之要訣也

風瘧 素生氣通天論魄汗未盡形弱而氣燄穴腠以閉發為風瘧 又云夏傷於暑秋為瘧瘧

二日一發者為

瘧瘧瘧與瘧同

似瘧 素生真要大論帝曰火熱復惡寒發熱如有瘧狀或一日發或間數日發其故何也岐伯曰勝復

之氣會合之時有多少也陰氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多而陰氣少則其發日近此勝復相搏盛

衰之節瘧亦同法

瘧亦同法則非瘧可知

金匱

師曰瘧脈自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者下之差弦遲者可溫之弦緊者可發汗針灸也浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之但熱不寒者邪氣內藏於心外舍分肉之間令人消燄肌肉

壯瘧 瘧多寒者名曰壯瘧

似當作牝字諸本皆作牡存考

瘧方



龍甲煎丸金匱 病瘧以月一日發當以十五日愈設不差當月盡解如其不差當云何師曰此結爲癥瘕

名曰瘧母急治之宜此方

龍甲

十一分炙

烏扇

三分燒

黃芩

三分

柴胡

六分

鼠婦

三分熬

乾薑

三分

大黃

三分

芍藥

五分

桂枝

葶藶

一分熬

石葦

三分去毛

厚朴

三分

牡丹

五分去心

瞿麥

二分

紫葳

三分

半夏

一分

人參

一分

麝香

阿膠

三分炙

蜂窠

四分炙

赤消

十二分

蜣螂

六分熬

桃仁

二分

右二十三味爲末

取煨龍下灰一斗清酒一

斛五斗浸灰候酒盡一半著龍甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁納諸藥煎爲丸如梧子大空心服七

丸日三服

白虎加桂枝湯金匱

溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩時吐此湯主之

知母

六兩

甘草

二兩炙

石膏

一斤

粳米

二合

桂枝

三兩去皮

右剉每五錢水一盞半煮至八分去滓溫服

汗出愈

內經以先熱後寒爲溫瘧但熱不寒爲瘧瘧

蜀漆散金匱

瘧多寒者名曰牡瘧此湯主之

牡宜作乾

蜀漆

洗去腥

雲母

燒二日夜

龍骨

等分

右三味杵爲散末發前以漿水服半錢匕

溫瘧加蜀漆半分臨

發時服一錢匕

柴胡去半夏加括蕒湯金匱 治瘧病發渴者亦治勞瘧

柴胡八兩 人參 黃芩 甘草各二兩 括蕒根四兩 生薑二兩 大棗十二枚 右七味以水一斗二

升煮取六升去滓煎取三升溫服一升日二服

柴胡桂薑湯金匱 治瘧寒多微有熱或但寒不熱

柴胡半斤 桂枝三兩 乾薑二兩 括蕒根四兩 黃芩三兩 牡蠣二兩 甘草二兩 右七味以水一斗二

升煮取六升去滓再煎取三升日三服初服微煩復服汗出便愈

蜀漆丸金匱 主瘰癧連年不差服三七日定差方

蜀漆 知母 白薇 地骨皮 麥門冬去心 升麻各五分 恆山一兩 石膏二兩 香豉一合

萎蕤 烏梅肉 龍甲 甘草各一兩 右十三味搗篩為末煉蜜和丸如桐子大空腹飲服

十丸日再加至二三十丸此方治二日瘰癧為宜

陵鯉湯金匱 主瘰癧疾江南瘰癧方

陵鯉甲四十枚 烏賊魚骨 附子泡各一兩 恆山三兩 右五味咀咀以酒三升漬一宿未發前稍稍

吸之勿絕吐之并塗五心一日斷食過時久乃食用生藥探吐法

療瘡病醫不能救者方

千金翼

外治截瘡法

以繩量病人脚圍繞足跟及五指一匝訖截斷繩取所量

繩量項上著反向背上當繩頭處中脊骨上灸三十壯則定候看復惡寒急灸三十壯則定候至過發
一炊久候之雖飢勿與食盡日此神驗男左足女右足

療瘡常山湯

外臺

吐法

常山

三兩

右一味切以漿水三升浸經一宿煎取一升欲發前頓服之後微吐差止忌生葱生菜

牡蠣湯

外臺

治牡瘡

牡蠣

四兩

麻黃

四兩

去節甘草

二兩

蜀漆

二兩

右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升納諸

藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服

清脾湯

濟生

治熱多陽瘡

青皮

厚朴

柴胡

黃芩

半夏

甘草

茯苓

白朮

草果

煨

右九

味加薑三片水煎服

常山飲局

方

治痰瘡

常山

火酒炒

知母

貝母

草果

檳榔

各一錢

烏梅

三個

右六味加薑棗煎瘡未發時面東

溫服

烏梅引子 療溫瘧瘧瘧

烏梅

七個

桃柳心

各七莖

葱白

七莖

豆豉

一合

甘草

四分

柴胡

四分

知母

四分

大黃

三分

右八味

各

細剉以童子小便兩茶碗宿浸明旦早煎三三沸去滓頓服差未差更作服三服永差忌海藻蔞菜

集驗瘧必從四肢始療方 先其時一日頃用細左索繩緊束其手足十指過發時乃解之

此即內經之法

四獸湯

簡易

治食瘧諸瘧和胃消痰

半夏

人參

茯苓

白朮

橘紅

草果

生薑

烏梅

大棗

甘草

各等分

右以鹽少許淹食頃濕紙厚裹慢火煨香熱每服四錢溫服

小柴胡湯

見傷寒

治瘧之法不外諸方惟三日瘧則煎劑不能取效宜病日用煎方以驅邪餘兩日用溫

補以扶元氣又加避風靜養則庶幾矣

痢

素問

通評虛實論帝曰腸澼便血何如岐伯曰身熱則死寒則生帝曰腸澼下白沫何如岐伯曰脈沈則生脈

浮則死帝曰腸澼下膿何如岐伯曰脈懸絕則死滑大則生帝曰腸澼之屬身不熱脈不懸絕何如岐伯

曰滑大者曰生懸澼者曰死以臟期之 氣厥論腎移熱於脾傳爲虛腸澼死不可治 大奇論腎脈小

搏沈爲腸澼下血血溫身熱者死心肝澼亦下血二臟同病者可治其脈小沈澼爲腸澼其身熱者死

太陰陽明論犯賊風虛邪陽受之飲食不節起居不時者陰受之陽受之則入六腑陰受之則入五臟入

六腑則身熱不時臥上爲喘呼入五臟則填滿閉塞下爲殭泄久爲腸澼 此俗所謂腸紅病也

金匱

六腑氣絕於外者手足寒上氣脚縮五臟氣絕於內者痢不禁下甚者手足不仁 下痢脈沈弦者下重

脈大者爲未止脈微弱數者爲欲自止雖發熱不死 下痢手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微

喘者死少陰負跌陽者爲順也 下痢有微熱而渴脈弱者令自愈 下痢渴者自愈以陽氣復而寒邪去也 下痢脈數有微

熱汗出令自愈設脈緊爲未解 下痢脈數而渴者令自愈設不差必清膿血以有熱故也 下痢氣者

當利其小便 下痢清穀不可攻其表汗出必脹滿 下痢脈沈而遲其人面少赤身有微熱下痢清穀

者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面帶陽下虛故也 下痢後脈絕手足厥冷晬時脈還手

足溫者生不還者死 下痢腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表 以上諸證皆屬陰寒之病非暑毒之病也治法大相懸殊