

傷寒補天石

②



辨伏脈第十七

頭疼發熱惡寒。一手無脈。或兩手全無者。此因寒邪。不得發越。便爲陰伏。故脈伏。必有邪汗。當攻之。冬用麻黃湯。又有六七日以來。別無刑尅證候。或昏沉。目昧。不知人事。六脈俱無。此正欲汗也。勿攻之。當用五味子湯。以生脈補元。元氣來復。一汗而涼也。二者俱陰重。欲雨之象。意。傷寒腹痛。脈必伏。或吐瀉脫元而無脈者。隨病而施。將薑汁磨木香調麝香半分。入獨參。

湯服下。脈至者生。不至者死。按一手無脈。誠伏脈也。兩手全無者。須重按全無方是伏脈。若有而無者。則又爲陽證。見陰脈矣。慎之。

脈知可解第十八

可解之脈。浮而虛。不可解之脈。浮而實。浮而虛者。只是在表。浮而實者。知已在裏也。汗多不解者。轉屬陽明也。傷寒三日。脈浮數而微。病人身涼和者。此爲欲解也。解以夜半。寸關尺三處。浮沉遲數大小同等。雖



有寒熱不解此脈陰陽爲和平雖劇當愈凡冬間正傷寒看脈用藥無有不應惟溫疫時證不須論脈但無怪證怪脈則不妨又不可發汗汗之熱仍不退且重其虛只須小柴胡見熱甚合解毒扶之使正或一七日或二三日自然汗出身涼而愈也

看證大略第十九

大凡看傷寒先看兩目或赤或黃次看口舌有胎無胎次以手按其心胸兩脇有痛處否問其小便有無



大便通否口渴與不渴會服何藥或久或新察其病情端由參合脈證相對與否以斷吉凶

風寒辨第二十

一般頭痛身熱項強腰脊強惡寒惡心拘急身體疼骨節痛但惡寒無汗脈浮緊有力爲寒傷營治宜發表散邪冬月麻黃湯三時芍蘇飲冲和湯若惡風有汗脈浮緩無力爲風傷衛治宜解表散邪冬月桂枝湯三時參蘇飲加減冲和湯內去蒼朮加白朮腹痛



小建中湯痛甚桂枝加大黃湯此太陽初病傷風傷寒如此分治若傳諸經傷風傷寒同治也傷風者先咳嗽鼻塞聲重者是也內經風論分屬五臟畢竟屬肺者多治用辛溫或辛涼之劑以散之大要風寒用辛溫風熱用辛涼

傷風鼻塞聲重不頭痛者只用參桂飲加減治之

內傷外感辨第二十一

內傷外感俱有寒熱不得概作傷寒妄施汗吐下溫之法也夫外感有餘者寒熱齊作而無間外感惡寒

雖近烈火不除外感惡風。乃禁一切之風。外感顯在鼻。故鼻氣不利。壅盛有力。外感則邪氣有餘。發言壯厲。先輕後重。外感則手背熱而手心不熱。左手脈來緊盛。右手和平。此是外感傷寒也。當作正傷寒治之。內傷不足者。寒熱閒作而不齊。內傷惡寒得煖即解。內傷惡風微惡些少賊風。內傷顯在口。故口不知味。而腹中不和。內傷則元氣不足。出言懶怯。先重後輕。內傷則手心熱而手背不熱。右手脈來空大無力。左



手脈來或微或濇此內傷不足也當用補中益氣湯治之若內傷與外感兼病內證多則是內傷重而外感輕當補養爲先解表爲次外證多則是外感重而內傷輕當發表爲先補養爲次

勞力傷寒第二十二

勞力內傷血氣又兼外感寒邪頭疼身熱惡寒微渴澀然汗出身體痛脚腿酸疼無力沉倦左手脈緊盛右手脈空大無力治以溫補兼發散寒邪調營養氣

湯即東垣補中益氣湯加減有下證者宜緩治之
柴胡湯

夾食傷寒第二十三

內傷食鬱結又兼外感寒邪頭疼身熱惡寒拘急惡心
痞滿或嘔吐或腹痛或泄瀉脈左右俱緊盛有力治
以解表為先消食為次未發熱霍香正氣散已發熱芎蘇散消
食為次大柴胡湯

夾痰傷寒第二十四



內傷痰鬱又兼外感寒邪手熱惡寒隱隱頭痛喘咳
煩悶胸脇體痛左手脈緊盛右手關脈洪滑或寸脈
沉伏治以痰藥兼發散寒邪金沸草湯小半夏湯後
以消痰兼降火柴胡半夏湯有憎寒壯熱頭痛昏沉
迷悶土氣喘急口出涎沫此內傷七情以致痰迷心
竅神不守舍舍空則痰生名挾痰如見鬼狀與痰證
同法治加味導痰湯臨服入薑汁竹瀝

夾氣傷寒第二十五

傷寒論卷之六
內傷氣鬱又兼外感寒邪頭痛身熱惡寒身疼脇痛
脹滿氣鬱不舒左手脈緊盛右手脈沉治以氣藥兼
發散寒邪

夾血傷寒第二十六

內傷血鬱又兼外感寒邪頭疼身熱惡寒煩渴胸脇
小腹痛左手脈緊瀯右手脈沉數治以解表爲先桂
枝湯下瘀血爲次輕則犀角地黃湯重則桃仁承氣
湯有刑頭痛惡寒止身熱煩渴小便利次便黑口語



無倫此內傳心脾二經使人昏迷沉重名挾血如見
祟狀當歸活血湯

內傷似外感始爲熱中病第二十七

氣高而喘身熱而煩短氣上逆鼻息不調怠惰嗜臥
四肢困倦無氣以言無力以動或大熱悶亂心煩或
渴久病或不渴

病久邪深入絡故不渴有濕亦不渴如渴者是心
火炎上剋肺金故也



或表虛惡風寒慎不可與寒涼藥惟以補中益氣湯
溫之以補元氣而瀉火邪東垣曰火與元氣不兩立
脾胃氣虛則下流於腎陰火得以乘其土位故脾證
得氣高而喘身熱而煩其脈大而頭痛或渴不止其
皮膚不任風寒而生寒熱蓋陰火上衝則氣高而喘
煩熱頭痛而渴脈洪脾胃之氣下流使穀氣不得升
浮是春生之令不行無陽以助其營衛則不任風寒
乃上寒下熱此皆脾胃不足所致與外感風寒似同

而實異。內傷不足之中。又當分別飲食傷爲有餘。勞
倦傷爲不足。凡飲食不節。勞役過甚。則心脈變見於
氣口。是心火刑肺。其肝木挾心火之勢。亦來薄肺經。
曰侮所不勝。寡于畏者是也。故氣口急大而數時。一
代而澁也。澁者肺之木脈代者。元氣不相接。脾胃不
足之脈也。洪大而數者。心脈刑肺也。急者肝木挾心
火而反尅肺金也。若不甚勞役。惟右關脾脈大而數。
謂獨大於右脈。五數中顯緩。時一代也。如飲食不節。寒

暑失所則先右關胃脈損弱甚則隱而不見惟內顯
脾脈之大數微緩時一代也宿食不消則先右關脈
沉滑也補中益氣湯

黃芪

人參

白朮

炙草

陳皮

當歸

柴胡

升麻

薑

棗

東垣曰脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘其

土位其次肺金受邪須多用黃芪而人參甘

之脾胃一虛肺氣先絕故用黃芪以益皮手而固



腠理不令自汗損其元氣上喘氣促故以人參補

之心火乘脾用炙草甘溫以瀉火熱而補脾元若

脾胃急痛併太虛腹中急縮宜多用之中滿者減

之白朮苦甘溫除胃中之熱利腰臍間血胃中清

氣在下必加升麻柴胡以升之引參芪甘草甘溫

之氣味上升以補胃氣之散而實其表又緩帶脈

之縮急氣亂於中清濁相攻用去白陳皮以理之

又助陽氣上升以散滯氣脾胃氣虛爲陰火傷其



生發之氣。營血大虧。血減則心無所養。致令心結。

心主血。血則心無所養。致令心結。

脫者。心氣中煩悶不安也。

而煩病名曰挽。故加甘辛微溫之劑。以生陽氣。

陰。或曰甘溫何能生血。

景之法。血虛以人參補之。陽旺則能生陰血。更以

當歸和之。少加黃栢以救腎水。瀉陰中伏火。如煩

猶不止。少加生地補腎水。水旺則心火自降。如氣

浮心亂。以硃砂安神丸鎮固之。則愈。

內傷似外感。未傳寒中病第二十八

胃脘當心而痛。上支兩脇。咽膈不通。飲食不下。或作