

續名醫類案

第三十六

S28

1820

1936



續名醫類案卷三十六

錢塘魏之琇編集

濮院呂大綱慎齋
海昌王士雄孟英
同校

白癧風

附紫
癧風

薛立齋治一男子常咳嗽、腿患白癧風、皮膚搔起白屑、服消風散之類、痒益甚、起赤暈、各砭出血、亦暈開消、而痒愈甚、服遇仙丹之類、成瘡出水、殊類大痲風、咳嗽吐痰、面色皎白、時或痿黃、此脾肺二經虛熱之症、先用五味異功散治之、虛熱稍退、又用地黃清肺飲、肺氣漸清、又用八珍湯、六



南京中医药大学图书馆藏

味丸而尋愈。後又咳嗽痰喘，患處作痒，用參蘇飲二劑，散其風邪。又用五味異功散，加桔梗，補其肺氣而痊。二年後，咳嗽作渴，飲水脈洪大，左尺爲甚，用加減八味丸補腎水而痊。

一男子素不慎房勞，常患足三陰虧損，治愈後兩腿腕患紫癰風，延於兩腿作痒，各砭出血，痒處日甚，服消風等藥，患處微腫，延及上體，兩眼昏澀，謂腎臟風。先用四生散，四服後，用易老祛風丸，九月餘，再用地黃丸，兩月餘而痊。後飲食起居失宜，肢體色赤，服二九墮愈。

一男子患白癰風，過飲，或勞役，患處色赤，作痒，服消風散之。

類頓起赤暈遍身皆痒。衄出血服祛風藥。患處出血。恪服
遇仙丹。患處愈。元氣日虛。先用九味蘆薈丸。九味羌活
湯。諸症頓愈。用加味逍遙散。加味四物湯。乃痊。

一婦人患白癜風。誤以爲大麻風。服蛇酒等藥。患處炊腫。經
水兩三月一行。曰此肝血傷而內風也。誤服風藥。必筋脈
拘急。不信。仍作風治。果身起白屑。四肢拳攣。始信。先用八
珍湯四劑。又用四君子湯二劑。月餘。乃用四君子湯。又用
八珍湯二劑。又月餘。諸症漸退。元氣漸復。又以四君子湯
爲主。以逍遙散爲佐。將兩月。瘡靨脫落。又月餘而愈。

斑瘡

唐王壽云、比歲有病、天行發斑瘡、頭面及身、須臾周匝、狀如火燒、瘡皆帶白漿水、隨破隨生、不治數日必死、治後瘡、癰黯一歲方滅、此惡毒之氣所爲、以水煮升麻、綿沾洗之、若酒煮彌佳、但躁痛不可忍也、又云、建武中南陽擊虜初、呼爲虜瘡、諸醫參詳療之方、取好蜜、摩瘡上、以蜜煎升麻數

拭之

外臺
秘要

繆仲淳治、顧奉常女、臂患紫雲風、用稀蒼耳雄黃末之醇

漆爲丸、或疑漆有毒、競沮之、然竟以此藥收功

製漆用生
蟹黃攪和

可化作水入
藥 廣筆記

一婦人患斑症作痒，脈浮數，以人參敗毒散二劑，少愈，更以消風散四劑而安。又用柴胡清肝散而愈。

一婦人患斑症，痒痛，大便秘結，脈沉實，以四物湯加芩連、黃槐花治之，而便利，用四物二連湯而瘡愈矣。

一婦人患斑作痒，脈浮，以消風散四劑而愈。

一婦人患斑作痒，脈浮數，以人參敗毒散二劑，少愈，更以消風散四劑而安。

一男子患斑，色赤，煩痛，發熱喜冷，脈沉實，以防風通聖散一劑頓退，又以荆防敗毒散加芩連四劑而愈。



舉人陸世明會試途中勞役胸患斑、燼赤、作痛、頭痛發熱、形
倦、少食、大便或澇或結、小便赤澀、此勞傷元氣而虛火內
動、投補中益氣湯一劑頓退、再劑而痊、又數劑而平復。
一室女年十四、天癸未至、身發赤斑、痒痛、左關脈弦數、此因
肝火血熱、以小柴胡湯加山梔、生地、丹皮治之而愈、若因
怒而致者、亦宜治以前藥。

一男子面起赤暈、時或發腫、臂手亦然、搔起白屑、服癘風藥
內熱體倦、脈大而虛、此因元氣虛而陰血復傷、用六味丸
補中益氣湯而愈。

一婦人身如丹毒、搔破如癩、熱渴頭暈、日晡益重、此屬肝經

風熱血燥用加味逍遙散而愈

一婦人身如丹毒搔破淋漓熱渴頭暈日晡益甚用逍遙散加炒山梔陳皮而愈又用八珍柴胡山梔丹皮而痊

一婦人患前症誤服大麻風藥破而出水煩渴頭暈誠類風症六脈洪數心肝脾爲甚曰風自火出此因怒動肝火血燥而生風耳非真風症也與逍遙散六味丸以清肝火滋脾血生腎水而痊

一婦人患前症搔破久不愈食少體倦此肝脾虧損陰虛發熱也先用補中益氣湯加川芎炒梔元氣漸復更以逍遙而瘡愈

一婦人患赤遊風，晡熱痒甚，用清肝養血之劑，不信，乃服大
麻風藥，臂痛筋攣，又服化痰順氣之劑，四肢痿弱，又
患前症，數服風藥，煎湯泡洗，以致腹脹並歿。

一女子月經先期，先發赤暈，微腫作痒，若遇氣惱，赤痒益甚，
服祛風之藥，患處更腫，砭出紫血甚多，其痒愈作，謂肝火
血燥，風藥復傷血而爲患也，先用加味道遙散，清肝火，益
肝血，赤痒少止，用地黃丸滋腎水生肝木，各五十餘貼而
痊，後因惱怒，經水不止，發熱作渴，患處赤痒，先用加味小
柴胡湯二劑，諸症頓止，又用加味道遙散而安。

天泡瘡

其症屬元氣不足邪氣所乘亦有傳染而患主在肝腎二經故多在下體發起楊梅下疳畧同

薛立齋治一儒者患天泡色焮赤作痛大便秘而不實服祛風散毒等藥舌痛口乾脈浮而數此邪氣去而陰虛所致用六味丸料加山梔當歸四劑脈症頓退又用八珍湯加山梔丹皮瘡色漸白後用四君加歸芪而愈

一儒者患天泡誤服祛風消毒之藥復傷元氣因勞役過度內熱口乾齒齦作痛右關脈洪數而虛此脾胃受傷而火動用清胃散之類而愈

一儒者患天炮或成粒或成片或出水脾肺脈俱洪數此風邪所傷先用荆防敗毒散加葶藶鈎藤數劑漸愈但口內乾熱用四物加山梔鈎藤銀花甘草節而愈後遍身搔痒內熱口乾佐以六味丸而瘥。

一商人每勞役飲酒後則遍身生瘡服祛風敗毒之劑面目胸背臂脇結一塊如桃栗凹凸痒痛膿水淋漓氣血虛甚寒熱往來作渴痰湧此溼熱壅盛元氣虛而不能愈也外敷當歸膏內服補陰八珍加草薢五錢並換肌消毒散加乾葛鈎藤各一錢二十餘劑諸症漸退仍以前藥為主佐以調理之劑兩月餘氣血復而瘥愈。

一男子燠腫痛發熱服祛風清熱藥愈熾診其脈沉實乃邪在內也用防風通聖散一劑頓愈又荆防敗毒散二劑而安夫此症雖屬風熱當審在表裏無誤矣。

一小兒患此症燠痛發熱脈浮數挑去毒水以黃柏滑石末敷之更飲荆防敗毒散二劑而愈。

一小兒患此症燠赤發熱以黃柏滑石末敷之飲大連翹湯二劑少愈更以金銀花散而痊。

毛閣老孫年十餘歲背側患水泡瘡數顆發熱脈數此肺胃經風熱所致名曰天泡瘡遂以荆防敗毒散加芩連服之外去毒水以金黃散敷之又四劑而愈。



楊文魁腹患此症及腰背痠痛飲冷脈數按之愈大乃表裏俱熱也以防風通聖散一劑更敷金黃散勢減大半再以荆防敗毒散二劑而痊

瘀血腹痛

立齋曰予於壬申年被重車碾傷悶膈良久復甦胸滿如築氣息不通隨飲熱童便一碗胸寬氣利惟小腹作痛吾鄉徐銀臺東濠先生與復元活血湯一劑便血數升許痛腫悉退更服養氣血藥而痊大凡損傷不問壯弱及有無瘀血停積俱宜服熱童便以酒佐之推陳致新其功甚大若

脇脹或作痛或發熱煩躁口乾喜冷惟飲熱童便一甌勝服他藥不動臟腑不傷氣血萬無一失嘗詢諸營操軍常有墮馬傷者何以愈之俱曰惟服熱童便即愈此其屢試之驗亦明矣戊辰年公事居庸關見覆車被傷者七人仆地呻吟一人未蘇俱令以熱童便灌之皆得無事又凡腫或傷損者以葱搗爛熱罨之尤妙

治一人仲秋夜歸墜馬腹內作痛飲酒數杯翌早大便自下瘀血即安此元氣充實挾酒勢而行散也

一男子跌傷腹痛作渴食梨子二枚益甚大便不通血欲逆上用當歸承氣湯加桃仁瘀血下而瘥此因元氣不足瘀



血得寒而凝聚也故產婦金瘡不宜食此

一男子孟仲墜梯腹停瘀血用大黃等藥而其血不下更加胸膈脹腫喘促短氣用肉桂木香末各三錢溫酒調服即下黑血及前所服之藥而蘇此因寒凝滯而不行故用辛溫之劑散之

一老人墜馬腹作痛以復元通氣散用童便調進二服少愈更以四物湯加柴胡桃仁紅花四劑而安

一男子墜馬傷作痛以桃仁承氣湯加蘇木紅花下之頓愈更以四物湯加花粉柴胡二劑而愈

脾傷腹痛

附血虛脇脹
血瘀脇脹

陳侍御墜馬腿痛作嘔服下藥一劑胸腹脹痛按之即止惟
倦怠少氣診其脈細而澀曰非瘀血也乃痛傷氣血復因
藥損脾氣而然耳投養脾胃生氣血之藥而愈

李進士季夏傷手出血不止發熱作渴兩脇作脹按之即止
此血虛也用八珍加軟柴胡花粉治之而愈更用養氣血
之藥調理而痊

孫文垣治桂亭兄壯年原有溼熱痰積年逾艾偶墜轎跌傷
背脇外敷內攻而愈越十五年左脇痛手不可近左脈弦

數堅勁搏指小腹亦痛知爲舊瘀及痰積作祟以青皮赤芍黃連當歸尾各一錢桃仁錢半大黃二錢滑石三錢臨服調元明粉一錢服下吐痰碗餘大便僅行一次左脇及腿膝皆痛臥不安小腹痛甚此瘀血欲行而未能也再與前方加減便三次皆沈香色稠黏瘀物腹痛除脘痛仍在再與加減便行四次所下紫黑如筋膜者甚夥諸症悉減因食雞湯牛肉腹痛復重此餘積未盡欲再下之恐年高不任曰藥力已到積已動行而後補庶無反顧之憂仍以
前藥去大黃調元明粉下二次瘀物如前之半諸痛俱平
用人參白芍甘草陳皮山楂桂心當歸半夏調理半月而