

S 294

1266

1部3

醫學三字經下



醫學三字經卷三

閩吳航陳念祖修園著

成都龍萬育燮堂訂梓

中風方

小續命湯千金中風總方

麻黃

去根節

人參

黃芩

川芎

白芍

炙草

杏仁

防己

桂枝

防風

各一錢

附子

五分炮

加生薑三片水二杯半先煎麻黃至二杯入諸藥煎八分服



北京中醫藥大學圖書館版權所有

古今錄驗續命湯 治中風風痺身體不能自收持口不

言昏冒不知病處或拘急不能轉側 方出金匱附方

麻黃 桂枝 當歸 人參 石膏 乾薑

甘草 錢各三

川芎 一錢五分 杏仁 十五粒 又一分

水三杯煎一杯溫服當小汗薄覆脊憑凡汗出則愈不

汗更服無所禁勿當風並治但伏不得卧欬逆上氣而

目浮腫

三化湯 治熱風中臙大便不通

大黃 羌活 枳殼 各二錢



水二杯煎八分服

稀涎散 治中風口噤並治雙蛾單蛾

巴豆

六枚每枚分兩片

牙皂

三錢切

明礬

一兩

先將礬化開却入二味攪勻待礬枯爲末每用三分吹喉中痰盛者燈心湯下五分在喉卽吐在膈卽下

參附湯 元氣暴脫以此方卽回其陽可救十中一二

人參

一兩

附子

五錢

水二杯半煎八分服○此湯治腎氣脫○以人參換白朮名朮附湯治脾氣脫○換黃耆名耆附湯治衛氣脫

○換當歸名歸附湯治營氣脫

三生飲 治寒風中臟四肢厥冷痰涎上湧

生烏頭

錢二

生南星

錢二

生附子

錢三

木香

分五

生薑

片五

水二杯煎七分○薛氏用人參一兩煎湯半杯調服

防風通聖散 治熱風卒中外而經絡手足痠癱內而臟

腑二便閉塞用此兩解之較之三化湯較妥亦爲類中

風實火治法所用表藥火鬱發之之義也所用下藥釜

下抽薪之義也



防風 荆芥 連翹 麻黃 薄荷 川芎 當歸

白芍 白朮 山梔 大黃 芒硝

石膏 桔梗 甘草 滑石

水二杯加生薑三片煎八分服○自利去稍黃○自汗

去麻黃加杜枚○涎嗽加半夏五味

地黃飲子 治類中風腎虛火不歸源舌強不能言足廢

不能行○類中風虛火治法

熟地 山茱肉 遠志 巴戟天 石斛

石菖蒲 肉桂 肉桂 麥冬 附子



五味子

茯苓

錢各一

加薄荷葉七葉水二杯煎八分服○此方法在輕煎不

令諸藥之味盡出其性厚重以鎮諸逆其氣味輕清速

走諸竅也

補中益氣湯 治勞後飢飽過度致傷元氣氣虛而風中

之○此類中風氣中虛證更有七氣上逆亦名氣中宜

越鞠丸之類

炙耆

錢二

人參

白朮

炒

當歸

錢各一

炙草

陳皮

錢各五

升麻

柴胡

錢各三

加生薑三片大棗二枚水二杯煎八分服

二陳湯 治痰飲通劑

陳皮

一錢二分

半夏

茯苓

各三錢

炙草

一錢

加生薑三片水三杯煎七分服○加白朮一錢蒼朮一錢

錢竹瀝四湯匙生薑汁二湯匙各加味二陳湯治類中

風痰中證亦名濕中以濕生痰也○加枳實一作實膽南星竹

茹名添痰湯

加味六君子湯 治中風王道之劑

方見膈食



加麥冬三錢爲君附子一錢爲使再調人竹瀝五錢生

薑汁二錢以行經絡之痰久服自愈

資壽解語湯喻嘉治中風脾緩舌強不語半身不遂與地

黃飲子同意但彼重在腎此重在脾

防風 附子 天麻 棗仁各一錢 羚羊

肉桂各八分 羌活 甘草各五分

水二杯煎八分入竹瀝五錢薑汁二錢五分服

喻嘉言治腎氣不榮於舌本加枸杞首烏生地菊花大

冬石菖蒲元參



侯氏黑散
驗治大風四肢煩重心中惡寒不足者
○外臺

治風癲

菊花兩四 白朮兩各一 防風兩各一 桔梗錢八 細辛

茯苓 牡蠣 人參 礬石 當歸

川芎 乾薑 桂枝各三錢 黃芩錢五

右十四味杵為散酒服方寸匕約有八分余每用一錢五分 日二服

溫酒調服忌一切魚肉大蒜宜常冷食六十日止熱即

下矣

風引湯金匱除熱癰瘡○治大人風引少小驚癰瘰癧日數



十發

大黃

乾薑

龍骨各二兩

桂枝一兩五錢

甘草

牡蠣

各一兩

寒水石

赤石脂

滑石

紫石英

白石脂

石膏

各三兩

右十二味研末粗篩以韋布盛之收三指約六七錢并花

水一杯煎七分溫服

按乾薑宜減半

附錄中風俗方殺人以示戒

俗傳中風方 風症以攻痰為大戒凡人將死之頃皆痰

聲漉漉不獨中風一症元湯無主一身之精血俱化為



痰欲攻盡其痰是欲攻盡其津血也故錄此以為戒

膽南星

寒賦大傷胃氣且能引痰入於心包肝膽以成痼疾製一二次者力尚輕若九製則為寒愈醱

枳殼

耗散元氣痰盛得此暫開少頃放而中氣大傷痰涎如湧

石菖蒲

能開心竅

痰涎直入其

半夏

此藥雖能降逆開結但與膽星同用未免助紂為虛

秦艽

羌活

鈎鈎藤

天麻

羚羊

防風

已上六味藥風症所不忌

但無要藥以主持之亦徒成糟粕無用之藥

天竺黃

真者難得然亦治火痰之標品

僵

蠶

但力薄不足付

牛黃

雖為風痰之妙藥然與膽南星石菖蒲同用則反引

痰入於心竅

竹瀝

以薑汁和之雖能驅經絡之痰而與膽星等同用不得中氣之輔在

反致寒中敗胃之患

甘草

雖為元老之才但與諸藥同用小

已上諸品或作一方或分作二三方患者誤服之輕者
致重重者卽死卽倖免於死亦必變爲癡呆及偏枯無
用之人矣戒之戒之

虛癆方

歸脾湯

此方爲補養後天第一藥○治食少不眠怔忡

吐血下血大便或溏或秘妄夢健忘七情所傷遺精帶

濁及女子不月等證

炙耆

錢三

人參

白朮

燕

棗仁

黑炒

當歸身

茯苓

龍眼肉

各二錢

木香

五分

炙草

一錢

遠志

五分
去心



水三杯煎八分溫服○高鼓峰去木香加白芍一錢五分甚妙○咳嗽加麥冬二錢五味七分○鬱氣加貝母二錢○脾虛發熱加丹皮梔子

六味地黃丸 壯水之主以制陽光凡一切吐血下血咳

嗽不眠骨蒸遺精淋濁屬於陰虛者無不統治之

熟地

八兩

山茱肉

淮山藥

各四兩

丹皮

茯苓

澤瀉

各三兩

研末煉蜜丸如桐子大晒乾每服三錢淡鹽湯送下

日兩服○加五味子名都氣丸○加麥冬名八仙長壽



九治咳嗽○本方改兩為錢水煎服名六味地黃湯

八味地黃丸 益火之源以消陰翳治腰膝無力飲食不

進腫脹疝瘕陽痿遺精帶濁屬於元陽虛者無不統治

之

即六味丸加附子 肉桂各一兩○本方去附子加五味

子名加減八味丸治大渴不止○本方加牛膝車前子

名濟生腎氣丸俗名金匱腎氣丸治水腫喘促○本方減兩為

錢水煎服名八味湯

小建中湯此方為治虛癆第一方今人不講矣凡癆



證必有蒸熱此方有薑桂以扶心陽猶太陽一出則燭
火無光卽退熱法也凡癆證必飲食少此方溫脾卽
進食法也凡癆證必咳嗽此方補土以生金卽治嗽法
也凡癆證多屬腎虛此方補脾以輸精及腎所謂精生
於穀也今人不能讀仲景書反敢侮謗聖法徒知生脈
六味八味歸脾補中及欸冬鼠尾竹百合蘇陳醫地
黃炭之類互服至死誠可痛恨

生白芍

三錢

桂枝

一錢五分

炙草

一錢

加生薑一錢五分大棗二枚水二杯煎八分入飴糖三

不足飽悶者去大棗加茯苓二錢氣逆者加半夏二錢

五分○此方人參當歸白朮俱隨宜加之

金匱炙甘草湯
肺燥肺痿咽痛脉代等症

生地
錢四

桂枝水

錢一

阿膠
五錢

炙草

錢

人參錢二

麥冬

五二分錢

棗仁

一原方錢

五火
分廊

加生薑一錢大棗二枚水二杯酒半杯煎八分服

喻嘉言清燥救肺湯

治燥氣鬱而成癆

桑葉

經霜者去
蒂三錢

人參

錢一

石膏

二分錢

杏仁

錢二八

力

