

丹溪心法附餘卷之二十一

革集

壬集

婦人門 下

產前 九十五

丹溪心法

○產前當清熱養血 產婦因火動胎逆上作喘急者急用條
芩香附之類爲末調下條芩水中取沉者爲佳 墮胎乃氣虛
血虛血熱 黃芩安胎乃上中二焦藥能降火下行 益母草
卽芫蔚子治產前胎後諸病能行血氣血難產可煎作膏地黃
骨牛膝膏皆可用 懷妊愛物乃一臟之虛假如肝臟虛其肝
氣止能生胎無餘用也又云不能用其肝肝虛故愛酸物 產
前安胎白朮黃芩爲妙藥也條芩安胎聖藥也俗人不知以爲

害而不敢用反爲溫熱之藥可養胎殊不知產前宜清熱令血
循經而不妄行故能養胎 胎熱將臨月以三補丸加炒香附
炒白芍藥蒸餅丸服 抑熱以三補丸用地黃膏丸 有孕八
九箇月必用順氣須用枳殼紫蘇梗 凡妊婦脉細勻易產大
浮緩火氣散難產 生產如抱船過壩一般

入方 固胎

地黃 半錢 歸身

人參

白芍 各一錢 白木 一錢半

川芎 五分 陳皮 一錢 黃芩 半錢 甘草 三分 黃連 少許

黃柏 少許 桑上牛兒藤 七葉圓者

一本無芩

右咬咀每二錢入糯米二十粒煎服 血虛不安者用呵膠
痛者用砂仁止痛安胎行氣故也

東胎散 第八箇月可服

炒黃芩 夏一兩 春秋七錢半 冬五錢 白朮 二兩 不見火

茯苓 七錢半 不見火 陳皮 三兩

右為末 粥丸服

達生散 又名東胎散

大腹皮 三錢 人參

陳皮 各半錢 白朮

芍藥 各一錢 紫蘇 葉半錢

甘草 炙二錢 歸身 尾一錢

右作一服入青葱五葉黃楊腦七箇此即黃楊樹葉稍兇也
或加枳殼砂仁以水煎食後服於八九箇月服十數貼甚得
力夏月加黃芩冬不必加春加川芎 或有別証以意消息
干後

○氣虛加參朮

氣實倍香附陳皮

血虛倍當歸加地黃

形實倍紫蘇

性急加黃連

有熱加黃芩

濕痰加滑

石半夏

食積加山查

食後易饑倍黃楊腦

有痰加半

夏

腹痛加木香桂

又方

第九箇月服

黃芩

一兩酒炒不宜涼藥怯弱者減半

白朮

一兩

枳殼

炒七錢半

滑石

七錢半臨月十日前小便多者減此一味

右爲末粥丸梧子大每服五十九空心熱湯下多則恐損元

氣氣實人宜服

又方

安胎

白朮

黃芩

炒麴

右為末粥丸服 一本云用條芩一二兩為末每一錢或半錢濃煎白朮湯調下每次用白朮五七錢煎湯

○惡阻從痰治 多用二陳湯

戴云惡阻者謂婦人有孕惡心阻其飲食者是也肥者有痰瘦者有熱須用二陳湯

入方

白朮不以多少

右為末水丸隨所好或湯或水下

○子腫

戴云子腫者謂婦人手足或頭面通身浮腫者是也

入方

山梔子炒用一合

右為末米飲吞下或丸服

三因鯉魚湯 治妊娠腹大胎間有水氣

白朮五兩

茯苓四兩

當歸

芍藥各二兩

右經判以鯉魚一頭修事如食法者取汁去魚不用每服四錢入魚汁一鍾半姜七片陳皮少許煎至七分去滓空心服

○胎漏

氣虛

血虛

血熱

可服固孕之藥

戴云胎漏者謂婦人有胎而血漏下者

參朮飲一治妊娠轉胞

四物湯加

人參

白朮

半夏製

陳皮

甘草

右呔咀入生姜煎空心服

治胎動不安已有所見

艾葉

阿膠

當歸

川芎各三兩

甘草一尺

右每服五錢水煎次下膠令洋溫服

○難產氣血虛故也此蓋九月十月之際不謹守者有之亦有
氣血凝滯而不能轉運者煇月時服野天麻熬膏白湯調下油
蜜小便和極勻治難產 ○入方

砂仁

香附醋煮

枳殼

甘草

右為末湯調下以香油蜜小便和勻各半鍾調益母草末
催生

白芷灰

百草霜

滑石

右為末用芎歸煎湯調下或姜汁服

天麻丸 易產

天麻

即益母草六月間連根採陰乾

右為末不拘多少煉蜜丸如龍眼大煖產時溫酒或白湯化一丸能除產後百病

附諸賢論

王節齋曰婦人半產多在三个月五个月及七个月除跌撲損傷不拘外若前次三个月而墮則下次必如期復然蓋先於此時受傷故後至期必應乘其虛也遇有半產者產后須多服養氣血固胎元之藥以補其虛損下次有胎先於两个半月

後即服固胎藥十數服以防三月之墮至四個月後再服
八九服防過五月又至六個月半月後再服五七服以防七月
及至九個月內服丹溪達生散十數服可保無虞其有連墮
數次胎元損甚者服藥須多久則可以留方用四物湯加人
參白朮陳皮茯苓甘草阿膠艾葉條芩多氣加香附縮砂有
痰加姜製半夏調理妊娠在於清熱赤血條實黃芩為安胎
聖藥清熱故也暑月宜加用之養胎全在脾胃譬猶鍾懸於
梁上軟則鍾下墜折則墮矣故白朮補脾為安胎君藥若因
氣腦致胎不安者宜用川芎陳皮茯苓甘草多加縮砂以佐
水香以行氣

附脈理

脉訣舉要曰男女之別以左右取左疾為男右疾為女沉實在左浮大在右君女左男可以預剖離經六至沉細而滑陣痛連腰胎即時脫血癢弦急而大者生虛小弱者即是死形半產漏下革脉主之弱即血耗立見傾危

附諸方

驗胎方 經脈不行已經三月者

用川芎為細末空心濃煎艾葉湯調下一錢覺腹內微動則有胎也否則是經滯

○胎動不安

安胎散消生方治妊娠自高墜下或為重物所壓觸動胎氣腹痛下血縮砂不拘多少於熨斗內炒令熱却去皮研為細末

每服二錢熱酒調服艾鹽湯亦可

川芎散簡易方治妊婦從高墜下胎氣不和轉動不能腹脰疼痛
南川芎為末每服二錢溫酒調下

佛手散大全良方治妊婦胎動不安血氣衝心欲絕者

當歸去芦酒浸

芎藭各一兩

每服四錢酒一鍾煎乾再入水一鍾煎二三沸溫服

膠艾湯 損動胎下血腹痛

艾葉

阿膠

右二味水煎服

膠艾湯濟生方治妊娠或因頓仆胎動不安腰腹疼痛

熟地黃洗

艾葉炒

白芍藥

川芎

黃芪去芦

阿膠蛤粉炒成末

當歸去芦酒浸

甘草炙各一兩

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片束一枚同煎去滓空心服
杜仲丸濟生方治姙娠三兩月胎動不安防其欲墮須宜服之
杜仲去皮剉姜汁炒去絲川續斷酒浸各二兩

右為末束肉煮爛杵和為丸如梧桐子大每服三十九米粳
安胎當歸湯大全良方療姙娠五月舉動驚愕胎動不安下墜
小腹引腰脇小便疼痛下血

當歸

阿膠

川芎

人參各一兩

炙子二枚

艾一虎口

右細切酒水各二升合煮至三升內膠令烊分二服復中當

安小便當煖也 一方有甘草無參棗

旋覆花湯大全良方瘰癧妊娠大七月間治不安常處亦名阻病

旋覆花二兩厚朴

白朮

枳殼

黃芩

茯苓各三兩半夏炒一方無

芍藥

生姜各二兩

石咬咀每服一兩水鍾半煎至一鍾去渣溫服食前忌羊肉

飴醋桃李雀肉

芍藥湯大全良方治妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡疼乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米泔或青黃寒慄腰皆苦冷痛面目視茫茫

芍藥一兩人參

當歸

甘草各二兩白朮一兩

厚朴二兩薤白切升生姜切四兩

右用水五升酒四升煮取三升分三服日再夜一忌海藻菘菜桃李雀肉等物

二香散聖惠方療妊娠胎動不安氣不升降飲食不美嘔吐酸水起坐覺重宜服

香附子一兩藿香葉

甘草各二錢

右爲細末每服二錢盞沸湯調下

當歸湯大全良方治妊娠胎動盪心煩躁悶絕日乾橫生倒產上衝下築迷悶唇口青黑手足厥冷利名保安飲

當歸

人參各二兩半阿膠一兩炒甘草二兩

右咬咀每服八錢水一鍾半連根葱白一握煎至八分去滓溫服一方無甘草有川芎厚朴產保方有川芎

阿膠散大金良方治妊娠胎動腹中痞痛不思飲食

白茯苓

白朮

川芎各七錢

阿膠炒七錢半

當歸炒

陳皮各一兩甘草二錢

生姜三片

棗二枚

右咬咀每服八錢水一鍾半煎至八分食前溫服

龍骨散大金良方因藥損胎下惡血不止

龍骨

當歸

地黃各八分艾葉炒四分

地榆

阿膠

芍藥

乾姜各六分

蒲黃五分

牛角鰓炙焦三分

右爲末食前未飲調二錢服

當歸散大金良方療妊娠被驚惱胎向下不安小腹痛連腰下血

當歸

川芎各八分阿膠炒

人參各六分

艾葉四分

大棗二枚

茯苓十分

右咬咀每服八錢生姜三片水一鍾半煎至八分去滓食前
溫服

一方 治胎動出血產門痛

用黃連爲末酒調一錢日三服

立聖散 胎動不安于血不止

用鷄肝二具好酒一斤煮熟其酒食之

金匱當歸散

妊娠宜常服之

當歸

川芎

白芍

黃芩各二兩白朮半兩

右五味爲末酒飲調服方寸七日二次

或用酒糊爲丸

梧桐子大每服五十九茶湯往下空心食前服日三次
此方養血清熱之劑也瘦人血少有熱胎動不安素曾半產
者皆宜服之以清其源而後無患也

○廣按婦人有妊娠則碍脾運化遲而生濕濕而生熱古人
用白朮黃芩為安胎之聖藥蓋白朮補脾燥濕黃芩清熱
故也况妊娠賴血以養此方又加當歸川芎白芍以補血
尤為備也服此劑之後尤為易產所生男女兼無胎毒則
痘疹稀少無病易育而聰明智慧不假言矣此端本澄源
之事也累試累驗

安胎飲永類鈴方治懷胎三四月至九月惡阻病者心中潰悶
頭重目昏眩四肢沉重懈墮不欲動作惡聞食氣飲吃醎酸