

校精

張氏醫通

上海錦章書局
出版

長洲石頑張 璞路玉父纂述

諸家類集方藥皆隨論次第。是編逐門但隸專方。其藉古方加減。各門可以通用者。彷彿祖劑之義。另自為卷於後。

中風門

侯氏黑散金匱置金 治大風四肢煩重。心中惡寒不足。

菊花三兩 白朮一兩 防風八錢 桔梗六錢 黃芩四錢 人參 茯苓 細辛 當歸 乾薑 菖蒲

桂枝 牡蠣熬 磬石各二錢

右十四味。杵為散酒服方寸匕。日三服。初服二十日用溫酒調服。禁一切魚肉大蒜。常宜冷食。六十日止。即藥積在腹中不下也。熱食即下矣。冷服自能助藥力。

外臺借此 治風癲疾

大風四肢煩重。

脾土受風水之制。土氣內結。不能敷布於四末也。心下惡寒不足者。胸中為濁氣填塞。心火內蘊。不得發越。熱極反兼寒化也。方中用菊花四十分為君。以解心下之蘊熱。防桂辛桔以升發腠理。來參白朮以實脾杜風。芎歸以潤燥熄火。牡蠣磬石以固滻腸胃。使參朮之性留積不散。助其久功。乾薑黃芩一寒一熱。寒為風之嚮導。熱為火之反間也。用溫酒服者。令藥性走表。以開其屏也。冷食而禁諸熱物者。以磬石得熱而下。不能盡其藥力。以磬石性得冷即止。得熱則下也。○郭壅曰。黑散本為滌除風熱方。中反用牡蠣磬石止滯之味。且令冷食。使藥積腹中。然後熱食。則風熱痰垢與藥漸次而下也。

風引湯金匱一千金 除熱癱瘓。并治大人風引。小兒驚癇瘛瘲。日數十發。

大黃 乾薑 龍骨熬各一兩 甘草 牡蠣熬各二錢 滑石 石膏各一兩 赤石脂 紫石英 白石脂

寒水石如無石鹽代之 桂枝各一兩 右十二味杵篩。以葦囊盛之。取三指撮。井花水三升煮三沸。溫服一升。

集氏借治脚氣

郭壅借治火逆

風者外司厥陰。內應肝木。上隸手經。下隸足經。中見少陽相火。所以風自內發者。由火熱而生也。風生

必害中土。土病則四末不用。聚液成癱。癱者風木挾痰注於四肢也。癇者風熱擾其經脈。內應於心主也。前方祛風外散。此方引風內泄。故用大黃兼甘草桂枝滑石石膏。以化風熱。乾薑以為反譯。使火無格拒之虞。石英寒水

以潤血燥。石脂龍骨牡蠣以補塞其空。總風火復來之路也。

千金三黃湯金匱 治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食。

麻黃 黃芩各三錢 獨活三錢 細辛一分 黃耆六錢 右五味水煎溫服。一服小汗。二服大汗。心熱加大黃錢半。腹滿加枳實一枚。氣逆加人參三錢。悸加牡蠣二錢。渴加桔梗根二錢。先有寒加附子一斤。石頑曰。此方十全云。仲景三黃湯治惡寒經日不止。不欲飲食。全似內外虛寒之候。而方中反用黃芩之苦寒。豈不礙麻黃輩之溫散乎。既用麻黃復用黃耆。豈不礙表氣之閉拒乎。曷知惡寒經日不止。雖有似乎虛寒。而實衛虛不能勝邪所致。不欲飲食亦是風熱內蘊之故。觀煩熱心亂一語。病情灼然。故方中雖以麻黃獨活細辛。開發腠理於外。即以黃芩清解風熱於內。更慮衛虛難於作汗。乃以大劑黃耆助之。與黃耆建中之義不殊。其用黃耆之意有二。一以佐麻黃開發之權。一以杜虛風復入之路也。方後復云。心熱加大黃。言服前藥後心中煩熱不除。知黃芩不能祛之外散。即以本方加大黃以引之下泄也。其枳實加人參。加牡蠣。加桔梗等法。或治旺氣。或助本元。各隨標本而施。加附子者。專佐麻黃之蒸發。助黃耆溫經。殊非陰寒之謂。與麻黃附子細辛湯同源異派。○詳金匱以千金二字名方。珍重之也。千金祖金匱之意而銜其集。曰備急千金方。不忘祖述之本也。

竹瀝飲子針 治風痱身無痛四肢不收志亂不甚者。用此方當先以竹瀝分十生葛汁十分薑汁一分和服。然後用竹瀝飲子。

苦蔥 防己 附子 人參 芎藥 黃芩 甘草 桂心各一粒 羚羊角三分 石膏六分 杏仁
十四 麻黃 防風各分 右十三分。水煮減半。內竹瀝十分。生葛汁五分。薑汁半分。分三服取汗。間二三日更服一劑。三服後隨病進退增減。

地黃飲子 治腎氣不上交於心。舌瘡足痱。

熟地黃三兩 巴戟天酒浸去骨肉從筍酒浸去骨 山茱萸去核石斛 附子炮 白茯苓 石菖蒲 遠志甘草湯泡去甜肉桂 茶門冬去心 各五味子五錢 共為麞末。每服五錢。生薑五斤。大棗一枚。薄荷七葉。水煎日二服。服無時。喻嘉言曰。方中桂附巴戟原為驅逐濁陰痰涎而設。不可執已見而輕去之。

天麻丸 治腎藏虛熱生風

天麻

牛膝

二味酒浸
二日培

川草薢

黑參

羌活各四兩

杜仲

酒炒七兩附子一枚

當歸十兩

生地黃

酒浸培十六兩

為末。煉白蜜丸。侵晨沸湯臨卧溫酒送七十丸。方中雖以歸地補養陰血為君。其妙用全在天麻與牛膝同浸同焙。俾風痰濁濕咸從下趨而不敢上。遂得力又在附子之雄。引領歸地直入下焦。填補其空。使風邪無復入之處。草薢杜仲以桂在裏濕熱羌活黑參以疎在表風熱。標本合治有法。斂散各得其宜。此方具矣。

牛黃清心圓

局方
歲定

治初中痰涎壅盛。昏憒不言。語言蹇澀。懶瘧不遂。一切痰氣閉塞證。

牛黃

羚羊角

勿經火
錢五分
燒為末

茯苓

白朮

生用桂心

當歸

甘草各三錢

麝香

雄黃各二錢

龍腦半錢

人參

犀角各五錢

右十二味各取淨末配勻。蜜和成劑。分作五十丸。金箔為衣。待乾蠟護。臨用開化沸湯薑

湯任下。

原方尚有防風黃芩麥門冬白芍柴胡桔梗杏仁芎藭阿膠大豆

黃卷蒲黃
神龜白蠍
乾薑薯芋大棗一十六味因太冗雜故去之

清心牛黃圓

治暴中神昏不語。痰塞心包。口角流涎。煩熱氣急。一切痰熱閉遏證。

西牛黃

三錢陳膽南星一兩黃連

蜜五錢當歸炒五錢當歸

甘草

錢五分辰砂五錢水飛

為極細末。蒸餅和勻。分作五十丸。

金箔為衣。候乾蠟護。臨用剖開。生薑湯薄荷湯人參湯量虛實選用調化服。

至寶丹

局方
裁定

治諸中卒倒。痰飲血氣俱閉。寒熱交錯者。

生烏犀肉

錢五分研水飛

雄黃

研水飛

生玳瑁

錢五分研各一兩

琥珀

勿見火研各一兩

麝香

研各五錢

金銀箔各五錢

西牛黃

半兩

安息香

錢五分研各二兩

灰酒飛過去沙土約取淨一兩

右將犀角為細末。入餘藥研勻。將安息香重用湯者。後入諸藥

和搜成劑。分作百丸。候乾蠟護。臨用剖開。參湯調化二丸。卒中山嵐障氣及產後惡血攻心。童便入薑汁化服。

蘇合香圓

局方
裁定

治傳屍瘡疖。心腹卒痛。僵仆不省。一切氣閉屬寒證。

蘇合香

另研色者佳

安息香

無灰酒熬研各二兩

薰陸香

另研龍腦另研

丁香

麝香另研各一兩

青木香

研各一兩

白朮

半兩

沉香

另研極細香附

烏犀肉

錢五分研極細

右十一味

為末逐一配勻。涼膏加煉白蜜和劑。分作五十丸。另以硃砂一兩

水飛為衣。蠟護臨用剖開。井花水生薑湯溫酒化下一丸。

原方尚有白檀香草薑橘脣脣三味。因太濃厚故去之。

之嚮導與至寶丹中

李士材曰。牛黃圓。蘇合香圓。皆中風門中奪門之將。而功用迥異。熱阻闕竅。用牛黃圓開

之寒阻關竅。用蘇合香開之。若夫口開手撮眼合聲鼾。自汗遺尿等虛脫證。急用參附峻補庶或可救。若用牛黃黃蘇合之藥。入口即斃也。

稀涎散 治中風卒倒。痰涎擁盛者。脈氣虛微禁用。

豬牙皂角四條去皮子
附子另為末 白礬半兩半生
半枯為末 每用三字。溫水灌下。未甦少頃再用。一方用巴豆六粒。去皮膜研壓去油。入礬中鎔化。待礬枯為末。和牙皂末拌勻。每用四五分。吹入鼻中即吐。○濁氣風湧而上。則清陽失位倒置。故令暴作。以此先治其標。使咽喉疎通。能進湯藥便止。若欲攻盡其癥。則液無以養筋。令人痙急筋枯。此為大戒。

舒筋三聖散 治口眼喎斜。左急右緩。血脈牽邪者。

當歸 肉桂 延胡索等分 為散。每服五錢。水煎去滓。早暮各一服。

參歸三聖散 治風中血脉。左半肢廢。口目左喎。

舒筋三聖散。去延胡索加人參。風中血脉。急需流布營氣。營行脈中。便不當泛用風藥。所謂血行風自滅也。至於左半肢廢。氣血不能運行。延胡耗血。胡敢輕試。必藉人參引領。當歸肉桂。何慮虛風之不散乎。

正舌散 治驚癇堵塞。數隧。肝熱生風。舌強不正。

蠍尾去毒液
泡炒三錢 茯苓汁一兩
拌醒 為散。每服二錢。溫酒調服。并擦牙齦。日三度。○面赤倍蠍尾。加薄荷半兩。每服四錢。水煎熱服。取汗效。

解語湯 治中風脾緩。舌強不語。半身不遂。

防風 天麻爛切
附子
汁拌培
各一錢 束仁炒研
各五分 羚羊肉燒 觀桂 羌活各八分 甘草錢五分 水煎入竹瀝半

杯蓋汁數口。服無時。脈虛加人參。

祛風定志湯 治心虛驚悸。不能言。

防風 束仁炒研人參
各一錢 當歸各一錢 遠志肉二錢 橘紅 葛蒲 南星泡 茯苓各八分 羌活 甘草

五分 生薑五片 水煎服無時。

五分 生薑五片 水煎服無時。

甄權防風湯金 治偏風

防風 蒿窮 白芷 牛膝 狗脊 草薢

白术各三錢

羌活

葛根

附子外臺作人參

杏仁

薏苡仁 石膏

桂心各九錢

麻黃一兩

生薑

兩半

右十六味水煎分三服并針風池肩鶴曲池支溝

五樞陽陵泉巨虛下廉各一。凡七穴一劑覺好更進一劑即針一度。九劑九針即瘳火亦得。

薏苡仁湯 治中風濕痹關節煩疼不利。

薏苡仁一兩

蓋

湯泡

芍藥

酒洗

當歸

各錢半

麻黃

去節

桂

分

蒼朮

去皮

芝麻

拌炒

一錢

甘草

分

生薑

斤

水煎服無時

若

自汗加石膏煩熱夜痛加酒黃柏。厥冷拘急加熟附子。

升麻胃風湯 治胃風能食手足麻聾目瞤面腫。

升麻 當歸

白芷

葛根

六錢

蒼朮

製八

麻黃

去節

藁本

羌活

各二錢

白芷

黃芩

研

蔓荆

四分

柴胡

水煎食遠服

按風入胃府大便清血四射用人參胃風湯之桂

芍。祛之內散風入胃經面目瞤動面腫者用升麻胃風湯之升葛麻黃輩。祛之外散不可不辨。

犀角升麻湯 治風熱頭面腫痛。頰上如湖咽喉不利。

犀角錢三升麻一錢五分

防風

羌活

各二錢

白芷

黃芩

白附子

各六錢

甘草

分四

水煎食遠溫服

烏藥順氣散治暴中風氣攻注遍身麻痺。語言蹇澀口眼喎斜。喉中氣塞有痰聲者。

烏藥去根橘皮

治暴

方

甘草

分五

生薑

三片

大棗

一枚

水煎食遠服

按風入胃府大便清血四射用人參胃風湯之桂

芍。祛之內散風入胃經面目瞤動面腫者用升葛麻黃輩。祛之外散不可不辨。

解風散 治風成為寒熱頭目昏眩。支體疼痛。手足麻痺。上膈壅滯。

人參兩半 麻黃去節兩半

荳窮

獨活

細辛

甘草

分各一兩

為散

每服四五錢

入生薑五片

薄荷七葉

水煎服

按此本千金三黃湯去者今加參荳窮甘草。彼主杜風清熱此主解散虛風同源異派○今人但知人參為

補虛之藥不知人參有祛邪蕩實之功此證因虛風久襲若獨用麻黃無人參助其胃氣必不能克效也

古今錄續命湯方祖

近效白朮附子湯木附

千金八風續命湯麻黃

千金獨活湯桂枝

三生飲督風湯下

四君子湯方祖

二陳湯方祖

小續命湯續命湯下保元

三化湯承氣湯下

六君子湯四君子湯下

大秦艽湯四物湯下

十全大補湯保元湯下

大建中湯保元湯下

人參養營湯保元星子湯下

大省風湯星子湯下

八味順氣散四君子湯下

千金附子散麻黃湯下

省風湯星子湯下

秦艽升麻湯升麻湯下

滌痰湯二陳湯下

涼膈散方祖

星香湯方祖

導痰湯二陳湯下

黑錫丹金液丹下

補中益氣湯保元湯下

麻黃附子湯麻黃湯下

倉公當歸湯麻黃湯下

胃苓湯平胃散下

千金排風散續命湯下

黃耆建中湯桂枝湯下

小柴胡湯方祖

當歸補血湯保元湯下

當歸補血湯保元湯下

星香湯星子湯下

導痰湯二陳湯下

傷寒門

香蘇散方 治感冒四時不正之氣。

香附薑汁勿炒浸紫蘇葉各二兩 橘皮一兩 甘草炙五錢 為散。每服半兩。加生薑三片。大棗一枚。水煎去滓。服暖覆。

取微汗。日三夜一服。以得汗身涼為度。

芎蘇散 治三時感冒。偏於血分者。

半夏 桔芩 橘皮 葛根 柴胡 柴蘇 川芎 枳殼 桔梗等分 甘草炙減半錢 為散。

每服半兩。加薑東煎服。取微汗效。本方去川芎。柴胡。加入參。木香。名參蘇飲。治虛人感冒。偏於氣分者。

十神湯局方 治感冒頭痛。

麻黃去節五分 葛根 紫蘇 香附 橘皮 芎藥 川芎炙一錢 白芷 升麻 甘草炙各五分

生薑五分 茯白四莖 水煎去滓。熱服。取微汗。

大陷胸丸王 治結胸項強如柔症。狀下之則和。

大黃八兩 茯苓半升 芒硝半升 杏仁半升去皮尖熱 右四味搗篩二味。內杏仁芒硝合研如脂。和散取如彈丸一枚。別搗甘遂末一錢。亡白蜜二合。水二升煮。取一升溫頓服之一宿乃下。如不下。更服取下為效。禁如藥法。

大陷胸湯主 治結脳熱實脈沉而緊心下痛按之石難升。

大黃二兩芒硝三合甘遂一錢右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服。

小陷胸湯玉山治小結胸正在心下按之則痛脈浮滑者。

黃連三錢半夏三合枯草實一枚右三味以水六升先煮枯草取三升去滓內諸藥煮取二升去滓分溫三服。

葱白香豉湯十金治時疫傷寒三日已內頭痛如破及溫病初起煩熱。

葱白連鬚一握香豉三合右二味水煎入童子小便一合日三服秋冬加生薑二兩按本方藥味雖輕功效最著凡虛人風熱伏氣發溫及產後感冒靡不隨手獲效。且產後荆後用伏龍肝湯丸不殊既可探決死生且免招尤取謗真危證解圍之良劑也。

加減葱白香豉湯 治三時風熱咳嗽咽喉腫痛難用葳蕤湯者用此代之此即葱白香豉湯葱白減半加葳蕤

二錢白薇青木香桔梗各一錢甘草薄荷各三分白蜜三匕

萎蕤湯十金

治風溫自汗身重及冬溫發熱咳嗽。

萎蕤錢半石膏二錢碎白薇二錢青木香去節麻黃去梗杏仁去皮尖碎甘草炙獨活錢半芎藭錢一右九味水煎

日三服一方有葛根一錢按十全大補丸乃長沙麻黃升麻湯之變方為冬溫咳嗽咽乾痰結發熱自利之專藥以冬時有非節之暖則陽氣不藏少陰受病故首推萎蕤之潤燥止咳為君佐以白薇青木香苦鹹降泄即春時伏氣發溫更感於風之證亦不出此以葛根為少陰厥陰二經之嚮導也麻黃為發汗之重藥得石膏則有分解寒熱互結之功倘病勢較輕不妨於中裁去麻黃石膏獨活芍藥杏仁等味合以葱白香豉之類未為不可如果勢熱紛斜急瀆開泄者麻黃石膏又所必需在用方者臨病之權衡耳。

犀角地黃湯十金治傷寒溫病一應發汗而不得汗內畜血及鼻衄吐血不盡內餘瘀血大便血面黃或中脘作痛。

犀角 生地黃酒浸另搗牡丹皮

右四味水煎去滓入地黃再煎數沸濃清服喜忘如狂加大黃

黃芩脈大來遲腹不滿而自言滿者加當歸肉桂吐衄加藕汁童便扁柏

傷寒

卷十三

長
氏
醫
通

豬膚湯 玉 治少陰伏熱咽痛。

豬膚湯 玉 五兩搏光後以水煎去滓加白蜜白粉熬香和相得溫分六服。

黃連阿膠湯 玉 治熱傷陰血便紅。

黃連 二錢 黃芩 一錢 芍藥 二錢 阿膠 三錢 雞子黃 一枚 右五味水煎去滓入阿膠烊盡小冷。入雞子黃攪匀服。

葛根黃芩黃連湯 玉

治誤下痢不止脈促喘而汗出。

葛根 半兩 黃芩 二錢 黃連 三錢 甘草 錢

右四味先煮葛根次內諸藥去滓分溫再服。

人中黃散 治瘡瘍溫。

人中黃 一兩 雄黃 辰砂各一錢

為散每服二錢薄荷桔梗湯下日三夜二服。

導赤瀉心湯

治熱傳手少陰神昏。

黃連 酒洗 黃芩 酒洗 山梔 蜜製滑石碎炒黑

知母 犀角 甘草生人參

麥門冬去心茯神各一錢

生薑 三片 大棗 三枚 炙燈心 一握

水煎熱服此湯專治傷寒。熱傳手少陰心經之證。蓋取金匱瀉心湯為主。以其熱在上而不任下。病在氣而不在血。故於本方裁去大黃。易入山梔以清包絡之熱。知母犀角以解肺胃之煩。

人參麥冬甘草茯神以安君主之神。滑石為導赤之嚮道。薑棗為散火之間。使用犀角者即道赤散中之地黃。用滑石者即導赤散中之木通。雖無導赤散中藥味而導赤散之功效備其中矣。嘗見時師畏人參助火除去不用。此與驅饑疲而禦大敵何異哉。

桂枝湯 方祖

麻黃湯 方祖

大青龍湯 麻黃

五苓散 方祖

桃核承氣湯 承氣

黃龍湯 承氣

承氣湯 方祖

小柴胡湯 三黃

藿香正氣散 平胃

瀉心湯 方祖

大黃黃連瀉心湯 三黃

附子瀉心湯 三黃

桔子豉湯 方祖

枳實桔子豉湯 桔子豉

當歸四逆湯 桂枝

枳實理中湯 桂枝

白通湯 四逆

通脈四逆湯 四逆

黃耆建中湯 桂枝

理中湯 桂枝

越婢湯 麻黃

桂枝二越婢一湯 桂枝

黃芩湯 桂枝

白虎湯 方祖

涼膈散 方祖

雙解散 散下

黃連解毒湯 三黃湯下

三黃石膏湯 三黃湯下

三黃梔子豉湯 三黃湯下

清熱解毒湯 白虎湯下

人中黃丸 三黃湯下

生料六味丸 八味丸下

四逆加人參湯 四逆湯下

保元湯 方祖

異功散 四君子湯下

乾薑人參半夏丸 八物理中湯下

附子理中湯 理中湯下

附子湯 木附

回陽返本湯 四逆湯下

生地黃黃連湯 四物湯下

生脈散 方祖

暑門

一物瓜蒂湯 金匱 治夏暑以水灌汗。身熱疼痛。

瓜蒂十四個熟剉 右一味水煎去滓頓服少項即吐不吐探之。此方之妙全在探吐以發越鬱遏之陽氣則周身汗出表和而在內之煩熱得苦寒湧泄亦蕩滌無餘今人目睹其方而不知用醫道之陋何竟若此。

消暑十全散 治傷暑兼感風邪發熱頭痛。

香薷二錢

葛根炒

陳皮

甘草炙

白术

茯苓

木瓜

藿香

蘇葉各一錢

厚朴

薑製

水煎

熱服無時取微汗效。

香薷飲局方 治傷暑腹中不和煩渴引飲。

香薷二錢

厚朴薑製

篇豆炒研

甘草炙

水煎

井中沉冷服之身熱欲得汗者熱服。

黃連香薷飲活 治傷暑大熱煩渴。

香薷二錢

黃連酒炒

厚朴薑製

篇豆錢五分

甘草錢一錢

水煎

導赤散局方 治小腸實熱小便赤濁。

生地黃五錢

木通

甘草梢各一錢

竹葉一握

右四味水煎熱服。漏血加辰砂五分。一方多盤草半錢前

十味香薷飲 治傷暑體倦神昏頭重吐利。

香薷二錢

人參

黃耆酒炒

白朮

茯苓

甘草炙

篇豆

陳皮

醋炒

厚朴薑製

木瓜錢一錢

水煎

欲作汗服。欲利小便冷服。

茯苓

甘草炙

篇豆

陳皮

醋炒

厚朴薑製

木瓜錢一錢

水煎

六和湯 治傷暑霍亂煩悶喘嘔吐瀉。

香薷 二錢人參 茯苓 甘草炙 磁豆 厚朴薑製木瓜 杏仁皮失去半夏一錢

炒研各生薑三片大棗一枚水煎熱服

清暑益氣湯保元陽下

炒研各生薑三片大棗一枚水煎熱服

益元散方祖陽下

白虎湯方祖白虎湯下

竹葉石膏湯白虎湯下

消暑丸二陳湯下

藿香正氣散平胃散下

養胃湯平胃散下

大順散理中湯下

冷香飲子四逆湯下

漿水散四逆湯

來復丹丹下金液

小半夏茯苓湯二陳湯下

生料六味丸八味丸下

蒼朮白虎湯白虎湯下

參苓白朮散四君子湯下

錢氏白朮散四君子湯下

黃連解毒湯三黃湯下

桂苓丸五苓散下

保元湯方祖

清燥湯保元湯下

補中益氣湯保元湯下

濕門

羌活勝濕湯 治風濕上衝頭痛項似拔腰似折。

羌活 獨活 防風 川芎 蕤本 蕤本

蔓荆子碎 甘草炙各生薑三片

水煎熱服緩取微汗

過汗則風去濕不去也如無頭痛去蔓荆子換蒼朮

除風濕羌活湯 治風濕相搏一身盡痛日晡發熱。

羌活 防風 柴胡 蕤本 蕤本

蒼朮治製各升麻八分生薑一片水煎空心熱服。覆暖取微汗。按

羌活勝濕湯與除風濕羌活湯同源異派此治頭項之濕故用羌防芎蕤一派風藥以祛上盛之邪然熱雖上浮濕本下著所以復用獨活透達少陰之經其妙用尤在緩取微汗之法故劑中加用甘草以緩諸藥辛散之性則濕著之邪亦得從之緩去無藉大開汗孔急驅風邪之法使肌腠餒弱無力勝邪因之內縮但風去而濕不去也其有腰以下重寒濕之邪留於陰分也本方加防已以逐濕必兼生附以行經或見身重腰沉沉然濕熱之邪遍於陽分也本方加蒼朮以燥濕必兼黃柏以清熱非洞達長沙附桂附梔子柏皮等方不能效用其除風

漏羌活湯治外淫之濕而無上衝頭項之痛。則川芎蔓荆無預也。亦無濕著腰疼之患。與獨活尤無交涉。故但用羌防藁本。益入升柴蒼术。開提周身關腠。則濕邪自無所容而外散矣。

神木湯局方 治風木之邪。內干濕土。泄利下血。

蒼术甘浸油拌炒 藁本 川芎 羌活各一 白芷 甘草炙 細辛分 生薑三片 芫白二莖連鬚 右九味水煎

熱服。按神木湯純用風藥。與羌活勝濕相去不遠。如何可治泄利下血。蓋火淫陽明之血。則燥金受傷。祇合清涼。最嫌風燥。若風來太陰之血。則濕土被鬱。法當升散。切戒寒涼。當知陽明來者。色必鮮明。太陰來者。色必清稀。其源各異。故其治亦迥乎不侔。究其旨。不越風能勝濕之義。蒼术專主木邪乘土。故能治外內諸邪。以風木之邪內干土藏。故用羌藁芷等風藥。兼川芎以引入血分。甘草以調和胃氣。胃氣敷布有權。泄利下血自止。蓋汗即血之液。每其汗則血中之濕熱邪氣悉從外泄而無內滯之患矣。

升陽除濕防風湯即升陽防風湯 治風濕飧泄及腸風滯下便血。

防風二錢 蒼术甘浸去皮 飯上蒸 白术 土蒸 茯苓 白芍各一 生薑一片 水煎熱服取微汗。陽陷於下。則成飧泄。

濕犯於上。則令頭痛。清濁倒置而然。故用風藥以勝濕也。然風木之病。稍加桂枝甘草監制。其功尤捷。

茵陳蒿湯王玉山 治濕熱發黃。便祕服實。

茵陳蒿五錢 桀子五枚 大黃三錢

右三味水煎熱服。微利黃水去為度。未去越三日再服。按茵陳蒿湯。其旨

全在通利水道。不得不借幽門為嚮導爾。

清熱滲濕湯 治夏月濕熱痿困。煩渴泄瀉溺赤。

黃柏鹽酒炒黑三錢 蒼朮去皮同芝麻炒 白朮生 茯苓 濤瀉 黃連酒炒一錢 各 甘草炙五分 竹葉十片 水煎熱服小便

利為效。老人虛人加肉桂少許。氣虛喘之加人參。脈虛合生脈散。內傷生冷加炮薑。按此本二妙合五苓之半。加黃連甘草以燥夏令之濕熱良可法也。

當歸拈痛湯 治濕熱走注。遍身骨節痠疼。胸膈不利。足脰赤腫重痛。

羌活 甘草炙 黃芩 茵陳酒炒名一錢 人參 苦參酒洗 升麻多汗易黃芩 萬根 蒼朮油浸自汗易桂枝

歸身各六白术
蓋製防風下腫易知母
寒熱易黃芩
澤瀉各八水煎熱服無時此濕熱攻腫之聖方若不赤不腫痛上不熱為寒濕禁用

滲濕湯

理中湯下

五苓散

方祖

除濕湯

平胃散下

腎著湯

理中湯下

黃者建中湯

桂枝湯下

小建中湯

桂枝湯下

苓桂术甘湯

桂枝湯下

小青龍湯

桂枝湯下

麻黃加术湯

麻黃湯下

麻黃杏仁薏苡甘草湯

麻黃湯下

敗毒散

小柴胡湯下

五積散

平胃散下

防己黃耆湯

方祖

桂枝附子湯

桂枝附子湯下

白术附子湯

桂枝附子湯下

甘草附子湯

桂枝附子湯下

桂枝湯

方祖

桂苓甘露飲

五苓散下

虎潛丸

大補丸下

神芎丸

三黃湯下

瀉心湯

方祖

六君子湯

四君子湯下

清燥湯

保元湯下

春澤湯

五苓湯下

控涎丹

十味湯下

地黃飲子

中風門

黑錫丹

金液丹下

生脈散

方祖

濟生腎氣丸

八味丸下

燥門

五味子湯

金千

治傷燥咳唾中有血引胸脇痛皮膚乾枯

五味子

五分炒研

桔梗

甘草

紫菀草

續斷

竹茹

桑根皮

桑根皮

蜜炒各一錢

生地黃

桑根皮蜜炒各一錢

紫菀草

續斷一錢

竹茹

蜜炒各一錢

五味子

七分甘草分五

麥門冬

去心二錢

桑根皮

蜜炒半夏

生地黃

蜜炒

紫菀草

續斷一錢

五味子

五分

竹茹

蜜炒各一錢

麻黃

七分

甘草

蜜炒各一錢

五味子

五分

竹茹

蜜炒各一錢

赤小豆

蜜炒一錢

赤小豆

蜜炒一錢

五味子

五分

竹茹

蜜炒各一錢

五味子

蜜炒各一錢

五味子

蜜炒各一錢

五味子

五分

竹茹

蜜炒各一錢

五味子

蜜炒各一錢

五味子

<

若爾則金匱麥門冬湯竹葉石膏湯俱不足法耶。

地黃煎

治風熱心煩。咳喘便祕。脾胃熱壅。食不下。

生地黃汁

枸杞子汁

各二味酒搗

荆瀝

竹瀝各半斤

真酥

生薑汁各一

人參

天門冬一兩去心各

白茯苓

八錢大黃

酒蒸

梔子

薑汁炒黑各五錢

右十一味以後五味為細末入前六汁內調方服寸口再服漸加以利

為度。

生地黃煎

治積熱煩渴。日晡轉劇。喘咳而赤能食便祕。

威蕤

知母

茯神

枯萎根

鮮地骨皮各二兩

石膏碎四兩

生地黃汁

二升

麥門冬汁

白蜜各一

合

生薑汁

二合竹瀝半升

右咬咀以水一斗二升先煮諸藥取汁三升去滓下竹瀝

地黃門冬汁緩火煎至四升

下煉白蜜薑汁再煎數沸初服三合日三夜一服加至四合夏月為散收薑汁竹瀝焙乾蜜丸服前膏尤妙

喻嘉言曰此方生液涼血製火散熱兼擅其長再加人參乃治虛熱之良劑然非能食便祕者斷不可施

通幽湯

治大便燥結便出堅黑

油當歸

二錢升麻

三分醋浸桃仁泥

一錢甘草生姜各五分

紅花少許熟地黃

生地黃各五分

水煎將成用藥汁磨

甘草鐵一錢

水煎

將成用藥汁磨

甘草鐵一

潤燥湯

通幽湯加麻仁大黃各一錢

清涼飲

治上焦積熱肺氣不化口舌乾燥

黃連

黃芩

薄荷

黑參

當歸

赤芍藥各五分

甘草鐵一

水煎

入生白蜜一匙

熱服

按清涼飲治上焦之燥熱故用薄

秘結加酒蒸大黃

四順清涼飲

一名四順飲

治血熱便祕脈實者

當歸

赤芍

甘草

大黃

酒蒸各五分

水煎入生白蜜一匙

熱服

按清涼飲治上焦之燥熱故用薄

荷之辛散四順飲主下焦之燥結故用大黃之苦寒功用天淵

麻仁丸王玉 治脾約大便燥結。

厚朴炒 薑汁 苓藥 枳實炒各二錢 大黃四錢 麻仁泥 杏仁各錢半

右六味為末。煉白蜜丸梧子大。飲服五

十九日三服。以利為度。

潤腸丸 治大腸風熱血祕

麻仁另研各一兩 桃仁另研各半兩 畏活

當歸各半兩 大黃紙裹煨半兩 皂角仁

秦艽名半兩一錢 除二仁另研外。為

細末。蜜丸梧子大。每服五十丸。食前溫酒下。○本方加郁李仁防風。名潤燥丸。

猪膽導王玉

大猪膽一枚。瀉汁和醋少許。以灌穀道中。如一食噴。當大便出。虛人不可用。膽導陳醬薑陳醬瓜皆可削為道。濕熱肥盛痰悶。可用黃瓜根浸濕削之為導。此即土瓜根導也。

蜜煎導

白蜜七合。一味內銅器中。微火煎之。稍凝如鉛狀。攬之勿令焦者。欲可丸。并手捻作挺。令頭銳大如指。長五寸。當熱時急作。冷則硬。納穀道中。以手急撮。欲大便去之。

異功散四君子湯下

六味丸八味丸九下

固本丸二冬膏下

滋燥養營湯四物湯下

大補地黃丸四物湯下

虎潛丸大補丸九下

火門

紫雪方 治腳氣瘡毒。内外熱熾。狂越躁亂。心腹疼痛。口舌生瘡。一切實火閉結。諸藥不效者。

黃金十兩。貨金鋪 中葉子有効) 用水三斗。先煮一斗。旋添煮至一斗為度。去金取汁。煮下項藥。

石膏 寒水石如無真者。元精石代之。 磁石 醋煅白滑石各五兩 上四味。搗入前汁中。煮至五升。入下項藥。

烏犀角鎔 犊羊角鎔 青木香切 沉香研各五錢 黑參切 丹麻各一錢 生甘草八錢 丁香搗研一錢 上八味。入前汁中。煮取一升五合。去滓入下項藥。

芒硝一兩。鐵硝三兩

上二味入前藥汁中。微火上煎。柳木搘攪不住手。候有七合半。投在水盆中。半日欲疑入

下項藥

硃砂
研細水飛
五錢

研一錢
二分

上二味入前藥中攪勻勿見火。寒之三日候凝結成霜紫色。鉛罐收貯。

每服一分至二分。杵細冷水或薄荷湯調下。小兒以意量減。此即十金立霜局方於紫雪方中。參入甘草丁香硃砂三味。遂用紫雪之名。一方而兼兩方之製。但此專主石藥毒火。方中丁香一味。用方者審之。黃金本無氣味。必鋪中葉子。曾經煉煥煮之方有性味。以其香味易散。故較原方減小其製。

碧雪局方 治一切積熱咽喉腫痛。口舌生瘡。心中煩躁。咽物妨悶。或喉閉壅塞。水漿不下。天行時疫。發狂昏憤。並皆治之。

寒水石

芒硝

石膏
煅飛
青黛

馬牙硝

朴硝

硝石

甘草各等

右將甘草煎湯二升。

去滓却入諸藥再煎。用柳木篦不住手攏令消鎔得所。却入青黛和勻。傾入砂盆內。候冷結凝成霜。研為末。每用少許。含化嚥津。不拘時候。如喉閉壅塞。不能嚥物者。用小竹筒吹藥入喉中。頻用神效。

朴硝煎

金
治服石藥成消瀉大渴者。

朴硝
一觔
芒硝八兩
石膏二兩
寒水石四兩

右四味先內二硝於八升湯中。攪令消。以紙密封。一宿取清內銅

器中。別搗寒水石膏碎如豆粒。以絹袋盛之納汁中。以微火煎候其上有溟起。以箸投中。著箸如凌雪凝白。急下瀉。益中。待凝取出。烈日曝乾。積熱困悶不已者。以方寸匕白蜜一合。和冷水五合。攪和令消。頻服之。日二熱定即止。止武德中貴高人加金二兩

八味丸

方祖
人加金二兩

保元湯

方祖

解毒湯

三黃
湯下

火鬱湯

升麻
湯下

瀉陰火升陽湯

保元
湯下

升陽散

火湯升麻

佐金丸

方祖

當歸龍鬚丸

三黃
湯下

黑錫丹

金液
湯下

四君子湯

方祖

六味丸

八味
丸下

生脈散

方祖

傷飲食門

枳實導滯湯 治傷濕熱之物。痞悶不安。

枳實炒三錢 白术炒佳五錢 茯苓三錢 黄芩酒炒二錢 黃連三錢 澤瀉錢二大黃酒蒸一兩 神鈞炒四錢 生薑三片 水煎食速服。此枳木香化滯湯而兼五苓之製。以祛濕熱宿滯也。

木香化滯湯 治氣食痞結腹微痛不思飲食。

半夏甘草炙 草豆蔻研各一錢 柴胡 木香 橘皮各六分 枳實炒當歸各四分 紅花一分 生薑五片 水煎食遠稍熱服。

保和丸 治宿食酒積。

山楂肉
薑汁泡二兩 半夏炒
鹽汁橘紅炒 神鈞炒便血參藥
用紅鈞炒去茯苓 連翹 茶服子 黃連
薑汁炒各五錢 未水泛為丸每服二錢茶清送下。本方加炒白术二兩名大安丸。按保和丸大安丸中參藥傷胃。菔子傷肺。胃之氣恐非丸劑所宜久服之品。當易枳實香附子。功用不殊而不致傷犯先後天之真氣也。

紅丸子 治宿食冷積作服。

荆三棱炒 莪蕤炒 青皮炒 陳皮炒 乾薑
炒各分 為末。陳酒鵝糊丸。梧子大。礬紅為衣。每服二十五丸。

食前沸湯下。小兒量減。

葛花解醒湯 治傷酒嘔吐胸痞小便不利。

葛花 白豆蔻 砂仁
炒各一錢 青皮炒 神鈞炒 澤瀉 乾薑
各五分 白术炒 八人參 橘紅 茯苓

豬苓各四分 木香一分 水煎服。但得微汗則酒濕去矣。按此雖本五苓四君子益入葛花豆蔻等辛散之味大捐元氣。世人不知妄謂方中人參有補益之功。恃此縱飲是自伐其天也。

鞠藥丸 治酒積成癖腹脹滿痛。後便精沫。

神鈞炒 麥蘖炒去蕊黃連半兩同巴豆七粒炒去巴豆一兩 加炮薑二錢。下鮮血倍黃連下瘀血。加紅薑一兩。

塌氣丸 治肝氣乘脾腹脹。

胡椒一兩 蠟尾去毒液醋泡去。為末。鞠藥丸。粟米大。每服二十九米飲下。