

S2651-7

890

傷寒

千全方術義人卷二



孫真人千金方衍義卷九

長洲張璐路玉著

南沙席世臣郢客校

傷寒方上 凡九類

傷寒例第一 論三首

論曰易稱天地變化各正性命然則變化之迹無方
性命之功難測故有炎涼寒燠風雨晦冥水旱妖災
蟲蝗怪異四時八節種種施化不同七十二候日月
運行各別終其晷度方得成年是謂歲功畢矣天地
尚且如然在人安可無事故人生天地之間命有遭

際時有否泰吉凶悔吝苦樂安危喜怒愛憎存人憂
畏關心之慮日有千條謀身之道時生萬計乃度
口是故天無一歲不寒暑人無一日不憂喜故有大
行瘟疫病者卽天地變化之一氣也斯蓋造化必然
之理不得無之故聖人雖有補天立極之德而不能
廢之雖不能廢之而能以道御之其次有賢人善於
攝生能知撙節與時推移亦得保全天地有斯瘴癘
還以天地所生之物以防備之命曰知方則病無所
侵矣然此病也俗人謂之橫病多不解治皆曰日滿
自瘥以此致枉者天下大半凡始覺不佳卽須救療



迄至於病愈湯食競進折其毒勢自然而瘥必不
令病氣自在恣意攻人拱手待斃斯爲誤矣今
羣經以爲上下二卷廣設備擬好養者可得詳
小品曰古今相傳稱傷寒爲難治之疾時行瘟疫是
毒病之氣而論治者不判傷寒與時行瘟疫爲異氣
耳云傷寒雅士之辭天行瘟疫是田舍間號耳不說
病之異同也考之衆經其實殊異矣所宜不同方說
宜辨是以略說其要經言春氣溫和夏氣暑熱秋氣
清涼冬氣凜冽此四時正氣之序也冬時嚴寒萬類
深藏君子固密則不傷於寒或觸冒之者乃爲傷寒

耳其傷於四時之氣皆能爲病而以傷寒爲毒者以其最爲殺厲之氣也中而卽病名曰傷寒不卽病者其寒毒藏於肌骨中至春變爲溫病至夏變爲暑病暑病熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫病熱病者皆由冬時觸冒寒冷之所致非時行之氣也凡時行者是春時應暖而反大寒夏時應熱而反大冷秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中病無長少多相似者此時行之氣也傷寒之逐日深淺以施方治今世人得傷寒或始不早治或治不去病或日數久淹困乃告師



苟依方次第而療則不中病皆宜臨時消息制方乃
有效耳

華佗曰夫傷寒始得一日在皮當摩膏火灸之卽愈
若不解者二日在膚可依法鍼服解肌散發汗汗出
卽愈卽不解至三日在肌復一發汗卽愈若不解者
止勿復發汗也至四日在胸宜服藜蘆圓微吐之則
愈若病困藜蘆圓不能吐者服小豆瓜蒂散吐之則
愈也視病尙未醒醒者復一法鍼之五日在腹六日
入胃入胃乃可下也若熱毒在外未入於胃而先下
之者其熱乘虛入胃卽爛胃也然熱入胃須要下去

之不可畱於胃中也胃若實熱爲病三死一生皆不
愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出此候五死一
生劇者黑斑出者此候十死一生但論人有強弱病
有難易得效相倍也得病無熱但狂言煩躁不安精
彩言語不與人相當者勿以火迫之但以猪苓散
一方寸七服之當逼與新汲水一升或二升強飲之
令以指刺喉中吐之病隨手愈若不能吐者勿強與
水水停則結心下也當更以餘藥吐之皆令相当不
爾更致危矣若此病輩不時以猪苓散吐解之者其
死殆速耳亦可先以去毒物及法鍼之无佳夫飲膈



實者此皆難治此則三死一生也病者過日不以勝
下則熱不得泄亦胃爛斑出春夏無大吐下秋冬
大發汗法冬及始春大寒時宜服神舟丸亦可
火灸若春末及夏月始秋此熱月不宜大灸及重覆
宜服六物青散若崔文行度瘴散赤散雪煎亦善若
無圓散及煎者但單煮柴胡數兩傷寒時行亦可服
以發汗至再三發汗不解當與湯實者轉下之其脈
朝夕馳者爲澼實者朝平夕馳者非澼也轉下湯爲
可早與但當少與勿令大下耳少與當數其間也諸
虛煩熱者與傷寒相似然不惡寒身不疼痛故知非

傷寒也不可發汗頭不痛脈不緊數故知非裏實
可下也如此內外皆不可攻而強攻之必遂損竭
死難全也此虛煩但當與竹葉湯若嘔者與橘皮湯
一劑不愈爲可重與也此法數用甚有效驗傷寒後
虛煩亦宜服此湯

王叔和曰夫陽盛陰虛外臺作表
和裏病汗之則死下之則
愈陽虛陰盛外臺作裏
和表病下之則死汗之則愈夫如是
則神丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛盛之治外
臺
作表裏相背千里吉凶之機應若影響然則桂枝下
之病外臺作表
和則斃承氣入胃陰盛以外臺作
裏平以

卷之三
若此陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐下之相
反其禍至速而醫術淺狹不知不識病者殞沒日詔
其分至令冤魂塞於冥路天死盈於曠野仁愛鑒此
寧不傷楚夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣
分爭榮衛否隔周行不通病一日至二日氣在孔竅
皮膚之間故病者頭痛惡寒腰背強重此邪氣在表
發汗則愈三日以上氣浮在上部填塞胸心故頭痛
胸中滿當吐之則愈五日以上氣沉結在藏故腹脹
身重骨節煩疼當下之則愈明當消息病之狀候不
可亂投湯藥虛其胃氣也經言脈微不可吐虛細不

可下又夏月亦不可下也此醫之大禁也脈有沉浮轉能變化或人得病數日方以告醫雖云初覺病已積日在身其疹療結成非復發汗解肌所除其脈隨時形勢救解求免也不可苟以次第爲固失其機要乃致禍矣此傷寒次第病三日以內發汗者謂當風解衣夜臥失覆寒濕所中并時有疾疫賊風之氣相染易爲邪惡所中也至於人自飲食生冷過多腹臟不消轉動稍難頭痛身溫其脈實大者便可吐下之不可發汗也

陳旼邱云或問得病連服湯藥發汗汗不出如之何

答曰醫經云連發汗汗不出者死病也君思之可蒸
之如蒸中風法熱溫之氣於外迎之不得不汗出也
後以問張苗苗云曾有人作事疲極汗出臥單簾中
冷得病但苦寒倦諸醫與圓散湯四日之內凡入過
發汗汗不出苗令燒地布桃葉蒸之卽得大汗於被
中就粉傅身使極燥乃起便愈後數以此發汗汗皆
出也人性自有難汗者非惟病使其然也蒸之則無
不汗出也諸病發熱惡寒脈浮洪者便宜發汗溫粉
粉之勿令遇風當發汗而其人適失血及下大利則
不可大汗也數少與桂枝湯使體潤熱汗出連日

當自解也

論曰凡人有少苦似不如平常卽須早道若隱忍不治冀望自瘥須臾之間以成固疾小兒女子不別識甚若時氣不和當自戒謹若小有不和卽須治療尋其邪由及在腠理以時早治鮮不愈者患人忍之數日乃說邪氣入臟則難可制止雖倉扁亦無能爲也癰疽丁腫喉痺容忤尤其爲急此自養生之要凡作湯藥不可避晨夜時日吉凶覺病須臾卽宜便治不等早晚則易愈矣服藥當如方法若縱意違師不須治之凡傷寒多從風寒得之始表中風寒入裏則不

消矣未有溫覆而當不消也凡得時氣病五六日而渴欲飲水飲不能多不當與也所以爾者腹中熱也少不能消之便更爲人作病矣若至七八日大渴欲飲水者猶當依證而與之與之勿令極意也言能飲一斗者與五升若飲而腹滿小便澀若喘若噦不可與之忽然大汗出欲自愈也人得病能飲水飲愈也凡溫病可鍼刺者五十九穴又身之穴六百五十有五其三十六穴灸之有害七十九穴刺之爲災

論曰夫尋方學之要以救速爲貴是以養生之家須預合成熟藥以補倉卒之急今具之於左

辟溫第二

方三十三首
濕、鹽病證

屠蘇酒

辟疫令人不染溫病及傷寒之方

大黃

十五
銖

白朮

蜀椒

各十
五銖

烏頭

六
銖

桂心

各十
八銖

桔梗

十二
銖

荳蔻

十二
銖

右七味㕮咀絳袋盛以十二月晦日中懸沉井中
令至泥正月朔旦平曉出藥置酒中煎數沸於東
向戶中飲之屠蘇之飲先從小起多少自在一人
飲一家無疫一家飲一里無疫飲藥酒得二朝還
滓置井中能仍歲飲可世無病當家內外有井皆

悉著藥辟溫氣也。一方有防風一兩

又方

正月旦取東行桑根如指長七寸以丹塗之
門戶上又令人帶之

又方

正旦吞麻子赤小豆各二十七粒又以二七粒
投井中

又方

常以七月七日合家吞赤小豆向日吞二十七枚

又方



七月七日男吞大豆七枚女吞小豆二七枚
又方

神仙教人立春後有庚子日溫薦薺蘿蔔汁
大小並服不限多少

太乙流金散 辟溫氣方

雄黃

三兩

雌黃

二兩

礬石

一兩

鬼箭羽

一兩半
卽衛茅

羚羊角

燒
二兩

右五味治下篩三角絳袋盛一兩帶心前并挂門

戶上若逢大疫之年以月旦青布裹一刀挂中庭

燒之溫病人亦燒熏之

