

醫學秘奧
二



喉腫



此毒起於脾經因食煎燂油膩等物及飲酒太過而行房事以致毒氣不能流行聚結於喉根若不速治潰毒閉急卽死治法先用醋水蘸汁攪去痰涎卽用吹喉藥吹數次後服八正順氣散

厚朴

砂仁

半夏

陳皮

茯苓

青皮

桔梗

芍藥

枳殼

木香

玄參

鼠粘子

山梔仁

右剉水二鍾姜三片煎服

喉節

木知胆水一錢姜三片煎服

刺梨

藜蘆

升麻

紫葳

犀角

山慈

生肌

天麻

甘草

四小犀角

升麻

犀角

犀角

犀角

犀角



此症生於鳩尾之中初起如梅核在喉膈之間吐
不出嚥不下至三日漸上喉節之間名爲喉節其
疾須用刺破後用胆硝升吹入喉中再用雄黃化
毒丸吞下七丸仍用四七氣湯連進五服再用冰
片散吹之

四七氣湯

甘草

桔梗

枳殼

玄參

鼠粘子

山梔仁

生地黃

天花粉

陳皮

連翹

茯苓

紫蘇

右咬咀水二鍾姜三片煎服

經喉風



此病因腎經有熱內枯不能上潤致令心火盛故發此症服敗毒散具探吐法在前

羌活

防風

桔梗

黃芪

黃芩

白芷

甘草

陳皮

柴胡

芍藥

前胡

鼠粘子

玄參

仍用吹喉藥吹三五次又用白地松根醋搗汁漱
出風痰如喉間雷響者不可治切宜仔細



氣癰喉閉



此症爲因聚毒塞於喉間痰涎稠實發寒熱者仍
分上中下三關毒在下關者難治上中二關用吹
喉藥吹數次茶湯送下雄黃化毒丸七丸然後服
參苓順氣散

人參

茯苓

烏藥

蒼朮

紫蘇

白朮

粉草

陳皮

鼠粘子

枳壳

玄參

山梔

桔梗

天花粉

噎食喉風

大不... 變... 無絲... 毒... 命

山... 間... 陳... 蘇... 香... 所... 阻... 當... 喉... 乾... 舌... 燥... 大... 黃... 降... 下

製... 歸... 蘇... 一... 點... 登... 山... 人... 日... 煎... 至... 小... 食... 愈... 服... 喉... 乾

高... 藥

白... 芷

川... 芩

不... 可... 飲... 用... 川... 蘇... 者

此... 症... 因... 熱... 毒... 在... 於... 心... 肺... 兩... 經... 而... 無... 痰... 沫... 創... 身... 骨



此症因熱毒在於心經咽喉燥而無痰若噎食者
不可治用川桔散

川芎

防風

桔梗

鼠粘子

山梔仁

白芷

玄參

天花粉

枳殼

黃芩

烏藥

甘草

陳皮

連鬚葱一根燈心七寸同煎至七分食後服如落
心肺間刺痛者仍用當歸連翹散加大黃利下如
久不治變為飛絲勞毒能傷人命

喉癰

損之如藥同前

此藥膏係選用名貴藥材內無毒水用金絲膏

十香膏

此膏

內出藥散不藥命

生藥間散不敷此藥膏內文藥膏出必效口

此藥因喜慈憂思悲恐驚以將人計醫治水藥膏



此毒因喜怒憂思悲恐驚以傷七情鬱結成癰毒
生喉間若不速治恐毒氣內攻喉骨若出必致口
內出膿雖不傷命卽成冷瘻終身之痼疾也治方
於後

十奇散

治喉節初起有膿卽散破用內補散外用金絲膏
貼之吹藥同前

脚根喉風



此症腳根發起至於喉間或一年發一次半年發一次切忌熱物不得傷於怒氣其病一日行一穴至七日行七穴雖然不妨只是要發用吹喉藥仍服敗毒散如腥惡發泡者死



喉閉

鯨魚人參附王附長

犀角

玄參

白芷

甘草

當歸

川芎

人參

刺梨

附人五

附人五

附人五

附人五

附人五

附人五



此症因外感寒邪內傷熱物或大寒後便入熱湯
洗故將寒氣逼入脾經冷氣阻於中脘邪氣熱客
於心經故生此疾急用三稜針刺手腕中紫筋上
或少商穴出血却將雄黃化毒丸冷茶磨化灌之
仍將冰片散吹入喉中待漱出風涎稠痰爲愈更
服八正順氣散

陳皮

砂仁

枳殼

桔梗

甘草

當歸

川芎

人參

鼠粘子

玄參

白芍

水二鍾煎八分後服玉樞丹