

外科精要卷中

臨川陳目明良甫編

吳郡後學薛已校註

癰疽分表裡證論第二

伍氏曰癰疽皆因喜怒不測飲食不節陰陽不調臟腑不和腠理不密寒氣客於經絡或榮血受寒則滯而不行衛氣從之與寒相搏壅遏不通或陽氣蘊積則生寒熱寒熱不散皆致前証又曰五臟六腑俞穴皆在背凡患瘡症易傷臟膜多致不救臍氣浮行於表故癰腫浮高爲易

治臟血沉寒主裡故疽腫肉陷爲難治又曰癰者節也癰者壅也疽者沮也一寸至二寸爲癰三寸至五寸爲癰五寸至一尺爲疽一尺至二尺爲竟體疽若脉洪數者難治脉微瀋者易治初覺宜清熱拔毒已潰則排膿止痛膿盡則長肌敷藥當酌量輕重形証順逆而審治之

愚按前症若飲食少思用六君子湯以補脾胃如不應加姜桂以溫補之使邪氣自退其不起者由邪氣盛正氣虛不能發也於旬日之外見之若已發出用托裏消毒散以壯元

氣助令潰腐不應須溫補脾胃其不起者由  
真氣虛不能潰也於二旬之外見之若已腐  
潰用托裏散以補氣血生肌肉不應當專補  
脾胃又不應須溫補脾胃其不起者乃脾氣  
虛不能收斂也於一月之外而見之凡此治  
法竊嘗用驗詳具首論

察疽發有內外之別第二十四

李氏云疽初發一粒如麻豆發熱腫高熱痛色  
赤此爲外發勢雖熾盛治得其法可保其生若  
初時不發熱體倦怠患處如故數日不腫痛內



臟已壞雖有廬扁之藥亦末如之何矣

愚按前症有因元氣虛而不能發出者有因敷貼寒藥而不能發出者有因攻伐過傷氣血而不能發出者凡有因熱毒內蘊而失疎托者審而治之多有生者

附治驗

進士申天益臂患癰寒熱頭痛形氣虛弱此手足陽明經風邪之症用桔梗升麻湯二劑外邪頓散用托裡消毒散數劑腫痛頓退乃補中益氣湯調理形氣漸復而愈



秋官錢可容腹患癰焮腫作痛煩渴飲冷大便不通脉沉數實此熱毒蘊於內用清熱消毒散加大黃二錢一劑諸症悉退但形氣頗虛用托裡消毒散去金銀花白芷倍加參芪歸朮而安

一男子股內患毒欲求內消其脉滑數膿已成矣因氣血虛而不潰遂刺之膿出作痛以珍湯治之漸可但膿水清稀更以十全大補湯加炮附子五分數劑漸愈乃去附子又三十餘劑而愈

一童子腋下患癰久不斂膿清脉大怠倦懶食自汗口乾用內補黃芪湯及豆豉餅兩月而愈凡瘡潰而膿清或瘡口不合或聚腫不潰肌寒肉冷自汗色脫者皆氣血虛極也非大溫補不可

一男子肩患毒焮痛飲冷煩躁便秘脉數而實以清涼飲二劑少愈以金銀花散四劑悉退又以十宣散去桂加天花粉金銀花數劑瘡潰而痊此脉與症皆屬有餘也

一男子背瘡潰而瘀血不散此陽氣虛弱也

用參芪歸朮峻補更以桑枝炙又用托裡散  
加肉桂瘡口自斂此補接陽氣之法也

上舍毛體仁素陰虛春初咳嗽胸中隱痛腎  
脉洪數肺脉數而時不見余曰內當結癰先  
用六味地黃丸料一劑服之翌早來謂余曰  
昨得良劑嗽愈六七務求一方到監調理余  
曰此陰火上炎患癰之症第因元氣虛弱未  
能發出因其易忽余辭不能乃別用降火化  
痰等劑愈甚月餘復請診之脉洪滑而數余  
曰膿已成矣當請常治者同議針之且免內



潰之患仍不決又月餘請視他醫已先開瘡  
孔偏上兜膿不出仍內潰脉愈洪大余曰脉  
洪滑而數視其舌青黯內臟已壞無能爲矣  
後果然

辨癰疽陰陽淺深緩急治法第二十五

曾氏云凡癰疽其脉浮數洪緊腫焮作痛身熱  
煩渴飲食如常此六腑不和毒發於外而爲癰  
其勢雖急投以涼劑多保全生其脉沉細伏緊  
初發甚微或無瘡頭身不熱而內躁體重煩疼  
情緒不寧胸膈痞悶飲食無味此五臟不和

畜於內而爲疽急投五香連翹湯甚者轉毒攻  
神仙截法黃礬丸國老膏防托毒氣免致變  
內攻尤宜當頭隔蒜灸若塗毒藥迷其腠理投  
諸涼藥虛其真氣故其善惡之症在乎醫之工  
拙耳或氣噫痞塞咳逆身冷自汗目瞪耳聾恍  
惚驚悸語言顛倒皆惡症也五善見三則瘥七  
惡見四則危五善併至則善無以加七惡併臻  
則惡之劇矣

愚按前症善者乃五臟未傷病微邪淺使能  
慎起居節飲食勿藥自愈惡者乃五臟虧損

之症前哲雖云不治若能補其脾胃固其根本多有可生者豈可以其惡而遂棄之耶

### 附治驗

鄰人蘇子遇之內左手指患疔麻痒寒熱惡心左半體皆麻脉數不時見余曰凡瘡不宜不痛不可大痛煩悶者不治今作麻痒尤甚惡也用奪命丹二服不應又用解毒之劑麻痒始去乃作腫痛余曰勢雖危所喜作痛但毒氣無從而泄欲針之適值望日其家俱言尸神不從勢愈腫甚余強針之諸症頓退又



用解毒之劑其瘡全愈

辛丑孟夏余至四明有屠壽卿氏當門齒忽  
如所擊痛不可忍脉洪大而弦余曰弦洪相  
搏將發瘡毒也先用清胃散加白芷銀花連  
翹一劑痛即止至晚鼻上發一瘡面腫黯痛  
用前藥加犀角一劑腫至兩額口出穢氣脉  
益洪大惡寒內熱此毒熾血瘀藥力不能敵  
也乃數砭患處出紫血服犀角解毒之劑翌  
日腫痛尤甚又砭患處與唇上并刺口內赤  
脉各出毒血再服前藥至數劑而愈

一婦人背患流注內潰脹痛服流氣化痰之劑自汗盜汗脉大而弱此元氣虧損之症也與參芪各一兩歸朮各五錢肉桂二錢服而針之至夜半始出稀膿二碗許翌日大汗倦甚煩熱作渴揚手氣促脉洪大而數仍用前藥加附子一錢炙甘草二錢二劑脉症悉退又以六君加薑桂二十餘劑始離床褥後因勞復寒熱作渴汗出時仲冬寢幃氣出如霧用十全大補加桂附二劑而痊

中翰鄭朝用疽潰發熱吐痰飲食無味肌肉

不生瘡出鮮血余曰此脾氣虧損不能攝血  
歸源也法當補脾彼不信用消毒涼血之劑  
加惡寒嘔吐始悟余言用六君加炮薑半夏  
茯苓數劑諸症悉退又用十全大補瘡口漸  
斂後因飲食稍多泄瀉成痢此脾胃虛寒下  
陷用補中益氣送四神丸而痢止繼以六君  
子湯而瘡愈

一婦人癸卯冬失物發怒缺盆肉微腫甲辰  
春大如覆碗左肩胛亦腫肉色如故或針出  
鮮血三碗許腹痛如錐泄瀉不止四肢逆冷



嘔吐惡寒或時發熱絕食已七日矣其脉洪  
大時或微細此陽氣脫陷也用六君加炮薑  
三錢附子二錢早服至午不應再劑加附子  
五錢熟睡覺來諸症頓退六七少進稀粥再  
四劑諸症悉退飲食如故缺盆始痛針出清  
膿二碗許諸症復至此虛極也以十全大補  
加薑桂附各一錢三劑而安後減乾薑桂附  
各五分與歸脾湯兼服五十餘劑而愈  
一男子背瘡漫腫微痛食少體倦余曰症屬  
形病俱虛法當補元氣為主彼不信乃用攻

毒之劑中央肉黯五寸許惡症悉具復求治  
余曰此胃氣虛寒而變症作矣當急溫補脾  
胃則惡症自退黯肉自生仍不信乃割死肉  
祛惡症遂致不起

毛礪菴側室肚患癰月餘矣色黯不腫內痛  
作嘔飲食不入四肢逆冷其脉或脫絕或浮  
大雜用定痛敗毒之劑余曰此氣血俱虛而  
作痛內決無膿不治之症也強用大溫補之  
藥二劑痛止色赤飲食少進余謂但可延日  
而已人皆以爲有膿復強針之又用大補之

劑始出清膿少許衆仍以爲毒結於內用攻  
膿保其必生殊不知乃速其死耳惜哉

論善惡形症第二十六

問曰五善七惡可得聞乎曰飲食如常一善也  
實熱而大小便濇二善也內外病相應三善也  
肌肉好惡分明四善也用藥如所料五善也渴  
發而喘眼角向鼻大小便反滑一惡也氣綿綿  
而脉濡與病相反二惡也目不了了睛明內陷  
三惡也未潰肉黑而陷四惡也已潰青黑腐筋  
骨黑五惡也發痰六惡也嘔吐七惡也



愚按善惡形症治法見附錄

論生死形症第二十七

問曰病有甚而至生有微而至死病症難辨死

生何從決乎答曰發背潰透內膜者死

此言肝俞已上

未潰內陷面青唇黑便汚者死

此言臟壞便瘀血

潰喉

者不治陰患入腹者不治入囊者不治鬚深數

寸者不治在顙後一寸三分名銳毒亦不治無

此者生流注雖多療之必愈

愚按前症有因元氣虛弱而毒氣內陷者有

因初作失於內踈托裡和榮衛者有因毒盛