

東醫寶鑑

七

東醫寶鑑外形篇卷之三

御醫忠勤貞亮庵聖功臣崇祿大夫陽平君臣許濂奉教撰

胃

胃膈之名有義

夫人之胃者呼吸之所經飲食之所過

有齒之兆故謂之胃也如幕不漏蓋膈在心肺之下與

背脊胃腹局回相着如幕不漏蓋膈在

心肺之下與

胃膈度數

寸胃圖四尺五寸缺盆以下至膈

九

胃膈部位

也膈者心肺之分野也膈上通謂之胃膈者心肺之郭

也貫膈與肺系相並在肺系之後其上下即膈門也

胃脘之下即胃之上口也謂之賁門其膈膜相貼

之間亦漫脂相包也心胃脘在膈下膈與心肺相通膈膜相綴也心胃脘在膈下膈與心肺

上豎斜膈膜之下與橫膜相結黃脂漫包若心也
漫脂之外細筋膜如絲與心肺相連此包絡也

臟腑經脈皆貫膈脈手太陰之脈上膈屬肺○手陽明之

屬胃絡脾○足太陰之脈上膈挾咽其支者別上
膈注心中○手少陰之脈下膈絡小腸○手太陽

之脈下膈屬小腸○足少陰之脈上膈貫肝膈○手
厥陰之脈下膈屬小腸絡三焦○手少陽之脈上膈

屬三焦○足少陽之脈貫膈絡肝屬膽○足厥陰
之脈上膈貫膈布為肋○已上十一經皆貫膈惟足

太陽循下背

脉法故知陽微陰弦則胃痺而痛陽微故知在上焦陰弦

小緊而數則心胃痛○心腹病宜見沉細不宜見浮大

沉細宜浮大弦長命少殂○沉弦細動皆是痛

胃痞脈滑為痰結○脈濡有死血也○右手脈緊實

痛左手脈數熱多也

是痰積也脉六必是久病也而子脉堅實不大便是下之痛甚老必伏心也病右脉關脉多弦弦大為遲者必心下堅而數或瀉者心痛微

心痛與胃脘痛病因不同脾痛連心或陽虛陰厥亦令

心之下支別絡為真心痛即死不治其久心痛者是

作有時經久不得差也謂胃脘當心而痛今俗呼

為心痛者誤也夫九種心痛詳其所由皆在胃脘

而實不在於心也九種心痛當心而痛脾藏連心

痛因傷思慮脾胃痛蓋心傷飲食或痰飲故也門

心痛有九種一日飲虫二日冷八日熱九日去來下通食六

痛元散九痛元通靈散拈痛元神聖代鐵散拈

手拈散

治九種心痛及心脾痛極驗詩曰草果玄胡

九痛元

治九種心痛及積冷心胃痛炮附子三兩吳

五錢右為末蜜九梧子
大溫酒下三五丸

通靈散

治九種心痛蒲黃五靈脂各一兩不通赤芍

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當

下二九三

蟲心痛

胃脘痛痛吐水者蟲痛不吐水冷心者痛也

之證宜心腹痛上下攻刺嘔噦涎沫或吐清水面色

陳湯多病觀加苦練根煎服醫○蟲痛

疔心痛

卒感惡汗尸症神昏卒倒口噤不省宜蘇合

風心痛因傷風枝冷或肝邪乘心雨引痛

悸心痛因七情怔忡驚悸以致心痛宜四七湯方

發熱心傷者勞役則頭面赤而下重心中痛而自煩

食心痛因食生冷或多食物過多以致心痛宜香蘇散

飲心痛傷水飲聚痰涎心痛如刺宜芎夏湯方五苓散

冷心痛寒氣客於背俞之脉則血脉凝滯則血虛

飲冷當風取涼或腎邪乘心痛則心懸若飢世利

下重宜五積散寒邪乘心痛宜扶陽助胃

扶陽助胃湯治胃脘當心而痛得熱則已寒氣客於腸胃

子炮二錢乾薑炮一錢半草豆蔻益智仁白芍藥
酒炒入參甘草炙官桂各一錢吳茱萸白朮陳皮

各五分右剉作一貼薑
三片棗二枚水煎服

桂枝四七湯治寒邪客搏心痛桂枝半夏各二錢白
芍藥酒炒一錢半白茯苓厚朴枳殼各

七分人參紫蘇葉甘草炙各五分右剉
作一貼入薑三片棗二枚水煎服

雞舌香散治心腹冷痛丁香百枝白芍藥酒炒二兩
良薑一兩甘草炙五錢右為末每取二錢

陳米飲
調下

神效散治一切心脾疼痛遇冷便作引入背脊痛不可
忍服之絕根木香青皮陳皮麥芽枳殼三錢

蓬朮神麴白芍藥白芷肉桂玄胡索破故紙甘草
各七分單港茄丁香各三分右剉作一貼入薑五

片棗二枚
水煎服

卻痛散治心氣冷痛不可忍川烏炮一錢半當歸肉
桂石菖蒲木香胡椒各一錢五靈脂蒲黃炒

各五分
鹽醋各少許
剉作一貼入
煎服

草豆蔻丸

治秋冬傷寒冷物胃脘當心而痛枳實二兩
草豆蔻煨白朮各一兩麥芽炒神麴炒

半夏製各五錢乾生薑青皮陳皮各二錢炒
分右末蒸餅和丸菜豆大白湯下五十七錢炒鹽五

溫胃湯

治服寒藥多胃脘痛陳皮黃芪各七錢
仁六錢白豆蔻薑黃乾薑澤瀉各三錢
厚朴人參甘草各二錢右為末每三錢

入薑三片煎服
○一名益胃散

抽刀散

治急心冷痛斑痞七箇胡椒四十九粒
炒令焦碎去之取椒為末熱酒調下

二薑丸

治心脾冷痛炮乾薑良薑等分為末
糊和丸梧子大橘皮湯吞下二三丸

熱心痛

積熱攻心暑毒入心面目赤黃身熱煩躁掌中
熱大便秘堅宜連附六一湯金鈴子散薄荷散

薑飲甚者大承氣湯
柴胡湯
各一錢
煎服

煎服

連附六一湯治熱鬱胃脘痛甚黃連六錢附子一錢

金鈴子散治熱厥心痛金鈴子玄胡索各一兩去

其餘邪散名玄金散

莎芎散治胃熱藥熱物致胃脘痛久成痼疾

薑各一錢半右為末每二錢熱薑湯調痛時服

扼薑飲治胃熱作痛山扼仁十五投炒焦水一盞煎

一錢妙門

去來痛心熱或作或止久而不愈也

差神心九氣湯

香脾示點

心痛亦有六曰一曰積心痛二曰厥心痛三曰真心痛四

脾心痛者心下惡痛也○心痛甚而至於脇下如刀割

也○宜用訶子散治心脾冷痛不可忍一服見復元通氣散

訶子散乾薑炮草果陳皮良薑炒荻荈神麴炒麥芽

炒甘草炙各等分右龕末每三錢水一盞入鹽一捻候痛時煎服

胃心痛者腹脹而心痛胃脘當心而痛上支兩脇痛經曰木鬱之

厥陰之勝胃脘當心而痛○蓋木氣被鬱發則太過故民病有土敗木賊之候也夫胃為脾之府

陽先於陰故藏未病而府先病也○宜用草豆蔻丸坊見加味枳朮丸清痰食積酒積茶積肉積在胃脘當

加味枳朮丸治清痰食積酒積茶積肉積在胃脘當

吐脾疼等證白朮三兩枳實蒼朮猪苓麥芽炒神麴炒半夏各一二兩澤瀉赤茯苓黃連東壁土

同炒白螺蛳殼煨各七錢縮砂草豆蔻黃芩東壁
土炒青皮蘿蔔子炒乾生薑各五錢陳皮去白便
香附瓜蒌仁厚朴檳榔各三錢木香甘草各二錢
右為末青荷葉泡湯浸粳米粉作糊和丸梧子六

清米飲下
百九傳

清熱解鬱湯

治心痛即胃脘痛一服立止山梔子炒
黑一錢半枳殼川芎香附子各一錢黃

連炒蒼朮各七分陳皮乾薑炒黑甘草炙各五
分右剉作一貼薑三片水煎服戒飲食十日

清鬱散

治胃中有伏火膈上有攪痰胃口作痛及嘔
吐酸水惡心煩悶半夏陳皮白茯苓蒼朮便

香附神麴黃連薑汁沙梅子薑汁炒各一錢川芎
六分乾薑炒黑五分甘草炙二分右剉作一貼入

薑三片水煎服

腎心痛

心痛與背相控善愈如從後觸其心區倭者腎
心痛也。○下重而苦泄寒中名腎心痛。○

腎傳之心病筋脉相引心下惡痛病名曰癰。○
腎之積名曰奔豚自臍下上衝心痛最甚五苓散

烏沉湯去白朮倍肉桂服之神聖復氣湯治腎元與膀胱經中陽氣不足致胃脇

神聖復氣湯

治腎元與膀胱經中陽氣不足致胃脇

下寒如冰等經預先一日用黃柏黃連生地黄並

酒洗枳殼各三分另用新水浸又取細辛川芎蔓

荊子碎各二分另用新水浸別取羌活柴胡各一

錢葉本甘草各八分半夏升麻各七分當歸六分

防風人參郁李仁各五分乾薑炮附子各三分

積心痛

飲食後忽然暈倒口噤不言目不識人四肢不舉

多因飲食過度氣道室塞或着氣喘而然急用薑

鹽湯多灌探吐之後服平胃散防觀六君子湯防

見草豆蔻丸坊見加味枳朮丸坊見黃丸

行氣香蘇散

治內傷生冷外感風寒又觸七情惱怒

香附子烏藥川芎羌活枳殼麻黃甘草各一錢右剉作一貼薑三片水煎不拘時溫服

厥心痛

者因內外邪犯心之包絡或他藏之邪犯心之

痛極則發厥也。凡心痛者他藏病干之而痛也邪在心則亦心痛。○厥心痛者他藏病干之而痛

而通身冷汗出尿清不渴氣微力弱惡寒以木附湯

洪大可與金鈴子散。○凡厥心痛者他藏病干之而痛也邪在心則亦心痛。○厥心痛者他藏病干之而痛

真心痛

手足青至節心痛甚朝發夕死。○凡真心痛者

真心痛者大寒觸犯心君或汚血衝心手足青過

可傷傷之而痛者為真心痛。○凡真心痛者他藏病干之而痛也邪在心則亦心痛。○厥心痛者他藏病干之而痛

死無治法。○凡真心痛者他藏病干之而痛也邪在心則亦心痛。○厥心痛者他藏病干之而痛

心腹並痛

心腹並痛宜二妙香良散二胡散厚朴湯桂

蘇合香元氣門

二妙香良散

治心腹痛者附子良薑等分各炒為末入鹽少許每二錢米飲調下若同妙則

無效

二胡散

治心腹痛玄胡索胡椒等分為末每二錢溫酒調下

厚朴湯

治虛寒心腹滿痛厚朴陳皮各二錢赤茯苓乾薑炮甘草炙各一錢右剉水煎服之疎

桂靈散

治心腹大病危惡者桂心五靈脂良薑炒厚朴製各等分右細末熟醋湯服一錢立止

七情作心痛食積痰飲瘀血皆作胃脘痛

七情心痛

七情者喜怒哀憂思悲驚恐蓋喜則氣散怒則

亂怒則氣下六情皆令心氣鬱結所以作痛惟喜則氣散所以散六情之鬱能止痛也○息城司候

聞父死于賊乃大悲哭哭罷便覺心痛日增不已

學至者雜以狂言以謔病者至是大笑不忍回面

向壁數日心中結硬皆散戴人曰憂則氣結喜則

食積胃脘痛

飲食過多以致積滯成胃脘痛先用吐法

宜用或平胃散加陳湯加神麴麥芽山查肉

痰飲胃脘痛

胃中若有流飲清痰作痛腹中漉漉有聲

小胃丹控涎丹痰飲並見三花神祐丸防芎夏湯

治痰飲胃脘痛白螺蛳殼火煨菊星炮滑石施子

砂各五錢右為末薑汁浸蒸餅和丸菰豆大每五

一各白螺

殼丸

瘀血胃脘痛

心痛脉澀者有死血桃仁承氣湯下作吃者有死血桃仁承氣湯下

者○如平日喜食熱物以致死血留於胃下作痛

湯水煎下作飢乃素食熱物血死胃脘桃仁承氣

湯下之○婦人瘀血入心脾痛甚者五積散

玄胡索丸

治死血作心痛玄胡索一兩半桂心紅花

浸蒸餅和九梧子大醋湯下五七十九

勝金散

治瘀血心痛桂枝玄胡索五靈脂當歸各

心胃痛當分虛實

乾薑和之○止者為虛二陳湯歸脾湯加炒

加味小建中湯參朮散○按之痛反甚者為實宜

如味小建中湯

治心腹疼痛不可忍按輕却痛按重則

二錢半甘草炙遠志薑汁炒各一錢石

對作一貼薑五片棗二枚水煎服
參朮散治虛弱入心脾痛人參白朮乾薑炮白豆蔻

薑三片水煎服入炒過真

蛭粉一錢併服九茲繹
施奠丸治氣實心痛按之尤痛山施仁炒焦一兩半

如川椒大以生薑生地黃煎湯下二三十九

煮黃九治大實心痛因怒後飲食卒痛注悶心胃高

巴豆肉五錢白麩二兩右研勻水丸梧子大取十

二丸用漿水煮熟漉入冷漿內沉冷每一時冷漿

水下一丸一日盡用十二丸得利
即止宜服藥蒼湯以去餘邪

藁蒼湯服煮黃九後服此斷根藁本五錢
心胃痛治法凡心胃痛須分新久若明知身受寒氣口

寒物而得者於初得之時當與溫散或