

補養清固

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷二上

補養門

正方六十
附方二十七

八味地黃丸

九十補
九

右歸丸

右歸飲

六味地黃

丸

知檗八味丸

七味地黃丸

都氣丸

加減

丸

八味丸

八仙長壽丸

益陰腎氣丸

人參補氣湯

滋腎

黃丸

抑陰腎氣丸

九味地黃丸

九味地黃丸

疏肝益腎

加減

陰煎

三陰煎

四陰煎

五陰煎

七寶美髯

丹

大補元煎

滋陰大補丸

打老兒丸

五福飲

成方

刀用補

卷二上目錄

黑地黃丸

大營煎

小營煎

虎潛丸

補益丸

龍虎丸

濟陰丹

參术膏

兩儀膏

天真丸

貞元飲

三

才封髓丹

三才湯
鳳髓丹

當歸地黃飲

人參固本丸

地黃醴

參乳丸

頓乳散
粉法

歸腎丸

天王補心丹

贊化血餘丹

孔聖枕中丹

養元粉

大補

陰丸

斑龍丸

又斑
龍丸

元神豆

龜鹿二仙丹

二

至丸

蟠桃葉

扶桑丸

羊肉湯

益氣聰明

湯

秦艽鼈甲散

黃耆鼈甲散

人參黃耆散

秦艽扶

羸散

百合固金湯

補肺湯

補肺阿膠散

紫苑湯

王母桃

玉屏風散

黃耆湯

川芎湯

妙香散

參芩白朮散

休瘧飲

向人

四君子湯

見治氣門

歸脾

湯

見理血門

人參養營湯

見理血門

十全大補湯

見治氣門

八珍

湯

見治氣門

生脈散

見消暑門

當歸補血湯

見理血門

二

吳氏醫學述第四種

門人周蘭九生庭

武原吳儀洛遵程輯

男

有榆著培同較
有杜雋望

成方切用

補養門

凡氣虛者宜補其上入參黃耆之屬
精虛者宜補其下熟地枸杞之屬陽

虛無火者宜補而兼緩桂附乾薑之屬陰虛
有火者宜補而兼清門冬芍藥生地之屬此
固陰陽之治法也其有氣因精而虛者自當
補精以化氣精因氣而虛者自當補氣以生
精又有陽失陰而離者不補陰何以收散火
之氣水失火而敗者不補火何以甦垂寂之

陰此又陰陽相濟之妙用也。故善補陽者必於陰中求陽。則陽得陰助而生化無窮。善補陰者必於陽中求陰。則陰得陽升而泉源不竭。是故以精氣分陰陽。則陰陽不可離。以寒熱分陰陽。則陰陽不可混。此又陰陽邪正之離合也。大凡陽虛多寒者宜補而兼溫。而清潤之品非所宜。陰虛多熱者宜補以甘涼。而辛燥之類不可用。知宜知避。則不惟用補而方制皆可得而貫通矣。

崔氏八味丸

金匱

治命門火衰不能生土以致脾

仲景云
虛有痰宣
督氣丸補
吳菱山云。
八味丸治

胃虛寒飲食少。思泄瀉腹脹。或元陽虛憊。陽痿精寒。臍腹疼痛。夜多漩瀉。膝痠腰軟。目昏等證。王冰所謂益火之原。以消陰翳也。尺脈弱者宜

麥之本也。

之者。服之亦效。

熟地黃

用懷生地水洗去
蒸一日曬乾再蒸

砂土柳木曾砂鑄上
無再麗九次爲度臨月

八兩山

萸肉陳者懷山蘿

兩茯苓
拌丹皮

漏雨三肉

桂皮熟附子去兩

蜜丸 洛謂蜜性甘緩，易。豬腎煮爛，爲

九
更得空

心鹽湯下

吳鶴臯

三腎中水火俱虛

者此方主之。李士材曰腎有

兩枚皆同
般無二樣

屬於水。初無水小
樣。中間一點是陽。

人之別仙經曰兩
陽精。兩腎中間穴

門相火所
坎而位互

所居也。一陽生於
乎北也。趙養葵曰

君子觀象於坎

醫中興古
此人生事

有水火之造焉。夫與天地相似也。今

人入房甚而陽

亦有火盛而宗筋弛緩者不可不知。

又用以治婦人轉胞亦同此義。

舉者陰虛火動也。陽事先痿者命門火衰也。真水竭則隆冬不寒。真火息則盛夏不熱。是方也六味皆濡潤之品。所以能壯水之主。桂附辛潤之物。能於水中補火。所以能益火之原。水火得其養。則腎氣復其天矣。喻嘉言曰。金匱用八味丸。治腳氣上入少腹不仁者。腳氣卽陰氣。少腹不仁卽攻心之漸。故用之以驅逐陰邪也。其虛勞腰痛。少腹拘急。小便不利。則因過勞其腎。陰氣逆於少腹。阻遏膀胱之氣化。小便不能通利。故用之以收腎氣也。其短氣有微飲者。飲亦陰類。阻其胸中之陽。自致短氣。故用之引飲下出。以安胸中也。消渴病。飲水一斗。小便亦一斗。此腎氣不能攝水。小便恣出。源泉有立竭之勢。故急用以逆折其水也。夫腎水下趨。則消腎氣。不上騰。則渴。非用此以蟄護封藏。蒸動水氣曷從治哉。後人謂八味丸治消渴之聖藥。得其旨矣。按八味地黃丸。主用之味爲桂附。卽坎卦之一。陽盡也。非此卽不成坎矣。附雖三焦命門之藥。

而辛熱純陽。通行諸經。走而不守。桂爲少陰之藥。宣通血脉。性亦竄發。二者皆難控制。必得大者。純陰厚味潤下之品。以爲之濬導。而後能納之九淵。而無震盪之虞。今人不明此義。並以桂附爲腎陰之定藥。離法任意而雜用之。酷烈中上。燻涸三陰。爲禍非尠也。或曰。仲景治少陰傷寒。用附者十之五。非專爲保益腎陽耶。曰。仲景爲陰邪。盛在諸經。非溫經不能驅之使出。附子爲三焦命門辛熱之味。故用以攻諸經之寒邪。意在通行。不在補守。故太陰之理中厥陰之烏梅。以至太陽之乾薑附子芍藥桂枝甘草。陽明之四逆。無所不通。未嘗專泥腎經也。唯八味丸爲少陰主方。故亦名腎氣。列於金匱。不入傷寒論中。正唯八味之附。乃補腎也。桂逢陽藥。則爲汗散。逢血藥。卽爲滲行。逢泄藥。卽爲滲利。與腎更踈。亦必八味丸之桂。乃補腎也。故曰。當論方。不當論藥。當就方以論藥。不當執藥以論方。此方主治在化元。取潤下之性。補下治下。制以

急。茯苓澤瀉之滲瀉。正所以急之。使直達於下也。腎陰失守。陽燎於上。欲納之復歸於宅。非借降泄之勢。不能收攝。寧靜故用茯苓之淡泄。以降陰中之陽。用澤瀉之鹹瀉。以降陰中之陰也。體之方悟其變化處。一綫不走之妙。有腎虛火不歸經。大熱煩渴。目赤唇裂。舌上生刺。喉如煙火。足心如烙。脈洪大無倫。接之微弱者。宜十全大補湯。吞八味丸。或問燥熱如此。復投桂附。不以火濟火乎。曰。心胞相火附於命門。男以藏精。女以繫胞。因嗜慾竭之。火無所附。故厥而上炎。且火從腎出。是水中之火也。火可以水折。水中之火。不可以水折。桂附與火同氣而味辛。能開腠理。致津液通氣道。據其窟宅。而招之誘之。同氣相求。火必下降矣。然則桂附者。固治相火之正藥歟。八味丸用澤瀉。寇宗奭謂其接引桂附。歸就腎經。李時珍曰。非接引也。茯苓澤瀉皆取其瀉膀胱之邪氣也。古人用補。必兼瀉邪。

邪去則補藥得力。一闔此乃元妙後世不知此理專一於補必致偏勝之害矣。洛按此亦爲虛中挾邪滯者設爾若純虛之證而兼以滲利未免減去藥力當用右歸丸或右歸飲。

右歸丸

景岳

治元陽不足或先天稟衰或勞傷過

度以致命門火衰不能生土而爲脾胃虛寒飲食少進或嘔惡膨脹或反胃噎膈或卻寒畏冷或臍腹疼痛或大便不實瀉痢頻作或小水自遺虛淋寒疝或寒侵谿谷而肢節痛痺或寒在下焦而水邪浮腫總之真陽不足者必神疲氣

怯。或心跳不寧。或四肢不收。或眼見邪祟。或陽衰無子等證。速宜益火之原。以培右腎之元。陽而神氣自強矣。八味丸治之不愈者。宜服此。或用右歸飲。

凡八味右歸用桂附等方。唯肺陰有餘者。宜之。否則助火。燬金。反生肺病。

大懷熟

八兩

山藥

山萸肉

枸杞

菟絲

製杜

仲

薑湯炒

鹿角膠

炒珠四兩

當歸

三兩便當歸。漕勿用

附子

製肉桂

九白湯下。其効尤速。

如陽衰氣虛。必加人參。如陽衰氣虛。必加人參。

以爲之主。或二三兩。或五六兩。隨人虛實以爲

增減蓋人參之功。隨陽藥則入陽分。隨陰藥則入陰分。欲補命門之陽。非加人參不能捷効。

如陽虛精滑。或帶濁便溏。加補骨脂酒炒三兩。

如飧泄腎泄不止。加五味子三兩。肉荳蔻三

兩。麪炒去油用。

如飲食減少。或不易化。或嘔

惡吞酸。皆脾胃虛寒之證。加乾薑三四兩。炒黃

用。

如腹痛不止。加吳茱萸二兩。湯泡半日炒

用。

如腰膝痠痛。加胡桃肉連皮四兩。

如陰

虛陽痿。加巴戟肉四兩。肉荳蔻三兩。或加黃狗

外腎一二副以酒煮爛搗入之

右歸飲

景岳

此益火之劑也凡命門之陽衰陰勝

者宜此方加減主之如治陰盛格陽真寒假熱等證宜加澤瀉二錢煎成用涼水浸冷服之尤妙

熟地

三四錢或加至一二兩

山藥

炒

杜仲

薑

枸杞

錢

炙甘

草

一錢

肉桂

一錢

製附子

一二

萸肉

三錢

水

一錢

二

盞煎七分食遠服如氣虛血脫或厥或昏或汗或運或虛狂或短氣者必大加人參白朮隨

宜用之。

如小腹多痛加吳茱萸六七分

如

火衰不能生土爲嘔噦吞酸者加炮薑二三錢
如陽衰中寒泄瀉腹痛加人參肉荳蔻隨宜
用之。如淋帶不止加破故紙一錢。如血少

血滯腰膝軟痛者加當歸二三錢

六味地黃丸

仲陽

治肝腎不足真陰虧損精血枯

竭憔悴羸弱腰痛足痺自汗盜汗水泛爲痰

丹溪

日久病陰火上升津液生痰不生發熱咳嗽虛
血宜補血以制相火其痰自除則移熱於肺而咳嗽按之至骨頭運目眩

直指方云

其熱絡手骨困不任爲腎熱

頭運目眩

淫慾過度。腎氣不能歸元。此氣虛頭運也。吐衄崩漏。肝不攝血。致血妄行。此血虛頭運也。耳

鳴耳聾。遺精便血。消渴淋瀝。失血失音。舌燥喉痛。虛火牙痛。足跟作痛。下部瘡癆等證。諸證皆由腎水不足虛火上炎所致。

熟地

八兩

山茱萸

酒潤

山藥

四兩

茯苓

乳拌

丹皮

澤瀉

兩

右九法如前空心鹽湯下

腎中水虛不能制火者。此方主之。令人足心熱。陰股熱。腰脊痛。率是此證。乃咳血之漸也。熟地滋陰補腎。生血。生精。山萸溫肝逐風濬精祕氣。

牡丹瀉君相之伏火。涼血。退蒸。

時珍曰。伏火卽陰火也。陰火卽

更勝。丹皮能入腎瀉陰火退無汗之骨蒸。

山藥清虛熱於肺脾。補脾固腎。能滳精。

茯苓滲脾

中濕熱而通腎交心。滌瀉瀉膀胱水邪而聰耳。

明目壯水之主。以制陽光。自此方也。

丸純陰重六味地黃

味潤下之方也。純陰腎之氣。重味腎之質。潤下腎之性。非此不能使水歸其壑。其中只熟地一味爲本藏之主。然遇氣藥則運用於上。遇血藥則流走於經。不能制其一綫入腎也。故以五者佐之。山藥陰金也。坎中之艮。堅凝生金。故入手太陰。能潤皮膚。水發高原。導水必自山。山藥堅少腹之土。真水之原也。水土一氣。鎮達臍下。山茱萸陰木也。肝腎同位乎下。借其酸澀。以斂泛