

証治針經

卷二

證治鍼經卷二目錄

咳嗽

喘

失音

肺痿

附肺癰
勞風

肺痺

附胸痺

脾胃

附不食

三消

附饕餮
瘰癧

痞

腫脹

積聚

噎膈

反胃

嘔吐

呃

附噫噎

便秘

附腸痺

瘰癧

鬱

瘧

風濕

附溫熱

暑

痢

泄瀉

濕

燦

證治鍼經卷二

海昌郭誠勲雲臺輯

欬嗽

欬因氣逆嗽以痰生外感六淫異法內傷諸候分因

木扣金鳴當肺肝之並究阿膠雞黃生地天冬女貞之屬腎虛痰泛

必金木以同甯都氣飲喘逆者加青鉛或土不生金

培戊己涼脾胃補脾用甘溫堪期端喜心能刑肺瀉丙

火小腸丁火可望旋安寒熱相包麻杏石甘湯為聖藥

氣冲勞嗽生脈散六味丸是神丹嗽久而巔脹喉痺

喉痺喉無效治厥陽風肝為患壯青黛淡阿膠效甚而耳充鼻塞

瘵瘵膽火相干杏仁羊角連翹葉右施皮薄荷南案丁茶姜皮至

於內外合邪濕內經所謂形寒飲冷則傷肺及暑非小

青龍湯寒湯飲冷形即宜白虎湯治暑熱效且利交病由肺熱

亦屬腎寒中二氣為水火不同醫門法以回護附子理中湯能

痊寒嗽葶藶大棗湯最快鬱痰面黧極多喘咳天行

暑濕嗽且頭疼姜汁湯調益元為散久嗽頻年無他

症烏梅百部煎膏士出林案無則但者用烏梅百部見李

醫類紹小兒夜半嗽頻仍腎虛是擬人阿膠桑皮丸喘

家鼻煽脈洪大肺脹奚逃越婢夏湯嗽魚嘔而屬腎虛

不與胃欬地黄丸效勝嗽且熱而由伏暑白虎湯切饒

名醫類水散並熱蘊肺肝數大熱喘咳六經丹皮倍入道

遙散下虛喘急尺多痰不能仰臥兩枳殼桔梗半夏湯

下地黃丸一兩案萬肺燥胃濕性偏殊治燥欬妙泰

欽散治子秋傷二於燥冬生互咳嗽之症惟千金麥冬湯五

張飛疇治秋冬嗽輒甚清鬱熱法有兩端
三補五九補五九酒炒大黃貝母九服每年立秋前服滾痰丸
升柴升柴即進黃芩麥冬五味端音第往來數也
病發病發即進黃芩麥冬五味

附醫級摘要

暑風欬霍暑湯最效風濕嗽神水為靈先欬後瀉
肺熱移葛根芩連湯甘桔湯先瀉後欬脾濕動五
苓散胃苓湯陳平湯燦淫而致槁灼資荷露蔗漿
以救液溫熱而動痰火賴冰雪水鮮地潢以除焚

火亢刑金犀羚膽菊陰虛木僭雞子膠連

又錄醫級賦云

嗽而渴飲聲嘶體痛者亦宜麻杏石甘湯

董氏醫級云夜間嗽者宜佐血分藥如紅花當歸
香附青蒿知母之屬

卷之六

重刊書目

如而

之

次

喘

治喘大法。當別兩途。在肺為實。在腎為虛。是而寒兮。

必上挾干阻凝痰杏厥樸桂枝湯小青龍湯並主。是而熱兮。蘊

凝化邪氣蒸石膏甘草麻黃杏仁葦莖湯同需。若虛喘之

治例。分氣脫與精傷。填精必資濃厚。鎮攝之品兼襄。

從陰兮。青鉛入於都氣丸。從陽兮。腎氣丸加以沉香。

倘其吸傷元海。氣脫根浮。草木無情。難恃人參。紫車

礞英。五味子宜投。續元真於頃刻。補天之治。誰俾肺

家珍

氣壅而滿喘瀕危○ 瘡毒內閉○ 閉塞用中滿分消之法

通草杏仁桑皮茯苓厚朴猪苓 支飲逆而肝升莫制○ 烟鬱

氣冲即 喘背上一宗金匱旋覆花之湯○ 夏半氣散○ 納

腎液已枯○ 乾年○ 嗽身動○ 即嗽喘舌乾○ 涸大○ 杓熟地

胡桃○ 脯脂青鹽牛膝巴戟○ 天陽虛濁飲○ 泛○ 妨臥人○ 蔓

猪苓澤瀉○ 附○ 茯苓乾姜補土生金○ 煖喘○ 勞建中○ 錫去

加人參最好下虛上定○ 腎味蒸不納早晚分治為長○ 地

躡服○ 卧時另服○ 威喜丸○ 竹瀝姜汁○ 五味磁石○ 秋石○ 蜜○ 指

論案又如逍遙散入茱萸治鬱喘而當效

而喘此火鬱白虎湯加瓜蒌仁枳殼黃療火喘以彌

良初虞喘作而得食癰痰下稍止其稍久喘反大作此痰

火上升不盡中虛并藏復庵証治右二條虛喘胖而投補

藥暫安未堪深恃升子皆一陽初升仍死極而腎氣不肺

脹向推越婢湯或繩用收斂而痊醫統云宜五味烏

類之久喘餘二十多屬肺虛或獨清陽明而止喘症可

專執新久為斷若夫哮喘之患遇冷輒劇一屬驟寒

右醫貫批

包熱越婢湯加半夏相宜一由中外皆寒。麥蘇溫肺
湯為合。樓所以痰氣宿哮。肺俞為病。病發搜邪。病去
養正。腎氣凡真武湯。平時治本。法偏佳。葶蘆湯。嗽青
龍湯。臨急救危。功獨勝。臨證指南

附醫級摘要

喘症虛寔迥別。凡氣機虛促之人。其感無論內外。
病則喘象隨形。倘無寔證而誤攻之。其變甚速。
定喘湯。金沸散。治肺寒。膈熱。痰嘶。貞元飲。金匱腎。

九

療元海無根氣竭
宜溫寒清及渴者亦

失音

蓋聞金空則鳴。金寔無聲。或金破碎。跡無並令失音。
是以外寒內熱。無如麻黃杏仁甘草湯。胆火鑠肺。
喉燥必用桑葉丹皮雞子白。豉麥冬生肺失清肅。
歌自屬液虧。梗寫白散加麥冬結病閱春秋。欲膝失音。
輕愈依然金寔。加麻杏干苡仁湯爰有久欬失音。喉痺為
殃沙參甘蟬地苳冬石斛阿膠。璣黃血後音啞而
便澹。與甘緩平調之法。斛扁豆白芍炙甘草石斛勞損食衰

而喘泄瀝選脾腎兩補之方熟地 苓 芩 五 味 山 藥 蓮 肉 至 如 木

火鑠金熱痰壅肺竅內奪而厥則為瘖瘵龍相以火

炎兮如燎凌灼肺金凡瀉寔而補虛總宜甘潤而忌

苦燥右並論指若夫五臟之病並能為瘖憂思心驚

恐肝酒色腎怒肝饑飽勞後脾火燥刑金肺或熱

極驟飲冷水與風邪寒氣暴吸同因錄書肝脈驚暴

有所驚駭而聲瘖已內經言謂不宜用降氣氣湯上及潤下

尤為治風中廉泉而不語因滑脾臥當風所致右關浮