

# 景岳全書

卷四十七



景岳全書外科鈴目錄聖集

卷之四十七 外科下

發背四二

腦疽四三

耳瘡四四

鬚疽四五

疔腮四六

癰瘰四七

疔瘡四八

時毒四九

肺癰肺疫五十

乳癰乳岩五一

胃脘癰五二

腹癰五三

腸癰五四

附骨疽五五

臀癰五六

流注五七

鶴膝風五八

多骨疽五九

下疳瘡六十

便毒六一

楊梅瘡六二

囊癰六三

懸癰六四

脫疽六五

腳發六六

足跟瘡六七

腎臟風瘡六八 臙瘡六九

天泡瘡七十

赤白遊風七一

翻花瘡七二

痔漏七三

附臙毒下血按

跌打損傷七四 杖瘡七五

破傷風七六

疔八十

類破傷風七七

外科下論列方

班疹丹毒七八  
瘤贅七九



南京中医药大学图书馆版权所有

景岳全書卷之四十七賢集

會稽 張介賓 會卿

休寧 查廷璋禮南氏訂

外科鈴下

發背 四十二

發背屬督脉膀胱經凡陰虛火盛或醇酒厚味或鬱怒房勞或  
丹石熱毒皆能致之若腫赤痛甚脉洪數而有力者熱毒之  
證也爲易治若漫腫微痛色黯作渴脉雖洪數而無力者陰  
虛之證也爲難治若不腫不痛或漫腫色黯脉微細者陽氣



北京中医药大学图书馆版权所有

虛甚也尤爲難治大抵發背之證其名雖多總惟陰陽二證爲要若發一頭或二頭其形焮赤腫高發熱疼痛頭起者爲癰屬陽易治若初起一頭如粟不腫不赤悶痛煩躁大渴便秘睡語咬牙四五日間瘡頭不計其數瘡口各含如粟形如蓮蓬故名蓮蓬發積日不潰按之流血至數日或八九日其頭成片所含之物俱出通結一衣揭去又結其口共爛爲一瘡其膿內攻其色紫黯者爲疽屬陰難治且此證不可大痛又不可不痛若見煩悶者多不治總之瘡瘍雖云屬火然未有不因陰虛而致者故經云督脉經虛從腦而出膀胱經虛從背而出故不可專泥於火

陳良甫曰皆疽之源有五天行二瘦弱氣滯三怒氣四腎氣

虛五飲冷酒食炙燖服丹藥

立齋曰大抵發背之證雖發熱疼痛形勢高大煩渴不安但得  
脉息有力飲食頗進可保無虞其膿一潰諸證悉退多有因  
膿不得外泄以致疼痛若用敗毒寒藥攻之反致誤事若有  
膿急針之膿一出苦楚即止膿未成而熱毒作痛者可用解  
毒之藥亦有腐潰尺餘者若無惡證則投以大補之劑肉最  
易生亦無所妨惟忌腫不高色不赤不掀痛脉無力不飲食  
腫不潰腐不爛膿水清或膿多不止皆屬元氣虛也爲難治  
宜峻補之其或膿血既泄腫痛尤甚膿水臭敗煩躁時嗽腹

痛渴甚瀉利無度小便如淋乃惡證也皆不可治

又灸法曰予常治發背不問日期陰陽腫痛或不痛或痛甚但未成膿或不潰者卽與灸之隨手取效或麻木者明灸之毒氣自然隨火而散或瘡頭如黍者灸之不效亦有數日色尙微赤腫尙不起痛不甚膿不作者尤宜多灸勿拘日期更服甘溫托裏藥切忌寒涼之劑其有勢未定者或先用箍藥圍之若用烏金膏點患處尤妙凡人初覺發背赤熱腫痛莫辨其頭者但以濕紙覆其上立候視之其紙有先乾處卽是結癰頭也取大蒜切成片如二三錢厚薄安于頭上用大艾炷灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛灸至痛時方止

最要早覓早灸爲上一日二日十灸十活三日四日六七活  
五日六日三四活過七日則難爲力矣若有十數頭作一外  
生者卽用大蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚艾于蒜餅上燒之  
亦能活也若背上初發赤腫一片中間有一片黃粟米頭子  
便用獨蒜切去兩頭取中間半寸厚者正安于疮上灸十四  
壯多至四十九壯蓋如此惡證惟隔蒜灸及塗烏金膏有效  
又治法曰腫硬痛深脉實者邪在內也可下之○腫高炊痛  
脉浮者邪在表也宜托之○炊痛煩躁或咽乾火在上也宜  
瀉之○腫高或不作膿者邪氣凝結也宜解之○腫痛飲冷  
發熱睡語者火也宜清之○不作膿或不潰不斂者陽氣虛

也宜補之○瘕肉不腐或積毒不解者陽氣虛也宜助陽氣  
○膿多或清者氣血俱虛也宜峻補之○脉浮大或沉而肌  
肉遲生者氣血俱虛也宜補之○右關脉弱而肌肉遲生者  
宜補脾胃

又諸毒治法曰如頭痛有表證者宜先服人參敗毒散一二  
劑○如癰痛發熱脉數者用金銀花散槐花酒神功托裏散  
○如疼痛腫硬脉實者以清涼飲仙方活命飲苦參丸○腫  
硬木悶疼痛發熱煩躁飲冷便秘脉沉實者內疎黃連湯或  
清涼飲○大便已通欲其作膿宜仙方活命飲托裏散蠟蟻  
丸外用神異膏○如飲食少思或不甘美用六君子湯加藿

香連進三五劑更用雄黃解毒散洗患處每日用烏金膏塗  
疮口处俟有磨口即用紙作撚蘸烏金膏絀入疮内○若有  
膿爲脂膜間隔不出或作脹痛者宜用針引之腐肉堵塞者  
去之若瘀肉腐動用猪蹄湯洗之○如膿稠或痛飲食如常  
瘀肉自腐用消毒與托裏藥相兼服之仍用前二膏塗貼○  
若腐肉已離好肉者宜速去之○如膿不稠不稀微有疼痛  
飲食不甘瘀肉腐遲更用桑柴灸之亦用托裏藥○若瘀肉  
不腐或膿情稀不炊痛者急服大補之劑亦用桑木灸之以  
補接陽氣解散鬱毒○常規患疽稍重未成膿者不用蒜灸  
之法及膿熟不開或待腐肉自去則多致不救○大抵氣血

壯實或毒少輕者可假藥力或自腐潰若怯弱之人熱毒中  
隔內外不通不行針灸藥無全功矣○此證若膿已成急宜  
開之否則重者潰通臟腑腐爛筋骨若使透隔則不可治輕  
者延潰良肉難于收功因而不斂者多矣

又諸補治法曰若腫炊作痛寒熱作冷飲食如常此形氣病  
氣俱有餘也先用仙方活命飲後用托裏消毒散解之○漫  
腫微痛或色不赤飲食少思此形氣病氣俱不足也用托裏  
散調補之○不作膿或膿成不潰陽氣虛也托裏散倍加肉  
桂參芪○膿出而反痛或膿清稀氣血俱虛也八珍湯○惡  
寒形寒或不收斂陽氣虛也十全大補湯○晡熱內熱或不

收斂陰血虛也四物加參朮。作嘔欲嘔或不收斂胃氣虛也六君加炮薑。食少體倦或不收斂脾氣虛也補中益氣湯加茯苓半夏。肉赤而不斂血熱也四物加山梔連翹。肉白而不斂脾虛也四君加酒炒芍藥木香。小便頻數者腎陰虧損也加減八味丸。大抵瘡毒勢甚若妄用攻劑怯弱之人必損元氣因而變證者衆矣。

又三證治法曰若初患未發出而寒熱疼痛作渴飲冷此邪氣內蘊也仙方活命飲若口乾飲熱漫腫微痛此元氣內虛也托裏消毒散若飲食少思肢體倦怠此脾胃虛弱也六君子湯如未應加薑桂其有死者乃邪氣盛真氣弱而不能發

出也在於旬餘之間見之。○若已發出用托裏消毒散不腐  
潰用托裏消毒散如不應急宜溫補脾胃其有死者乃真氣  
虛而不能腐潰也在於二旬之間見之。○若已腐潰用托裏  
散以生肌如不應急溫補脾胃其有死者乃脾氣虛而不能  
收斂也在於月餘見之此三證雖不見於經藉余嘗治驗者  
千金方灸法治癰背已潰未潰者用淡豆豉以水和搗成硬餅  
依腫大小作餅三四分厚如已有瘡孔勿置瘡孔上但四布  
豆餅列艾其上灸之使微熱勿令破肉如熱痛急少起之日  
灸二度如先有瘡孔孔出汁即瘡  
一驗透膈法凡背疽大潰欲驗穿透內膜者不可用皂角散噓

法但以紙封患處令病者用意呼吸如紙不動者未穿透也  
倘用取嚏法鼓動內膜則反致穿透慎之慎之

都憲周弘岡背患疽腫而不潰脉大而浮此陽氣虛弱而邪氣  
壅滯也用托裏散倍加參芪反內熱作渴脉洪大鼓指此虛  
火也用前散急加肉桂脉證頓退仍用托裏而愈若以爲熱  
毒而用寒藥則誤矣○上舍張克恭患此內服外敷皆寒涼  
敗毒遍身作痛欲嘔少食晡熱內熱惡寒畏寒余曰遍身作  
痛營衛虛而不能營於肉裏也欲嘔少食脾胃虛寒而不能  
消化飲食也內熱晡熱陰血內虛而陽氣陷於陰分也惡寒  
畏寒陽氣虛弱而不能衛於肌肉也此皆由脾胃之氣不足

所致遂用補中益氣湯諸證漸退更以十全大補湯腐肉漸  
潰又以六君子湯加芎歸肌肉頓生而愈○府庠彭碧溪患  
腰疽服寒涼敗毒之藥色黯不痛瘡頭如鋪黍背重不能安  
寢耳聾目白面色無神小便頻澀作渴迷悶氣粗短促脈浮  
數重按如無余先用滋水之藥一劑少頃便利渴止背即輕  
爽乃砭出瘀血以艾牛筋許明灸患處外敷烏金膏內服參  
芪歸朮肉桂等藥至數劑元氣稍復白疑肉桂辛熱一日不  
用手足並冷大便不禁仍用肉桂及補骨脂三錢肉豆蔻一  
錢大便復常其肉漸潰更用當歸膏以生肌肉八珍湯以補  
氣血而愈○上舍蔡東之患此余用托裏之藥而潰瘡口尙

未全斂時值仲冬且兼咳嗽余曰瘡口未斂脾氣虛也咳嗽不止肺氣虛也法當補其母一日與之全宴見忌羊肉余曰補可以去弱人參羊肉之類是也最宜食之遂每日不徹旬餘而瘡斂嗽亦頓愈矣○一男子年踰五十患發背色紫腫痛外皮將潰寢食不安神思甚疲用桑柴灸患處出黑血卽鼾睡覺而諸證如失服仙方活命飲二劑又灸一次膿血皆出更進二劑腫痛大退又服托裏消毒散數劑而斂夫瘡勢熾甚本宜峻劑攻之但年老血氣衰弱况又發在肌表若專於攻毒則胃氣先損必反誤事俱薛按

予長男於二週患背疽治按在腫瘍條中新按

一論外通用方

神仙薰照法外一二三

腦疽四十三

立齋曰腦疽屬膀胱經積熱或濕毒上壅或陰虛火熾或腎水虧損陰精消涸所致○若腫痛未作膿者宜除濕消毒○大痛或不痛或麻木者毒甚也隔蒜灸之更用解毒藥○腫痛便秘者邪在內也宜泄之○不甚痛或不作膿者虛也托裏爲主○膿成脹痛者針之更以托裏○上部脉數實而痛者宜降火○上部脉數虛而痛者宜滋陰降火爲主○尺部脉數而作渴者滋陰降火○脉數而虛細無力或膿清或不斂

