

濟陰綱目卷之二

關中 武之望叔卿父輯著 金斗 張孫振公武父訂正

西陵 汪 淇憺漪子箋釋 天都 查 望于周父叅閱

○經閉

○論經閉由二陽之病治宜瀉心火養脾血

瀉心火養脾血
是從本文之義
愚謂當原隱曲
推解益人有隱
情曲意難以舒
其衷者則氣鬱
而不暢不暢則
心氣不開脾氣
不化水穀日少
不能變見氣血
以入二陽之血
海矣血海無餘
所以不月也傳
為風消者陽明
主肌肉血不足
則肌肉不榮其
不消瘦乎風之

潔古曰女子月事不來者先瀉心火血自下也內經曰二陽之病發心脾有不得隱曲故女子不月其傳為風消王啓玄註曰大腸胃熱也心脾受之。心主血心病則血不流脾主味脾病則味不化。味不化則精不足故其病則不能隱曲脾土已虧則風邪勝而氣愈消也。又經曰月事不來者胞脉閉也胞脉屬於心絡於胞中今

名火之化也故當根不得隱曲

上看乃有本

立方固有法然

不必太泥因人

易轍可也

據此論當有四

證如胃熱包絡

熱勞心熱三證

皆有餘宜瀉火

養血是矣而所

言脾胃久虛致

經水斷絕一症

又當以補脾胃

為主豈得捨而

勿論耶蓋水入

於經其血乃生

穀入於胃脉道

乃行水去榮散

穀消衛亡况脾

統諸經之血而

氣上迫肺心氣不得下通故月事不來先服降心火之劑後服局

方中五補丸後以衛生湯治脾養血也

○論經閉不行有三治宜補血瀉火

東垣曰經閉不行有三婦人脾胃久虛形體羸弱氣血俱衰而致

經水斷絕不行或病中消胃熱善食漸瘦津液不生夫經者血脉

津液所化津液既絕為熱所燬肌肉漸瘦時見渴燥血海枯竭病

名曰血枯經絕宜瀉胃之燥熱補益氣血經自行矣此病或經適

行而有子子亦不成而為胎病者有矣此中焦胃熱結也或心包絡脉洪

數躁作時見大便秘澀小便雖清不利而經水閉絕不行此乃血

海乾枯宜調血脉除包絡中火邪而經自行矣此下焦胞脉熱結也或因勞

以久虛之脾胃
以致氣血俱衰
者可不為之補
益乎即此以分
虛實明是四證
無疑而婁全善
乃遺補虛一證
何歟

心心火上行月事不來者胞脉閉也胞脉者屬於心而絡於胞中
今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來宜安心補血瀉火經自
行矣此上焦心
肺熱結也

婁氏曰右東垣潔古治血枯之法皆主於補血瀉火也補血者四
物之類瀉火者東垣分上中下故火在中則善食消渴治以調胃
承氣之類火在下則大小便秘澀治以玉燭之類玉燭者四物與
調胃承氣等分也火在上則得於勞心治以芩連及三和之類三
和者四物涼膈等分也潔古先服降心火之劑者蓋亦芩連三和
玉燭之類後服五補衛生者亦補氣之劑也
○論經閉因肝勞血傷

此病机也宜知

胸脇滿證人皆
伐肝豈知血枯
之故宜養肝血
也當須識此

既分肝脾當分
兩治

駱氏曰經云有病胸脇肢滿妨於食病至則先聞腥臊臭出清液
先唾血四肢清目眩時時前後血病名曰血枯此年少時因大脫
血或醉而入房虧損腎肝蓋肝藏血受天一之氣以為滋榮其經
上貫膈布脇肋若脫血失精肝氣已傷肝血枯涸不榮而胸脇滿
妨於食則肝病傳脾而聞腥臊臭出清液若以肝病而肺乘之則
唾血四肢清目眩時時前後血出皆肝血傷之症也

○論經閉因勞傷當大補脾胃

良方云婦人月水不通或因醉飽入房或因勞役過度或因吐血
失血傷損肝脾但滋其化源其經自通若小便不利苦頭眩痛腰
背作痛足寒時痛久而血結於內變為癥瘕若血水相併脾胃虛

發所未發極是
但有肝氣鬱滯
以致脾土失運
不能化血者又
須和肝氣爲要
者知之

弱壅滯不通變爲水腫若脾氣衰弱不能制水漸漬肌肉變爲腫
滿當益其津液大補脾胃方可保生王節齋曰婦人女子經脉不
行多有脾胃損傷而致者不可便認作經閉歟血輕用通經破血
之藥遇有此證便須審其脾胃如何若因飲食勞倦損傷脾胃少
食惡食泄瀉疼痛或因誤服汗下攻剋藥傷其中氣以致血少而
不行者只宜補養脾胃用白朮爲君茯苓芍藥爲臣佐以黃芪甘
草陳皮麥芽川芎當歸柴胡等分脾肝藥能生血而經自行矣又
有飲食積滯致損脾胃者亦宜消積補脾若脾胃無病果有血塊
凝結方宜行血通經

○論室女經閉成勞因思慮傷心

用青蒿者亦
不妨以其清氣
中熱也
暗室一炬

亦須兼脾蓋胃
陽脾陰主治有
誤也

寇宗奭曰夫人之生以氣血爲本人之病未有不先傷其血氣者
若室女童男積想在心思慮過度多致勞損男子則神色消散女
子則月水先閉蓋憂愁思慮則傷心而血逆竭神色先散月水先
閉且心病則不能養脾故不嗜食脾虛則金虧故發嗽腎水絕則
木氣不榮而四肢乾痿故多怒鬢髮焦筋骨痿若五臟傳遍則人
自能改易心志用藥扶持庶可保生切不可用青蒿蟲蟲等涼血
行血宜用栢子仁丸澤蘭湯益陰血制虛火
薛氏曰經云五穀入於胃其糟粕津液宗氣分爲三隧故宗氣積
於胸中出於喉嚨以貫心肺而行呼吸榮氣者泌其津液注之於
脈化以爲血以榮四末內養五臟六腑若服苦寒之劑復傷胃氣

必致不起

一室女年十七，瘕久不愈。天癸未通，發熱咳嗽，飲食少思，欲用通經丸。余曰：此蓋因稟氣不足，陰血未克故耳。但養氣血，益津液，其經自行。彼惑於速効，仍用之余曰：非其治也。此乃剽悍之劑，大助陽火，陰血得之則妄行，脾胃得之則愈虛。後果經血妄行，飲食愈少，遂致不救。

脉經云：有一婦將一女子，年十五所來診，言女子年十四時經水自下，今經反斷。其母言恐怖，師曰：若是夫人親女，必夫人年十四時亦以經水下，所以斷此爲避年。勿怪，後當自下。此真氣猶怯，稟賦素弱而然也。宜固天元真氣，使水升火降，則五臟自和而經脉

既有過年之名
不必強求其治

通矣。

○論經閉因積冷結氣

要略曰婦人之病因虛積冷結氣爲證。經水斷絕。至有歷年血寒。積結胞門。寒傷經絡。凝堅在上。嘔吐涎唾。久成肺癰。形體損分。在中盤結。繞臍寒疝。或兩脇疼痛。與臟相連。或結熱中。病在關元。脉數無瘡。肌若魚鱗。時着男子。非止女身。在下未多。經候不勻。令陰掣痛。少腹惡寒。或引腰脊。下根氣衝。氣衝急痛。膝脛疼痛。奄忽眩冒。狀是厥顛。或有憂慘。悲傷多嗔。此皆帶下。非有鬼神。久則羸瘦。脉虛多寒。三十六病。千變萬端。審脉陰陽。虛實緊弦。行其鍼藥。治危得安。其雖同病。脉各異源。子當辯記。勿謂不然。

分耗也

據此吐法能幸
子和者則可在
他人則不可用
吐固是一法然
体虛者不宜

惟有痰者可用
亦須形病俱實

○論經閉因痰飲所隔

張子和云凡婦人月事不來用茶調散吐之次用玉燭散芎歸湯
三和湯桂苓白朮散之類降心火益腎水開胃進食分陰陽利水
道之藥也

一婦人月事不行寒熱往來口乾頰赤飲食少且暮間欬一二聲
諸醫皆用虫蟲水蛭乾漆礪砂芫青紅娘子沒藥血竭之類惟戴
人不然曰古方雖有此法奈病人服之必臍腹發痛飲食不進乃
命止藥飲食少進內經曰二陽之病發心脾心受之則血不流故
女子不月既心受積熱宜抑火升水流濕潤燥開胃誘食乃涌出
痰一二升下泄水五六行濕水上下皆去血氣自然湍流月事不

形盛氣實病真
藥當然非輕試
之法慎之

爲水濕所隔。自依期而至矣。亦不用重蟲水蛭之類。有毒之藥。如用之。則月經總來小。洩反閉。他證生矣。凡精血不足。宜補之以食。大忌有毒之藥。偏勝而致天關多矣。

一婦人年三十四歲。經水不行。寒熱往來。面色痿黃。唇焦頰赤。時咳三二聲。問其所服之藥。黑神散。烏金丸。四物湯。燒肝散。驚甲散。建中湯。寧肺散。鍼艾千百轉。劇家人意倦。不欲求治。戴人憫之。先漏痰五六升。午前漏畢。午後進食。餘證悉除。後三日復輕。漏之又去痰一二升。食益進。不數日。又下通經散。瀉訖一二升。數日去。皮數重。小者如蟬片。大者如葦膜。不月餘。經水自行。神氣大康矣。

○論下利經斷利止經來

脉經曰婦人下利而經水反斷者何也師曰但當止利經當自下勿恠所以利不止而經斷者但下利亡津液故經斷利止津液復經當自下若婦人血下咽乾而不渴其經必斷此榮不足本自有微寒故不引飲渴而引飲者津液得通榮衛自和其經必復下

○論經閉總因血滯血枯

李氏曰婦人以血爲主天真氣隆壬癸水合腎氣全盛血脉流行常以三旬一見以象月盈則虧故曰月經經行與產後一般若其時餘血一點未淨或外被風寒及濕冷暑熱邪氣或內傷生冷七情鬱結爲痰爲瘀凝積於中曰血滯或經止後用力太過入房太甚及服食燥熱以致火動邪氣盛而津液衰曰血枯

驚則氣亂故錯
經妄行

怒則氣逆上冲
甚則嘔血

總結

良方云經後被驚則血氣錯亂妄行逆於上則從口鼻而出逆於身則血水相搏變爲水腫。恚怒則氣血逆於腰腿心腹背脇手足之間重痛經行則發過期則止怒極傷肝則有眩暈嘔血癰瘰血風瘡瘍等病加之經血滲漏於其間遂成竅血生瘡淋瀝不斷濕熱相搏遂爲崩帶血結於內變爲癥瘕凡此變證百出不過血滯與枯而已但血滯亦有虛熱血枯亦有虛熱故重則經閉不通以滯枯分言輕則經水不調止言虛與熱而已。○血滯經閉宜破者原因飲食毒熱或暴怒凝瘀積痰直須大黃乾漆之類推陳致新俾舊血消而新血生也若氣旺血枯起於勞役憂思却宜溫和滋補或兼有痰火濕熱尤宜清之涼之每以肉桂爲佐者熱則血行

以肝藏血肺主氣也

也。但不可純用峻藥。以虧陰道。至於耗氣益血之說。雖女科要法。但血爲氣配。氣熱則熱。氣寒則寒。氣升則升。氣降則降。氣行則行。氣滯則滯。如果鬱火。氣盛於血者。方可單用香附。九散抑氣散。當加木香。檳榔。枳殼。以開鬱行氣。若氣亂則調。氣冷則溫。氣虛則補。男女一般。陽生則陰自長。氣衰則血亦涸。豈可專耗其氣耶。論者多泥叔和血旺氣衰。不知叔和論肝肺二脉。則宜肝旺於肺。其實氣血平和。有孕故繼曰。兩臟通和。但婦人見偏性。鄙婢妾志。不得伸鬱怒。無時不起。故香附爲女人仙藥。經曰。邪氣勝則實。正氣奪則虛。可不悟諸大槩。只虛熱痰氣四證而已。不調亦大相同。隨證調治。飲食調和。自然血氣流通。更有凝滯。然後可用紅花當歸散。

紫歲散通經丸。導經丸之類。虛者只用當歸散以通之。通後又須養血益陰。使津液流通。苟不務氣血克和。而惟以毒藥攻逼。是求千金於乞丐。必死而後已。

○論經閉大法

丹溪云。經不通。或因墮胎及多產傷血。或因久患潮熱銷血。或因久發盜汗耗血。或因脾胃不和。飲食少進而不生血。或因痢疾失血。治宜生血補血。除熱調和之劑。隨證用之。或因七情傷心。心氣停結。故血閉而不行。宜調心氣。通心經。使血生而經自行矣。

生血在補脾胃
調飲食適寒溫
所謂脾旺則能
生血也至於心
氣結者宜調心
又為心主血也

○脉法

脉經曰。腎脉微濇為不月。

經閉脉法備前
調經門當參看。

惟心氣實胃
熱者方可

○治血枯經閉

玉燭散 治胃熱消渴、善食漸瘦、津液為熱燥竭、以致血海乾枯、

此即四物湯與調
胃承氣湯合方也

當歸 川芎 白芍藥 地黃 大黃 芒硝 甘草 各等分

右剉每服八錢、水煎食前服、

三和湯 治勞心、心火上行、以致胞脉閉塞、月事不來、
此即四物湯與涼膈

散合
方也

當歸 川芎 白芍藥 地黃 大黃 朴硝 黃芩

梔子 連翹 薄荷 甘草 各等分

右剉每服八錢、水煎服、

二黃散

治婦人室女經脉不通服之如神

大黃

燒存性二錢

生地黄三錢

右為末作一服空心好酒調下

二氣丸

治月水不調斷絕不產面黃肌瘦憔悴不美食有燥熱

以柴胡引子相參服之

大黃

四兩另為末醋一升慢火熬為膏子

當歸

白芍藥

各二兩

右為末以膏子和丸如桐子大每服二十丸淡醋湯下食前服

日進三服

五補丸

補諸虛安五臟堅骨髓養精神凡胞脉閉先服降心火

之劑後服此丸及衛生湯以治脾養血也

以醋熬大黃作膏引之入肝以行血也
四方俱用大黃而配合不離四物自有輕重緩急不同宜加詳之
心胞是多血之經此胞脉當指心胞而言

孰地以補天一之水人參以生天一之熱所謂水生於氣也然氣不降則水不生故用白茯苓以降天氣地骨皮以清氣中之火牛膝引之下行此立方之大意也
 五補丸補水之源衛生湯行已生之血蓋地黃茯苓人參俱補裏氣之不足而黃芪甘草文益表氣之不足當歸芍藥行肝血之不足有先後天之意焉
 夫血生於心

衛生湯

熟地黃 人參 牛膝酒浸去蘆焙乾 白茯苓 地骨皮各等分
 右為細末煉蜜丸如桐子大每服三五丸空心溫酒下

當歸

白芍藥各二兩

黃芪三兩

甘草一兩

右為末每服半兩水二盞煎至一盞空心溫服○如虛者加人參一兩○

潔古先服降心火之劑者蓋亦苓連三和玉燭之類後服五補衛生者亦補氣之劑也

栢子仁丸

治血虛有火月經耗損漸至不通日漸羸瘦而生潮

熱並治室女思慮成勞經閉慎勿以毒藥通之宜此兼服澤蘭