

乳症論治

乳症多主肝胃心脾。以乳頭屬肝經。乳房屬胃經。而心脾鬱結。多見乳核。乳巖諸症。乳癰。癰腫。色紅。屬陽類。由熱毒。婦女有之。膿潰。易愈。乳巖結核。色白。屬陰類。由凝痰。男婦皆有。惟孀孤爲多。一潰難治。且患乳有兒吮乳。易愈。無兒吮乳。難痊。其癰核等。日久轉囊穿破。洞見肺腑。損極不復。難以挽回。而乳巖尤爲根堅。難削。有歷數年而後痛。歷十數年而後潰者。痛已救遲。潰卽不治。須多服。歸脾養諸湯。切忌攻堅解毒。致傷元氣。以速其亡。

乳汁爲氣血所化。而源出於胃。實水穀精華也。惟衝脉隸於胃。故升而爲乳。降而爲經。新產三日後。發寒熱。名蒸乳。宜逍遙散去朮。少婦初

產乳脹不得通暢。宜清利。連翹金貝煎。若產多乳少。由氣血不足。宜滋

補。異功散。加歸芍。引之。仍以羹臠。產後乳自出。屬胃氣虛。宜固補。北福

黃耆五。以攝之。乳多脹痛而溢者。以溫帛熨而散之。小兒吮乳。鼻風吹入。

令乳房壅結。腫痛。名外吹。不急治。多成乳癰。內服枯蘘散。外甚則

連翹金貝煎。孕婦胎熱。寒熱乳腫。名內吹。用橘葉散治之。新產兒未能吮乳。餘

乳停蓄。滋脹發熱。內渴。腫硬結痛。名妬乳。宜擠去宿乳。或吮通之。

以貝母。枯蘘。甘草節。木通煎服。倘兒或不育。產母蒸乳。寒熱脹痛。宜斷乳法。以炒

煎服。消之。有氣血頗壯。乳汁不即下者。通草。猪蹄湯。通草散。或秘傳湧泉散。行之。痰

氣阻閉。經絡乳汁不下。肥人爲多。神效瓜蘘散。疏降之。或以絲瓜絡連

三錢。蓋被取汗。即通。其氣血虛虧。乳汁不下。玉露散。或八珍湯。加黃耆。麥冬。調補之。因肺胃

虛寒乳汁不下。千金鍾乳湯。溫養之。

婦女膽胃二經熱毒壅遏氣血乳腫焮痛。名乳癰。初起寒熱腫痛。

肉色焮赤。宜涼血疏邪。四物湯加柴胡山梔丹皮貝母瓜蒌甘草。乳房結核腫痛色赤。

宜疏肝清胃。內服牛蒡子湯外用活鮑魚連頭骨搗爛以香臘糟一團研勻敷上即消。氣血凝滯結核。

不散。連翹飲子。肝失條暢乳癰結核寒熱腫潰。清肝解鬱湯。心脾鬱傷乳癰。

發熱結核腐潰。歸脾湯煮。乳癰腫痛。用大貝母白芷乳香沒藥當歸身每服四錢白酒下。乳。

癰潰爛。用兩頭尖雄鼠糞土棟子經霜者佳露蜂房各三錢俱煨存性研末分三服酒下。間兩日一服。痛止膿斂。

如膿成不潰或膿水清稀。用托裏消毒散。潰久不斂。用桑根木芝或菌燒灰和梅片末搽之即愈。

乳內結小核一粒如豆不紅不痛內熱體倦月事不調名乳巖急。

早調治。若年久漸大。腫堅如石。時作抽痛。數年潰腐。如巖巖深洞。血水淋瀝者。不治。潰後大如覆碗。不痛而癢極者。內生蛆蟲也。症因憂思鬱結。虧損肝脾氣血而成。初起小核。用生蟹壳八數半枚。砂鍋內焙。研末。酒下。再用歸。陳枳。貝。翹。蘆。白芷。可消。蟹爪灰與煎劑。甘草節煎服數十劑。勿間。可消。間服。曾經驗過。若未消。內服益氣。以木香。陰虛。晡熱。加味逍遙散。去。寒熱抽痛。歸脾。元氣削弱。人參。煎餅熨之。焦朮。加熟地。服可消。若用攻堅解毒。必致潰敗不救。凡潰後最忌。乳沒等藥。產後兩乳伸長。細如雞腸。垂過小腹痛。難刻忍。名乳懸。此怪症也。偶亦有之。急用芎歸各一觔。切。片。只取四兩。水煎服。令產婦伏桌上。下置火爐。將餘片芎八爐漫燒。以口鼻及乳吸煙。令上如藥盡未收。如前法煎服。熏吸。便可縮上。否則用。草麻子三粒。研塗髮頂心。少頃便去之。即收。

附方

歸脾湯

見一卷勞瘵

思鬱虛損

益氣養榮湯

參苓陳香附各一錢

貝耆甘草桔梗各五分

生白朮

二錢薑

水煎

逍遙散

見一卷火

連翹金貝煎

金銀花紅藤七錢

土貝母

蒲公英

夏枯草各三錢

異功散

見一卷中風

七福飲

見三卷鬱

栝蒌散

栝蒌乳香

酒煎

橘葉散

柴芩青橘葉二十張

陳芎

桅

翹

石膏各一錢

蒸乳清利補脾補中補外吹內吹



通草猪蹄湯 通草一兩 同猪蹄煮汁服

通草散 柴 桔 瞿麥 花粉各一錢 通草七分 水煎

湧泉散 王不留行 白丁香 漏蘆 花粉 礬蠶 此方與

薛按湧泉散 爲末 每服四錢 用猪懸蹄煮汁調下

疏降 神效栝萸散 栝萸一个研 生甘草 當歸各五錢 乳香 沒藥各一錢 酒煎服 良久再服 治一切

瘰癧消腫 潰膿

玉露散 參 苓 芎 芷 歸 芍 桔各一錢 甘草五

八珍湯 見一卷中風

千金鍾乳湯 石鍾乳四錢 甘草二錢 漏蘆二錢 通草 栝萸根各半兩 水煎 一方有桂心

四物湯 見一卷中風

通補補虛溫養涼血



胃肝

牛蒡子湯

陳皮黃芩

牛蒡花粉

山梔連翹

金銀花角刺

甘草柴胡

青皮枳實

煎和酒服

連翹飲子

連翹草節

川芎桃仁

各一錢

角刺水煎

橘葉青皮

甘草

清肝解鬱湯

四物遠志

木通

香附

青貝

薑煎

蘇

桔

枳

托裏消毒散

參花

耆白芷

各七分

甘草

五分

煎

芍

各一錢

銀

木香餅子

木香五錢

大小貼之以熨

生地一兩

斗熨之

枞膏和勻

作餅量患處

貼之

忠處

貼之

貼之

托裏散

參耆各一錢

各八分

水煎

生朮

熟地

歸

芍

苓

陳

陳

托補痛腫清膿肝和核結



乳症

某氏孀居右乳潰膿已穿六孔左乳核堅抽痛寒熱食少脉弦數
審爲肝脾鬱結氣血虧損爲疏濟生歸脾湯其戚屬云前服歸
脾反痛奈何因檢前方耆朮皆炒用予謂此致痛之由也但全
用自效彼瘍醫不諳藥性生熟耳三服寒熱止食進前湯加枯
蘂貝母白芍陳皮五服右瘡平左核俱軟以前藥爲丸服而消
許氏產後乳頭紅腫焮痛用鮮天門冬搗汁和酒蒸熱服以渣敷
患處兩三次愈

何氏乳房結核症屬陰寒用鹿角尖磨水酒冲服效
吳女暑月左乳焮腫成膿寒熱往來脉右小數左弦長症由肝鬱



生火做清肝解鬱湯內用當歸白芍大貝桔萸天冬乳香丹皮
山梔甘草銀花外用內消散加減甲片乳香沒藥歸尾角刺生
大黃黃芩蜜調敷左乳頭潰根盤漫腫右乳又硬急用內托帶
消法生黃耆天冬桔萸香附歸身白芍貝母桔梗陳皮甘草一
服痛定左瘡孔膿稠右腫稍軟又數服數敷根盤消散瘡口用
生肌散得平

張氏產後妬乳去冬潰未卽斂今春近旁腫痛夫乳頭屬厥陰乳
房屬陽明今患在乳頭不致轉囊但潰後藥忌乳沒消腫宜托
消兼用旋覆花香附生大貝黃耆生桔萸廣皮鬱金甘草節當
歸二服痛止腫輒四服潰斂

何氏左乳結核經六七載潰後深洞如盞是名乳巖由脾肝鬱結
氣血失暢結核漸大潰則巉巖深陷可畏一僧猶用乳浸破耗
氣血不知年衰茹素日夕抽痛膿水清稀營衛日虧毒氣由化
恐三伏難延矣峻補氣血托裏滋液患口雖難遽斂尙冀痛勢
畧定遷延歲月耳八珍湯去炒朮加生耆五味麥冬大貝數服
膿稠痛緩入夏延秋患內作癢者肉腐蛆生以烏梅肉臘雪水浸雄黃末雞羽蘸
抹其弟婦張氏並係早孀亦患乳核廿餘年未潰堅大如胡桃
勞則抽痛脉來沈緩症屬鬱損心脾用歸脾湯加香附汁炒熟
地牡蠣粉大貝忍冬藤數十服而核漸輟



北京中医药大学图书馆藏书

熱入血室

凡診婦人先問經候。婦人病熱。值經水來。邪隨血去。其病自愈。若邪踞半表半裏。經水適來。適斷。血舍空虛。熱邪陷入。晝靜夜劇。寒熱如瘧。煩渴耳聾。譫語見鬼。此為熱入血室。小柴胡湯主之。凡經行後似瘧譫語。便是熱入血室。蓋血為邪迫。上入肝經。肝受邪。則譫語見鬼。邪入膽經。則血結於胸。手觸之輒痛。非藥所及。故當刺期門穴。屈乳頭向

間是仲景云。婦人中風惡寒發熱。經水適來。得之七八日。熱除。脉遲者。身涼。胸滿如結。胸狀者。刺期門。若晝則明了。暮則譫語。治無犯胃氣及上二焦。活人以小柴胡湯主之。邪入血分。故發狂。且譫語屬陽。明胃經者居多。故戒犯胃氣。陽明病下血。譫語。此為熱入血室。隨其實瀉之。犀角地黃湯加丹參。汗出

愈如寒熱有時。經來適斷。晝明了。暮譫語。醫用剛劑。遂胸膈不利。
涎潮上湧。喘急昏冒。當先化其痰。後除其熱。用一呷散。再用小柴胡湯。加生地黃。如
寒熱譫語。胸脇滿。如結胸狀。此邪與血結。用陶氏小柴胡湯。去參。棗。加生地。括。蔓。桃。仁。丹。
皮。山。若少陽本經血結。自甚。必小腹急痛。小柴胡湯。去參。甘草。棗。加延胡。當歸。尾。桃。仁。若
熱入血室。譫語如狂。血逆心包。胸中滿痛。為血結胸。用桂枝紅花湯。加梅。枝。紅。花。
仁。若寒熱如瘧。經水適來。狂言見鬼。或脇下鞭。脾陽虛者。乾薑。柴胡湯。
若熱入血室。譫語發狂。不省人事者。牛黃膏。按此症。必寒熱譫語。總
宜小柴胡湯。加減。其結胸。小腹滿痛。或小陷胸湯。加丹參。赤芍。陳皮。枳。殼。或桃。仁。承。氣。湯。玉。燭。散。選而
用之。

附方

和 解 瀉 熱 涼 血 化 痰 散 瘀 血 結 燥 脾 謔 狂 胸 痞 攻 瘕

小柴胡湯 見一卷溫

犀角地黄湯 見一卷溫

加味四物湯 四物湯加 丹 梔 柴 龍膽草

一呷散 萸 貝 苓 連 丹 梔 柴 草

陶氏小柴胡湯 柴 苓 夏 草 地 丹 桃仁 查肉

桂枝紅花湯 桂 芍 草 丹 紅花 或加海蛤 桃仁

乾薑柴胡湯 柴胡四兩 花粉 桂枝各一兩半 牡蠣粉

牛黃膏 牛黃二錢半 朱砂 鬱金 丹皮各三錢 腦子

小陷胸湯 見二卷痞滿 為末蜜丸桐子大 每服一丸

桃仁承氣湯 見一卷疫



北京中醫藥大學圖書館藏

去瘀血結

玉燭散

見六卷腹痛

海蛤散

海蛤 滑石 服二錢 用雞蛋白調下

甘草各五錢

芒硝二兩

為末



中國醫藥大學圖書館藏

熱入血室

丁氏秋間寒熱似瘧入暮譫語潮熱少腹滿此爲熱入血室用
柴胡湯去參薑棗加丹皮赤芍生地查肉生歸尾三五劑瘳
危氏夏初時疫恰值經斷血海虧虛壯熱陷裏口燥汗多夜煩不
寐用清化飲加山梔澤蘭藕汁清理血分而愈

胡氏冬溫化熱月信適來邪熱搏血醫用清解外不甚熱而臍腹
脹痛小水赤濇用導赤散加紅花桃仁延胡車前子再劑愈

睦婦傷寒發熱欬嘔右脇刺痛邪在少陽未解忽經行少腹煩滿
醫不知熱陷血海且有無犯胃氣及中上焦之戒猶用杏萸穀
芽等味煩滿益劇倣陶氏加減小柴胡湯去參棗加生地丹皮