

本經逢原卷二

長洲石頑張

璐路王父纂述

男

以柔安世

叅訂

訥遜言

芳草部

當歸 甘辛溫無毒。蜀產者力剛可攻。秦產者力柔可補。凡治本病酒制。有痰薑汁制。白者爲粉歸。性劣不入補劑。

本經主欬逆上氣。溫瘧寒熱。洗洗在皮膚中。婦人漏下絕子。諸惡瘡瘍。金瘡。煮汁飲之。

發明 當歸氣味俱厚。可升可降。入手少陰足太陰

本經逢原卷二 芳草部 當歸

北京中医药大学图书馆藏

本經逢原卷二

長洲石頑張

璐路王父纂述

男

以柔安世

叅訂

訥遜言

芳草部

當歸 甘辛溫無毒。蜀產者力剛可攻。秦產者力柔可補。凡治本病酒制。有痰薑汁制。白者爲粉歸。性劣不入補劑。

本經主欬逆上氣。溫瘧寒熱。洗洗在皮膚中。婦人漏下絕子。諸惡瘡瘍。金瘡。煮汁飲之。

發明 當歸氣味俱厚。可升可降。入手少陰足太陰



厥陰血分。凡血受病。及諸病夜甚。必須用之。本經主  
欬逆上氣。溫瘧寒熱。洒洒婦人漏下。絕子。皆取辛溫  
潤血之功。產後惡血上衝。亦必用之。別錄溫中止痛。  
甄權治下痢腹痛。女人瀝血腰痛。好古治衝脈爲病。  
逆氣裏急。帶脈爲病。腹痛腰痛。溶溶若坐水中。其功專  
於破惡血。養新血。潤腸胃。榮筋骨。澤皮膚。理癰疽。排  
膿止痛。蓋血壅而不流。則痛。當歸甘溫。能和營血。辛  
溫。能散內寒。使氣血各有所歸。入手少陰。心主血也。  
入足太陰。脾裹血也。入足厥陰。肝藏血也。身能養血。  
尾能行血。同人參黃芪。則補氣而生血。同牽牛大黃。  
則行氣而瀉血。同桂附吳萸。則熱。同大黃芒硝。則寒。

血虛以人參赤脂爲佐。血熱以生地條芩爲佐。仲景治陽邪陷陰。手足厥寒。脈細欲絕。用當歸四逆湯。於桂枝湯加當歸細辛通草。以通其血脈。卽下痢脈大氣不歸附。亦用此湯以歸附之。凡血虛發熱者。宜當歸補血湯。方用當歸三錢。黃耆一兩。作三服。心下刺痛者。一味當歸酒煎服。專主血分諸病。海藏言當歸血藥。何本經治欬逆上氣。按當歸辛散。乃血中氣藥。故欬逆上氣。有陰虛陽無所附者。用血藥補陰。則血和而氣降矣。凡衝任督帶病。皆不可少。惟泄瀉家痰飲家禁用。

芎藭

綱目名  
川芎

辛溫無毒。蜀產者味辛而甘。爲上。他



處產者氣味辛烈爲下。反藜蘆葉名藤蕪。

本經主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子。

發明 芎藭辛溫上升入肝經行衝脈血中理氣藥

也故本經治中風入腦頭痛等證取其辛散血分諸

邪也好古言搜肝氣補肝血潤肝燥補風虛又治一

切風氣血氣及面上遊風目疾多淚上行頭目下得

血海故四物湯用之者皆搜肝經之風治少陽厥陰

頭痛及血虛頭痛之聖藥助清陽之氣去溼氣在頭

頭痛必用之藥血痢已通而痛不止乃陰虧氣鬱藥

中加芎藭氣行血調其痛立止靈苑方驗胎法以生

芎藭末艾湯服一錢七腹中微動者爲胎千金方治  
子死腹中以芎藭末酒調方寸匙須臾二三服立出  
凡骨蒸盜汗陰虛火炎欬嗽吐逆及氣弱之人不可  
服其性辛散令真氣走泄而陰愈虛也

撫芎 辛溫無毒產江左撫州中心有孔者是

發明 撫芎升散專於開鬱寬胸通行經絡鬱在中

焦則胸膈痞滿作痛須撫芎開提其氣以升之氣升  
則鬱自降故撫芎總解諸鬱直達三焦爲通陰陽氣  
血之使然久服耗氣令人暴亡

蛇牀 苦辛溫無毒

本經主男子陰痿溼癢婦人陰中腫痛除痺氣利關

本經主男子陰痿溼癢婦人陰中腫痛除痺氣利關



節癰癩惡瘡。

發明 蛇床辛香性溫專入右腎命門少陽三焦氣分。本經列之上品。不獨助男子壯火。且能散婦人鬱攸。非妙達本經精義。不能得從治之法也。但腎火易動。陽強精不固者勿服。

藁本 辛苦溫無毒。香而燥者良。臭而潤者勿用。

本經主婦人疝瘕。陰中寒腫痛。腹中急。除風頭痛。長

肌膚悅顏色。

發明 藁本性升。屬陽。爲足太陽寒鬱經中。頭項顛

頂痛。及大寒犯腦。連齒頰痛之專藥。女人陰腫疝疼。

督脈爲病。春強而厥。亦多用之。霧露之邪。中於上焦。

須兼木香。風客於胃泄瀉。脾胃藥中宜加用之。今人  
只知藁本爲治顛頂頭腦之藥。而本經治婦人疝瘕  
腹中急陰中寒等證。皆太陽經寒溼爲病。亦屬客邪  
內犯之候。故用藁本去風除溼。則中外之疾皆瘳。豈  
特除風頭痛而已哉。云長肌肉悅顏色者。外用作面  
脂之類是也。但頭痛挾內熱。春夏溫病熱病頭痛口  
渴及產後血虛火炎頭痛。皆不可服。

白芷

卽都梁香

辛苦溫無毒

本經主女人漏下。赤白血閉。陰腫寒熱。頭風侵目。淚  
出。長肌膚潤澤顏色。可作面脂。

發明

白芷辛香升發。行手陽明。性溫氣厚。行足陽



明芳香上達入手太陰爲解利陽明風熱頭痛及寒熱頭風。目淚出之要藥。其所主之病不離三經。如寒熱頭風。眉稜骨痛。頭目齒痛。三經之風熱也。漏下赤白癰疽。頭面皮膚風痺燥癢。三經之溼熱也。風熱者。辛以散之。溼熱者。溫以除之。都梁九治崩漏赤白。深得本經之旨。性善祛風。女人漏下赤白。皆風入胞門所致。辛香入脾。故又能溫散血閉陰腫。及寒熱頭風。侵目淚出。總取辛散利竅之功。其長肌膚潤澤顏色者。則有排膿長肉之力。所以外科用之。痘疹起脹連皮腫者。於解毒藥內用之。預杜將來發癢之患。今人用治腸癰。有敗膿淋露不日。腥穢殊甚。遂致臍腹

冷痛須此排膿。膿盡乃以他藥補之。燒烟辟蟲蛇。爲末。新汲水調頻灌。解蛇毒。口攻。和膽礬麝香。參蛇傷潰爛。但性溫而升。味苦而散。故嘔吐因於熱者。痛下赤白。因於火者。勿用。癰疽潰後。亦宜漸減。以胃氣耗。白芍藥。酸苦平。微寒。無毒。入補脾藥。酒炒。入止血藥。醋炒。入和營藥。及下痢後重。血熱癰毒藥。並酒洗生用。入血虛水腫。腹脹藥。桂酒制用。反藜蘆。本經主邪氣腹痛。除血痺。利小便。益氣。發明。白芍藥。酸寒。斂津液。而護營血。收陰氣。而瀉邪熱。蓋瀉肝之邪熱。所以補脾之陰。卽本經主邪氣腹痛。益氣之謂。故仲景以爲補營首藥。入肝脾血分。



及陽維寒熱帶脈腹痛。補中下二焦。能於土中瀉水。爲血痢必用之藥。然須兼桂用之。方得斂中寓散之義。建中湯之妙用。人所不知。蓋瀉痢皆太陰之病。建中專主太陰腹痛也。其治血痺。黃耆桂枝五物湯中用之。非深達本經妙理者不能也。又得炙甘草治腹中急痛。同白朮補脾。同芍藥瀉肝。從人參補血虛。從黃連止瀉痢。同薑棗溫經散溼。在用者各得其宜耳。凡人陽氣虛衰。陰氣散漫。患腹脹滿急。於補中益氣藥中加白芍藥一味。以收陰。則陽虛不受陰制之脹得陽藥便消矣。然氣虛內寒者不可用。古云。減芍藥以避中寒。誠不可忽。產後不可用。以其酸寒瀉肝伐

生發之氣也。小便不利者，禁用。以膀胱得酸，敢斂愈。  
秘也。而真武湯中，又用以利小便者，深得本經之旨。  
蓋真武湯本治少陰精傷，而證見虛寒，非太陽膀胱  
癃閉之候，以其能益陰滋血，培養津液，小便自行，非  
通利也。至於桂枝湯中，用以護營血，使邪不得內犯。  
建中湯中，用以培土藏而治陽邪內陷腹痛，此皆仲  
景用藥之微妙。端不外本經之義。其除血痺，破堅積，  
治寒熱疝瘕，止痛，利小便，皆指赤者而言。與白芍無  
預。因本經未分赤白，故一貫例之。

赤芍藥

酸苦微寒，無毒。酒洗用。

本經除血痺，破堅積，寒熱疝瘕，止痛，利小便。

本經逢原卷二 芳草部 白芍藥 赤芍藥 六



發明 赤芍藥性專下氣故止痛不減當歸蘇恭以爲赤者利小便下氣白者止痛和血端不出本經除血痺破堅積止痛利小便之旨其主寒熱疝瘕者善行血中之滯也故有瘀血留著作痛者宜之非若白者酸寒收斂也其治血痺利小便之功赤白皆得應用要在配合之神乃著奇勩耳

牡丹皮

苦辛平無毒酒洗去鹼土曝乾勿見火

本經主寒熱中風癰瘕驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃五藏療癰瘡

發明

牡丹皮入手足少陰厥陰治血中伏火故相

火勝腎無汗骨蒸爲專藥本經主寒熱中風癰瘕驚

癰等證以其味辛氣竄能開發陷伏之邪外散惟自汗多者勿用爲能走泄津液也痘疹初起勿用爲其性專散血不無根脚散濶之慮王安道云志不足者足少陰病也故仲景腎氣丸用之後人惟知黃蘗治相火不知丹皮之功更勝也又癥堅瘀血留舍腸胃五藏及陰虛吐血衄血必用之藥以能行瘀血而又能安好血有破積生新引血歸經之功故犀角地黃湯用之凡婦人血崩及經行過期不淨屬虛寒者禁用又赤者利血白兼補氣亦如赤白芍藥之義諸家言其性寒安有辛香而寒者乎

木香 辛苦溫無毒形如枯骨味苦色淡黃者良味



鹹色黑勿用生用理氣煨熟止瀉。

本經主邪氣辟毒殺強志主淋露。

發明 木香氣香味厚不獨沉而下降蓋能理胃以

下氣滯乃三焦氣分之藥兼入肺脾肝三經能升降

諸氣故上焦氣滯臍鬱宜之者金鬱則泄之也然雖

入肺而肺燥氣上者良非所宜其中焦氣滯不運宜

之者脾胃喜芳香也下焦氣滯後重宜之者塞者通

之也若治中脘氣滯不運心腹疼痛以檳榔佐之使

氣下則結痛下散矣本經辟疫毒邪氣強志止淋露

以其辛燥助陽善開陰經伏匿之邪大明治心腹一

切氣膀胱冷痛嘔逆反胃霍亂痢健脾消食安胎

甄權治九種心痛。積年冷氣。疝瘕塊脹痛。壅氣上衝。煩悶羸劣。女人血氣刺痛不可忍。然香燥而偏於陽。肺虛有熱。血枯而燥。及陰火衝上者勿服。

甘松香

甘溫無毒。

發明 甘松芳香升竄。能開脾鬱。少加脾胃藥中。甚醒脾氣。主惡氣。卒心痛滿。風疰齒齲。得白芷白附子良。腳氣膝腫。煎湯淋洗効。

山柰

辛溫無毒。

發明 山柰芳香。入陽明。煖胃辟瘴。癘惡氣。治心腹冷氣痛。寒溼霍亂。風蟲牙痛。皆芳香正氣之力也。

高良薑

辛大溫無毒。煨熟用。子名紅薑蔻。



發明 長葛辛熱純陽土升。八足陽明太陰二經爲

客寒所犯。則逆冷霍亂腹痛諸病生焉。辛溫煖脾胃

而逐寒邪。則胃中冷逆自除。霍亂腹痛自愈。甄權治

腹內久冷。氣痛去風冷痺弱。大明主轉筋瀉利反胃

解酒毒消食。蘇頌治惡心嘔清水。皆取暖胃溫中散

寒之功也。而寒疝小腹掣痛。須向茴香用之。產後下

焦虛寒瘀血不行。小腹結痛者。加用之。若胃火作嘔

傷暑霍亂禁用。爲其溫燥也。○紅苳蔻辛溫。主水瀉

霍亂心腹絞痛。止嘔進食。大補命門相火。故正元丹

中用之。然能動火傷目。致衄。不宜久服。

草苳蔻 辛溫溫無毒。麩裏煨。去麩用。