

龜背

聖惠坐兒稍早爲客風吹脊風氣達髓使背高如龜雖有藥方多成痼疾以灸法爲要

錢兒生下客風

入脊逐於骨髓卽成龜背治之以龜尿點節骨取尿之法當安龜在蓮葉上夜用鏡照之其尿自出以物盛之

張嬰兒生後一百八十日始滿骨成方能獨坐若強令兒坐之太早卽客風寒吹着兒背及脊至骨傳入於髓使背高如龜之狀以松藥丹療之

張松藥丹

治龜背病

松花洗焙乾

枳殼去瓢麪炒

獨活

防風去蘆又各壹兩

川大黃炮

前胡

麻黃去根節

桂心各半兩

右為細末煉蜜和如黍米大每服十粒粥飲下量

兒大小加減 聖惠麻黃丸多芍藥少前胡一

方多檳榔訶皮 一方無松花有當歸煮麵糊丸

名枳殼防風丸

聖惠灸法當灸第三椎骨節下兩旁各一寸半肺俞

穴又第五椎骨節下兩旁各一寸半心俞穴又第七

椎骨節下兩旁各一寸半高俞穴以小兒中指節為

一寸艾炷如小麥大三五壯卽止此法累用十有二

二得效亦無全効之功

顓頊經云符殿直之孫
紹熙辛亥春灸卽効

世龜背在百日內不治

通身青赤百日內不食

吐乳不乳全無之候

臨期幸甚此候之候
臨期幸甚此候之候

吐乳不乳小麥大三正吐乳此公衆田十餘

脫肛

曾肺與大腸爲表裏肛者大腸之門肺實熱則閉結不通肺虛寒則腸頭出露有因痢久裏急後重努力肛開爲外風所吹或伏暑作瀉腸滑不禁或稟賦怯弱易於感冷亦致大腸虛脫凡小兒所患瀉痢皆因暑濕風熱乘脾胃虛而得蓋風屬木木勝則制土土主脘胃虛而受制又濕喜傷脾因虛受濕不能分別清濁水穀交雜則爲洞泄洞泄既久大腸亦虛大腸乃手陽明燥金而土虛不能生金金氣既虛則傳送

之道亦虛又為風冷所襲故肛門脫而不收治宜補

脾溫胃使金得受母之益而氣實宜藿香飲不乳勻

氣散疳平胃散不乳主之次則內投固腸之劑用健

脾飲不乳養臟湯痢服餌外以敷貼之法用伏龍肝

散傳之及草麻膏貼頤門使引氣上令其自收如收

盡仍以水洗去其膏及有邪熱積滯於大腸未經踈

滌亦成此疾其肛門色紅而軟肺脉浮數右手指紋

紫見身微有熱時或煩躁先投清肺飲嗽踈解次用

薄荷散蟠龍散為治間服萬安飲亦佳薛巢氏云

實熱則大便秘結虛寒則肛門脫出此多因吐瀉脾

氣虛肺無所養故大腸之氣虛脫而下陷也用補中
益氣或四君子爲主若脫出緋赤或作痛者血虛而
有熱也用補中益氣湯佐以四物牡丹皮微者或作
痛者氣虛而有熱也佐以四君牡丹皮大凡手足指
熱者屬胃氣熱手足指寒者屬胃氣寒 湯氏方治
脫肛大腸自糞門出宜用葱湯薰洗令軟欬欬送上
此因瀉利得之者亦可服瀉利之藥然後用槐花等
藥又有用一味五倍子煎湯入朴硝薰洗而縮者又
有用真蒲黃碾極細以猪脂拌勻傅肛門上而入者
全嬰方用瀉腸散兼有痔證腫痛者用黃丹滑石等

分井水調塗卽消并用鉛白霜半錢片腦半字好酒
調傳腫處甚佳黃連解毒湯亦可服用苦參湯洗亦
効亦有蜜陀僧白礬腦子末之傳上更用荊芥防風
等項洗之用生栝樓根者効

張煥蕪荑丹 治小兒久痢頻併大腸虛冷肛

門脫出

白蕪荑 微炒 鼈甲 塗酥炙黃去殼襴 蝸牛皮 炙令焦黃

磁石 燒醋蘸七遍細研水飛各壹兩 蚌蛇膽

黃連 去鬚微炒各半兩

石件壽羅爲末用軟飯和丸如黍米大每服十粒

粥飲下量兒大小加減乳食前

妙應散

莨菪子

淘去浮者炒令黑色

天台烏藥

各半兩已

上搗羅爲細末次入

白麵

壹分

龍腦

半錢

右件都拌勻每服一字蜜湯調下乳食前

曾氏薄荷散

治陽證脫肛

薄荷

和鹽

骨碎補

去毛夕半兩

金罌刺根

半錢

甘草

貳錢半

右剉碎每服二錢水一盞入無灰酒大匙煎七分

空心溫服或無時

聚寶方象豆丸

治諸痢脫肛

檳藤子

一名象豆出雲南山
林豐如通草藤紫黑

右一味為末每服二錢血痢熱酒調下三服必效

白痢傾打破取仁子碎碾銀器中慢火炒黃褐色

碾細羅一兩遍後若帶白時再炒褐色為末宿蒸

餅湯浸却握乾和圓豌豆大略焙乾每服十五丸

至二十九倉米飲溫下空心食前服痢差即止蟲

毒五痔小兒脫肛並可為末酒調下立愈

茅先生方用破故紙一兩於瓦上焙乾為末每服一

字或半錢米飲調下 吳茱萸末亦可

嬰孺用黃連黃檗二味為末蜜丸如梧子大飲下三丸
日三四服

莊氏用乾蓮蓬焙乾為末米飲調下一二錢

湯氏治大腸虛弱肛門脫下方

龍骨

訶子

煨去核
各壹兩

沒石子

大者
貳枚

罌粟殼

去核醋塗
炙貳錢

右為末白湯點服仍用蔥湯薰洗令軟欸欸以手
托入用新磚瓦燒紅以醋澆之氣上即用脚布疊
數重壓定使熱氣上透不可過熱令病者以臂坐
於布上如覺布溫逐旋減之以常得溫熱為度并

常服前藥

潔古五倍子散

治小兒脫肛

五倍子

地榆

各等分

右為細末每服半錢或一錢空心米飲調下

外治

錢氏赤石脂散

治小兒因痢後努軀氣下推

出肛門不入

軀於建反用力努腹也

真赤石脂

伏龍肝

各等分

右為細末每用五分傅肛頭上頻用按入

曾氏蟠龍散

治陽證脫肛

乾地龍蟠

如錢樣者佳畧去土壹兩

風化朴硝

貳錢

右剉焙研爲細末仍和勻朴硝每以二錢至三錢
肛門濕潤乾塗或乾燥用清油調塗先以見毒消
荆芥生蔥煮水候溫浴洗輕與拭乾然後傳藥

伏龍肝散 治陰證脫肛

伏龍肝

壹兩

鼈頭骨

壹具

白藥煎

貳錢半

右三味焙研爲末每用一錢至二錢濃煎紫蘇湯
候溫和清油調塗患處並如前法浴洗拭乾方上
藥

治小兒脫肛用五倍子爲末量多少摻患處以物襯
手揉入切忌食發風毒物

脫肛治法用蒲黃一兩猪脂二兩煉猪脂和蒲黃成膏塗腸頭上卽縮入

水聖散 治小兒脫肛不收用浮萍草不以多少杵爲細末乾貼患處

瀉腸散 治小兒久痢大腸頭脫出不收

訶子

炮

赤石脂

龍骨

各等分

右爲末臘茶少許和藥摻腸頭上絹帛揉入又治痢米湯調又方治脫肛五倍子焙爲末入茶依前方用

勝雪膏

治隨腸番花鼠妳等痔熱痛不可忍或已

成瘡者並皆治之

片腦

風化硝

右件各半字用好酒少許研成膏子塗之隨手輒愈

治大人小兒脫肛不收方連翹不以多少洗淨爲細末先以鹽水洗後用藥末時時乾傳脫肛上立差

蓖麻膏

治暴患脫肛

蓖麻子

生油

右件爛將爲膏捻作餅子兩指寬大貼顙上如陰證脫肛如生附子末葱蒜同研作膏依前法貼之

朱氏家傳治小兒脫肛方

右用磁母石以石礱為末麵糊為丸如菉豆大熟水下五七丸後以麝刀水洗脫肛處立效

脫肛用東北方陳壁泥土湯泡先洗下後熏上

保生信效 治久病腸風痔漏腸出不收至有出數

寸者苦楚良極小兒久瀉痢亦名此疾

右先用五倍子四兩以水五升煎湯一兩沸投入

朴硝四兩通手淋洗至水冷即止若覺熱痛即津

唾調熊膽塗之痛即止當漸收甚者不過淋洗三

五次收盡竊詳此藥朴硝能軟五倍子能收二物

相須以為用也或更以乾蜘蛛末摻之乘熱以敷

帛搨入尤妙

慘蜘蛛者與葛氏方同

九籥衛生療小兒脫肛方

香附子

荊芥穗

各等分

右同為麤末每用三匙水一大碗煎十數沸淋漉

苦參湯治脫肛并痔

枳殼

黃連

大黃

甘草

荊芥

苦參

赤芍藥

黃芩

各等分

右剉散每用五錢以車前子茅草同煎薰洗