

43

842.

薛醫官立產

下



薛氏女科卷二

目錄

經水論

產後調治

惡阻

子煩

口乾

子懸

子腫

子淋

遺尿

尿血

轉胞

經水時下

胎動

心腹痛

中惡

腰腹痛

心腹脹悶

半產

調治小產

子嗽

傷寒

時疫口乾

熱病

瘡疾

霍亂

中風

調治胎產備方

產科歌訣

薛氏女科卷二

經水論

婦人經事一月一至謂之月水取其信又曰潮水者  
賤之也凡一月兩至者血熱也兩月一至者血寒也  
先期而來者血虛有熱也過期而來作痛脈洪者血  
虛氣滯也脈虛者血虛有熱也過期不心痛者血虛有  
寒也過期而來紫黑成塊者氣鬱血滯也過期而來色  
淡肥者痰瘦者血氣虛也未來先痛者血寒氣滯也行  
後心痛者氣血虛也去血多而久不至者來血崩也去

多久不止而發腫滿者脾經血虛也經久不行而腫滿者瘀血滲入脾經也經久不行腹肋有心口痛者血結癥瘕也經行鬥氣而心腹心痛者瘀血為患也錯經妄行于口鼻火旺而血上行也經行身痛麻痺者血行疼者風寒觸經感冒也經水不調或腹痛白帶或淋瀝肌瘦者氣血兩虛也婦人四十以上經水一月兩至必成淋瀝須早治之

婦人患癆怯經閉骨蒸咳嗽此症中脈七八至當觀其肌肉何如若瘦之甚或大肉已去或面色青薄

者服藥無效

### 產後調治

婦人男子之症治法頗同惟胎前產後為異血虛必用四物湯調氣血附不可缺若屬血桃仁紅花之類必以四物湯為主以生血也

婦人十月滿五為大產月分不足為小產若頭胎在  
第幾月小產而第二三胎至期復墮者須服安胎  
飲至十月方保無虞若大產一次便無此症

產婦子已在蓐不可令產母即臥須扶坐片時閱五

六時尤妙否則恐穢血迷心為害不淺

產婦敗血攻胃冲心皆危症也攻胃則嘔惡飽悶冲  
心則錯亂顛狂不治又產後百病惟嘔吐盜汗泄瀉  
三症至危三危並見必死若見一症搥心難痊若教  
病並作治其所急餘可緩圖故曰急則治其標緩則  
治其本

產後不語乃敗血迷裏心竅也勿恐勿疑但服七珍  
散一月可愈

產後宜虛 叔和曰新產之脈緩滑吉芤大弦急死

將臨寸口弦疾不調死此細附肯不絕生產後身體  
發且有去血過多者有惡露不盡者或傷飲食或感  
風寒或感冒夾食或觸怒傷氣或三日蒸乳皆能發  
寒黃熱并身疼腹痛須詳審用藥

產後去血過多而發熱脈必虛火而無力內不作痛  
此陰虛生熱非有餘之症也用四物湯去白芍加人  
參黃芪白朮茯苓滲決其熱若大熱不退加炒黑乾  
姜性蓋乾姜性熱能引血分藥入血分則生新血入  
氣或只用芎歸調血飲尤妙凡早起勞動傷力發

熱者調治皆用此法

產後惡露不盡發熱惡寒者必脇肋脹滿連大小腹  
有塊作痛名曰兒枕痛如瘀血腹痛用四物湯加五  
靈脂丹皮菟仁紅花元胡索香附青皮乾姜官桂各  
一錢二分酒水各半黑豆一撮煎好摩木乳汁入童便  
姜汁服之即痊再以八物湯加朝姜陳皮少佐以童便  
炒香附調理

產後脾胃虛弱不能消化因停滯而發熱必噯氣作  
酸惡食多味而臭胸膈飽滿甚則惡寒腹痛其氣口脉

必緊盛須用治中湯加神曲山查川芎砂仁黃連炒  
當歸佐之或用理脾湯更効

產後宜避風寒忌澡浴則服藥有效

產後陰脫玉門不閉用石灰一升炒熟以能煖草為  
度用荊芥防風不拘多少煎湯取石灰置腳桶內將  
湯沃之令婦坐桶上使其氣薰入陰中待湯溫和坐浸  
其中兩三次即平復

產後乳少者取猪蹄煎湯食之乳即大至

產後喘急為危症經云諸喘皆凶

產後小便不通腹脹如鼓將炒鹽和麝香納臍中用  
葱十餘莖紮餅一束均切心片約半指厚置鹽再用  
艾一團蓋滿葱上灸之使氣入臍難耐方通

產後當補氣血雖有雜病以未治之

產後血虛氣不宜發表

產後忌用芍藥以其酸寒伐生貴之氣也

產後虛火或血上行遂致血暈以鹿角燒灰研末好

酒重便灌下即甦再用韭菜一握切碎裝入有嘴瓶內

將醋煎滾沖入緊紮瓶口以瓶嘴對產婦鼻孔令吸

其氣即醒然須扶起勿使睡倒

產後中風先大補其氣血次治其痰不可作風治又  
須細按其脉右手脉微者補氣藥宜多於補血藥左  
手脉微者補血藥宜多於補氣藥

產後水腫亦以補氣為主當少佐以白朮茯苓以利其  
水

產後發熱必用乾姜輕者用茯苓淡滲其熱一應寧若  
發表之味皆不可用所以必用乾姜者因熱致陰虛故  
同補陰藥服之且能入肺以和肺氣引補陰藥入肺氣

以生血不可獨用

產後惡寒發熱腹痛者須去惡露腹脹滿者不是此症

產後發熱乳汁不通及膨痛若無子飲乳而欲消之用  
表茅二兩炒研爲末分四服清湯送下有子飲乳而  
欲通之用水通之草猪前蹄煎飲

產後脈洪數者死沉細者生產前六脈沉細濡弱者死  
洪數者生

產後血暈皆由敗血流入肝經故眼見黑花不省人

事用酒調黑神散服之最佳或燒稱錘通紅置瓶中  
以醋沃之得醋氣可除或以好醋時塗口鼻使聞其氣或  
以醋細少飲此為上策切不可以中風治之血暈之由或  
因使心用力太過以成此患如目下血多而暈者但昏  
悶煩亂而已以補血清心治之其下血少而暈者乃惡  
路停積上逆搶心須以破血行血治之

產後驚悸目血氣弱心氣不足虛邪乘踞心經故目  
不轉睛口不能呼其脉動而弱動為驚弱為悸用在  
苓補心湯以補心元之虛

茯苓補心湯方

當歸 芍 川芎 芍 白芍 芍 枳殼 芍 甘草 芍

陳皮 芍 半夏 芍 茯苓 芍 柴胡 芍 人參 芍

木<sub>六</sub> 芍 乾姜 芍 紫蘇 芍 姜 芍 棗 芍

右藥水煎服

產後去血多虛極生風者婦人以血為榮去血則氣  
不生是以唇青肉冷汗出目眩神昏錯亂遍身強直  
此即虛極生風也為補氣血若以風症治之誤矣

產後汗出不止者由陽氣虛而陰血益攝也陽者氣也