


滿洲養猪指南

那故教授欽銘捐贍



春陽齋

滿洲鐵道株式會社

興業農部務課

437.6
~~276~~
880

滿洲養豬指南


昭和三年六月二十五日印刷
昭和三年六月三十日發行

南滿洲鐵道株式會社

興業部農務課編




滿洲在來種牝猪



巴庫夏種牝猪



巴 庫 夏一回雜種牝猪
滿 洲 在 來



巴 庫 夏二回雜種牝猪
滿 洲 在 來

滿洲養豬指南

次序

第一章 滿洲養猪改良之必要

第二章 猪之種類

第一項 滿洲土着種

甲 大型種

乙 中型種

丙 小型種

第二項 巴庫夏種

第三項 雜種

巴庫夏一回雜種與滿洲土着二回雜種

六

五

四

三

三

三

三

一

第三章 猪圈建築法

第一項 小豬圈之寬容 七

第二項 中農家之農圈 八

第三項 大肥育猪圈 一二

第四章 蕃殖

第一項 種猪 一三

第二項 牡猪飼養法 一四

第三項 牝猪之飼養法 一五

第四項 交配之時節 一七

第五章 自分娩至離乳

第一項 分娩之準備 一九

第二項 分娩

二〇

第三項 猪仔之養護法

二一

第四項 牝猪之飼料

二四

第五項 離乳

二十四

第六章 猪之飼料與調製法

二十五

第一項 飼料之種類

二六

甲 穀類

二六

乙 根菜類

二七

丙 牧草

二七

丁 糟滓類

二八

戊 糜與麩

二九

第二項 飼料之調製

三〇

第七章 飼養法

三〇

第一項 土着種與改良種飼養上之差異 ······

三一

第二項 飼養之標準 ······

三一

甲 蕃殖猪 ······

三一

乙 肥猪 ······

三三

丙 一日分之飼料分量 ······

三四

第八章 去勢法

三五

第一項 去勢之時期與方法 ······

三五

甲 牡猪之去勢 ······

三六

乙 牝猪之去勢 ······

三六

第二項 去勢後之注意 ······

三七

第九章 管理

三八

第一項 猪圈之清潔法

三九

第二項 夏季及冬季之注意

三九〇

第三項 運動與給餌

四二

甲 運動

四二

乙 紿餌(附)飼槽與水浴槽

四四

第四項 猪體之修弄與馴道猪仔法

四七

第五項 傳染病發生當時之注意

四七

第十章 蘆珊瑚草地及蘆珊瑚乾草之利用

四八

第一項 蘆珊瑚草之播種法

四九

第二項 蘆珊瑚草之利用

五〇

甲 利用之爲牧場時

乙 乾草之利用

五一

第十一章 猪之疾病與其治療法

五一

第一項 猪虎列拉

五一

甲 猪虎列拉之症候

五二

乙 猪虎列拉之豫防與瓦克金注射

五二

丙 其他須知者

五四

丁 注射時使猪安定法

五四

第二項 猪 瘦

五六

第三項 炭 痘

五九

第四項 日射病(即渴病)

六〇

第五項 蠕蟲病

六一

第六項 雜 錄

六二

第十二章 猪糞與其利用
一 傳染病豫防液及血清類使用一覽表六二
二 滿鐵獸疫研究所血清及豫防液類之販賣價格六三

第一項 猪糞之成分及其生產	六四
第二項 猪糞之利用	六六
附錄	

種畜分配規章	一
種畜借與規章	七

滿洲養豬指南

第一章 滿洲養豬改良之必要

滿洲農家爲供耕田與輶車。每戶皆畜有牛、馬、驥、驢等大家畜各數頭。並利用農勞餘暇。更養山羊、綿羊、猪等小家畜。與家禽。以爲副業。一面以此類家畜之糞。爲其唯一肥料土糞之給源。而農家所飼家畜種類雖若斯之多。然皆各有其用。小家畜之中。山羊、綿羊以山地爲多。平原地方罕有飼養之者。惟猪與鷄則遍地皆有。不養此者。謂非農家。不爲過也。

現在滿洲農家所養之猪。決非有利之種類。如後章所述。有大、中、小之三種類。其通有之缺點。爲體扁平。而肉少。爲頭、腹、四肢等無用部分皆大。自背部至臀部之最必要部分則狹小。加以皮厚骨粗。故長肉處甚少也。大種與中種體驅頗大。重在二百五十斤以上。然晚熟。適於宰食之時期。在生後之一年半至

二年小種早熟。生後一年即可宰殺。惟體格極小。其重不過僅能有一百二三十斤以至五六十斤。

現滿鐵爲改良滿洲豬所獎勵之種類。爲巴庫夏種。此種早熟。生後十月以至一年即可宰殺。且頭腹四肢等之無用部分甚小。體肥而寬。皮薄骨細。故假爲體重雖與土著種相同。而其所出之肉則不比土著種爲多。實則即其體重亦遠在土著種之上也。

惟土著種之長處。爲蕃殖力强大。每腹產仔數遙比巴庫夏種爲多。又富於母性愛善。護其仔。故鮮有輾轉壓斃。或不授以乳。致阻發育之事。

於是以現在之土著種雜入巴庫夏種之血液。使用其肥滿長大。體濶加寬。減去小頭、腹、四肢等無用部分。併以增其早熟性。俾於一年以內得供宰殺等事。殊爲不要之圖。然同時於土著種之強於蕃殖力。富於母性愛等長處。亦須留意。勿使失掉也。據滿鐵公主嶺農事試驗場試養之成績。第一回雜種(以巴庫夏種與滿洲土著種初次交配之謂詳於後文)已能於生後一年即適宰殺。

其蕃殖力亦幸未受巴庫夏種之影響。而仍旺盛。及第二回雜種。則其體格之良好。幾與巴庫夏種無異。是以意爲巴庫夏種之血液。即以此第二回雜種程度爲止。嗣後即以雜種蕃殖爲宜也。故此小冊子即以述巴庫夏種及雜種之飼養方法爲主。

第二章 猪之種類

第一項 滿洲土著種

現滿洲農家廣爲飼養者。曰滿洲土著種。此種元來係由山東。直隸方面所傳來。服滿洲之風土氣候。始具現在之體形者。故頑健且多產。

然若爲充肉食而肥臍之能力。則視諸世界之優良種甚爲低劣。
土著種之體格。有大型者。中型者。又小型者之三種。故稱之曰大型種。曰中型種。曰小型種。

甲、大型種 為滿洲土著種中之最大者。活重達二百五十斤以至三百一二

十斤。生後二年即適宰殺。

此種之特徵爲頭部大。耳亦大而下垂。尖端達口角。不特額與喙處有深皺襞。全身皮面亦有若干皺襞。皮甚厚。毛長而稍粗。肉味雖較劣於小型種。而肥臍之効果則大。每腹產仔數爲十二以至十五。此種之飼育區域。北以長春、伊通、懷德地方爲主。南則限於昌圖、開原、撫鹿等處。近年飼育數方漸減少。

乙、中型種 此種活重約在一百八九十斤以至二百五十斤前後。生後一年半以至二年許適於宰殺。頭不若大型種之重且大。耳寬而垂。較大型種爲短。僅達眼與口角之間。

頭部之皺襞亦不若大型種之顯明。體表殆無皺襞。毛比大型種稍短而密。此種南自金州附近。北至濱江附近。東至莊河安東地方。及撫順附近一帶。皆廣爲飼養。

肉味較良於大型種。每腹產仔數則與大種同。

丙、小型種 此種爲土著種中之體軀最小者。活重不過一百五六十斤。

生後一年內外即適於宰殺。爲舊種中成熟最早之種類。耳小而立。皺紋殆無。嘴分外較長。肋骨彎曲。體帶圓味。皮薄而密生短毛。足則細短。此種因骨細皮薄。故屠肉量較多。肉味亦佳。惟產仔數比前二種爲少。通常自八頭至十二頭。

此種以遼河以西爲原產地。而傳遍滿洲全土。然到處多爲小農家所飼養。

第二項 巴庫夏種

巴庫夏種。爲現在全世界最優種類。肥時體重能達三百七八十斤以至四百三四十斤。除具有早熟而易肥育之特徵外。皮膚極薄。肉量(尤其爲瘦肉)分外較多。體色深黑。四肢與面尾之六處。皆有白斑。頭鼻比土著種極短。兩眼相離頗寬。耳小而直立。面目形相極其可觀。

肋體大彎。軀幹爲圓。背平直而闊。長肉甚多。四肘圓肥。

皮膚密生軟短之毛。足短而強。