

外科理例

四



外科理例卷

新安初門朴聖汪機省之

同邑石野門主陳楠惟宜

脫疽百九發于手足指者或足潰而月脫故名脫疽

者筋

焮痛者除濕攻毒更隔蒜灸至不痛

焮痛或不痛者隔蒜灸更用解毒藥若色黑急割去速服

補劑庶可救黑延上者不治

色赤焮痛者托裡消毒更煎灸

作渴者滋陰降火色黑者不治

一人足指患此焮痛色赤發熱隔蒜灸之更以人參敗毒

散去桔梗加金銀花白芷大黃二劑痛止又十宣散去

桔梗官桂加天花粉金銀花數劑而平此惡症也

一人年逾四十左足大指赤腫燉痛此脾經積毒下注

然名曰脫疽喜色赤而腫以人參敗毒散去人參

加金銀花白芷大黃二劑更以瓜萎金銀花甘草

劑頓退再以十宣散去桔梗桂加金銀花防已數劑愈

一人患此色紫赤不痛隔蒜灸五十餘壯尚不痛又明灸

百壯方知乃以敗毒散加金銀花白芷數劑而愈

一膏梁年逾五十亦患此色紫黑脾燉痛孫真人曰脫疽

之症急斬之去毒延腹必不治色黑不痛者亦不治喜

其飲食如故動息自寧為瘡善症遂以連翹敗毒散

六劑更以金銀花瓜萎甘草二十餘劑患指潰脫更

以芎歸生芋連翹金銀花白芷二十餘劑而愈



次年忽發渴服生津等藥愈盛用八味丸而止

不抵此症皆由膏粱厚味或房勞太過丹石補藥所致

其發于指微赤而痛可治治之不愈急斬去之庶可保

否則不治色紫黑或發于脚背亦不治或先渴而後發

或先發而後渴色紫赤不痛此精氣已竭決不可治

芻蕘左足指患一泡麻木色赤次日指黑五日連足黑

冷不知疼痛脉沉細此脾胃受毒所致進飛龍奪命丹

一服翌日令割去足上死黑肉割後骨始痛可救治以

十全大補湯而愈

此因症在肉黑知為毒盛不在于脉也

蓋死肉乃毒氣盛拒截榮氣所致況至陰之下血氣難

達經曰風淫末疾是也何若攻伐之則邪氣乘虛上侵

必不救矣

人足指患之大痛色赤而腫隔蒜灸之痛止以人參
毒散去桔梗加金銀花白芷大黃而潰更以仙方
飲而痊此憑症也

此症形勢雖小其惡甚大須隔蒜灸之不痛者宜明
之庶得少殺其毒此症因膏粱厚味酒麪炙燻積毒所
致或不慎房勞腎水枯竭或服丹石補藥故有先渴而
後患者有先患而後渴者皆腎水涸不能制火故也初
發而色黑者不治赤者水未涸尚可若失解其毒以致
肉死色黑者急斬去之緩則黑延上足必死而患不問
腫潰惟隔蒜灸有效亦有色赤作痛而自潰者元氣未
脫易治夫至陰之下血氣難到毒易腐肉藥力又不易
到況所用皆攻毒之藥未免先干腸胃又不能攻敵其



毒不若隔蒜灸并割去最為良法孫真人

云在指則

在肉則割去即此意也

一人足指患之色黑不痛令明灸三十餘壯而痛喜
如常予謂急割去之速服補劑彼不信果延上遂
一人脚背患之色黯而不腫痛煩躁大渴尺脉大而滿此
精氣已絕不治後歿

又有手指患此色黑不痛其指已死予欲斬去速服補藥
恐黑上臂不治彼不信另服敗毒藥手竟黑遂不救

一人足指患之色紫不痛隔蒜灸五十餘壯尚不知痛又
明灸百壯始痛更授仙方活命飲四劑乃以托裡藥潰
脫而愈此憑症也

一人脚背患此赤腫作痛隔蒜灸三十餘壯痛止以仙方



北京中医药大学图书馆藏

活命飲四劑而潰更以托裡消毒藥而愈 此憑症也

一入足指患之色赤焮痛作渴陽蒜灸數壯以仙方活命

飲三劑而潰更服托裡藥及加減八味丸潰脫而愈

一婦修傷次指成膿不潰焮痛至手悞敷冷藥以致通潰

飲食少思彼為毒氣內攻胗脉沉細此痛傷胃氣而然

遂刺之服六君子加藿香當歸食進更以八珍湯加黃

耆白芷桔梗月餘而愈 此憑症脉也

一人傷拇指色紫不痛服托裡藥及灸五十餘壯作痛潰

膿而愈 此憑症也

一幼女因凍傷兩足至脊發潰指俱壞令取之服大補藥

而愈 此憑症也

一女患嵌甲傷指年逾不愈日出膿數滴予謂足大指乃

脾經發源之所宜灸患處使瘀肉去臥氣至瘡口自合
否則不治彼惑之不早治後變勞症而殁

蓋至陰之下血氣難到女人患此多因北縛致血不

通或彼風邪所襲則無血氣榮養遂成死肉惟當

胃行經絡生血氣則愈有成破傷風以致牙關緊急口

眼喎邪者先玉真散一二服然後授以生血通經

面瘡百下

附願毒

一人年逾三十夏月熱病後患願毒積日不潰氣息奄奄

飲食少思大便不禁脰脉如燕經曰脉息如燕似有細

而微者臥氣衰也齊氏曰飲食不入大便滑利腸胃虛

也以六君子加炮姜肉豆寇破故紙數劑泄稍止食稍

進更加黃柏當歸肉桂漬而膿水清稀前藥每服加熟

附一錢數劑泄止食進膿漸稠再以十全大補湯

炒芍藥白

欵月餘而愈

此憑脉症也

一人年踰四十胃氣素弱面常生瘡盜汗發熱用黃耆

中湯少愈更用補中益氣湯而平

此憑症也

東垣云氣虛則腠理不密邪氣從之逆于肉理故多生

瘡若以甘溫之劑實其根本則腠理自固即無他疾

一人年三十面患瘡潰已作渴自服托裡及降火藥不應

脉浮而弱丹溪曰潰瘍作渴屬氣血俱虛遂以參耆各

二錢歸朮木各二錢數服渴止又以八珍湯加黃耆數

劑脉欵而愈

此憑脉症也

一人年四十頭面生瘡數枚焮痛飲冷積月不潰服清熱

消毒不應脉數按之即實用防風通聖散四二劑頰

一以荊防敗毒散吐而愈 此憑脉症也

一人年逾六十素食厚味頰頰患毒未潰而肉先死
無刀此胃經積毒所致然頰頰正屬胃經未潰肉死
胃氣虛極老人豈宜患此果歿經曰膏粱之變足生大
疔受如持虛此之謂也

口齒百二十

一入齒痛脉數實便秘用防風通聖散即愈 此憑脉症也

一入齒痛甚胃脉數實以承氣一劑即止 此憑脉症也

一老齒痛午後則發至晚尤甚胃脉數而實以涼膈散加

荊芥防風石膏一劑而瘳 此憑症脉也

一入齒痛胃脉數而有力以清胃散加石膏荊芥防風二

劑而痊 此憑脉症也



人齒痛脉浮無力以補中益氣湯加黃連生地黃石黃
治之不復作憑脉症也

人齒痛脉數無力用補中益氣加生芩牡丹皮而愈

人齒腫痛熈至頰頤素善飲治以清胃散數劑而愈

人齒痛服清胃散不應服涼膈散愈盛予用補腎丸四

而愈

此條因治不効而知為腎虛也

人頰頤腫熈至牙齦右關脉數此胃經風熱上攻也治

以犀角升麻湯而消此憑症脉也

婦常口舌燦爛頰赤唇乾眼澁作渴脉數按之則濡此

心肺壅熱于氣血為患名熱勞症也當多服滋陰養血

藥彼欲速効用敗毒寒劑攻之後變瘵而歿

良方云婦人熱勞者由心肺壅熱傷于氣血氣血不調

臟腑壅滯熱毒內積不得宣通之所致也其候心神煩躁煩赤頭痛眼澁唇乾四肢壯熱煩渴不止口舌生瘡神思沉昏嗜臥少寐飲食無味舉軀痠疼或時心悸或時盜汗肌膚日漸消瘦故名熱勞也

口舌瘡百二十二

一人胃弱痰盛口舌生瘡服滾痰丸愈盛吐瀉不止惡食倦怠此胃被傷也予以香砂六君子湯數劑少可再

以補中益氣加茯苓半夏二十餘劑而愈夫胃氣不足飲食不化亦能為痰補中益氣乃治痰之法也苟虛症而用峻利之藥鮮有不殆

一人年踰四十貌豐氣弱遇風則眩勞則口舌生瘡胸常有痰目常赤澁服八味丸而愈

此虛症也



一人脾胃虛初服養胃湯枳朮丸有效久服反虛口舌生
瘡勞則愈盛服敗毒藥則嘔吐此中氣虛寒也治以
中湯少愈更以補中益氣加半夏茯苓月餘而平
夫養胃湯香燥藥也若飲食停滯或寒滯中州服則燥
開脾胃宿滯消化少為近理枳朮丸消導藥也雖有白
朮終是燥劑故久服此二藥津液愈燥胃氣愈虛況胃
氣本虛而用之豈不反甚其病哉 亦有房勞過度真
陽虛憊或元稟不足不能上蒸中州不運致食不進者
以補真丸_四治之使丹田之火上蒸脾土則脾土溫和
中焦自治飲食自進經曰飲食不進胸膈痞塞或食不
消大府滯泄此皆真火不能上蒸脾土而然也若腎氣
吐則丹田之火上蒸脾土則無此病矣 一方 小兒

口瘡江茶粉草為

付之一方用黃丹

又方 苦參 黃丹

五倍子 青黛等分研為末敷

又方 青黛 芒消

為末付

胎毒口瘡 五倍子

黃丹 江茶 芒硝 甘草

為末付

又方口瘡分爲

更補細碎青黛

咽喉有二十三

疼痛或寒熱者邪在表也宜發散

腫痛痰涎壅盛者邪在上也宜降之

痛而脉數無力者屬陰虛宜滋陰降火

腫痛發熱便秘者表裡俱實也宜解表攻裡如症緊急便

刺患處或刺少商穴

一人咽痛脉數以荊防敗毒散加黃連二劑少愈乃去荊



連又六劑而愈此心脉症也

一人乳蛾腫痛脉浮此心脉症也尚未成膿針去惡血飲荊防敗毒散二劑而消此憑亡也

一人咽喉作痛痰涎壅塞予欲治以荊防敗毒散加連翹山梔玄參牛旁子以自服耳寒降火之藥反加發熱咽愈腫痛急刺少商一穴仍以前藥加麻黃汗之諸症並退惟咽間一紫泡一痛此欲作膿以前藥去麻黃一劑膿潰而愈此憑症

凡咽喉之疾治之不早或勢輕者宜荊防敗毒散以散之治之遲或勢重者宜刺少商穴瘀血已結必刺患處亦有刺少商咽雖利而未痊消者必成膿也然膿去則安若有大便秘結者經針刺去血必以防風通聖散

攻之然耳寒之劑非虛火不宜用

一婦咽喉腫痛大小便秘以防風通聖散六一劑諸症悉

退又荆防敗毒散

三劑而安

此惡症也

治此輕則荆防敗毒散吹喉散

重則用金鑰匙

吹喉

患處出血最效否則不救針少商二穴亦可但不若刺

患處之神速耳

一入咽喉腫痛脉數而實以涼隔散一劑而痛止再少荆

防敗毒散加牛蒡子二劑而腫退以荆防敗毒散二劑

又以甘桔荆防玄參牛蒡子四劑而平

一入啞癰腫痛脉浮數更沉實飲防風通聖散六一劑渴

一次勢頓退又荆防敗毒散二劑而消

此渴症脉也

一人咽喉腫秘牙關緊急針不能入先刺少商二穴出黑

血口即開更針患處飲清咽利隔散一劑而愈此憑症也
大抵吐痰針刺皆有發散之意故多効不用針刺

一入咽喉腫閉痰涎壅甚以膽礬吹咽中吐痰碗許更以清咽利隔湯四劑而安此憑症也

一入咽喉腫痛藥不能下針患處出紫血以愈以破棺丹噙之更以清咽消毒散而愈此憑症也

一入咽喉乾燥而痛以四物湯加黃柏知母玄參四劑少愈再用人參固本丸一劑不復發

一人口舌生瘡服涼藥愈甚治以理中湯此憑症也而愈此憑症也

一入咽喉痛午後益甚脉數無力以四物湯九加黃柏知母

荆防四劑而愈以前藥去荆防加玄參甘桔數劑後