

幼  
幼  
集  
成  
二

鼎錄幼幼集成卷之二

羅浮陳復正飛霞氏 輯訂

廬陵劉 勳案孟氏 校正

遂陽周宗頤盧中氏 參定

○胎病論

胎弱者

見之初生有病亦惟胎弱胎毒二者而已矣胎弱者稟受於氣之不足也子於父母一體而分而稟受不可不察如稟肺氣爲皮毛肺氣不足則皮薄怯寒毛髮不生稟心氣爲血脈心氣不足則血不華色面無光彩受脾氣爲肉脾氣不足則肌肉不生手足如削受肝氣爲筋肝氣不足則筋不束骨機關不利受腎氣爲骨腎氣不足則骨節軟弱久不能行此皆胎稟之病隨其臟氣而求之所謂父強母弱生女必羸父弱母強生兒必弱故小兒有頭破顱解神慢氣怯項軟頭傾手足痿軟齒生不

# 胎毒者

齊髮生不黑行住坐立須人扶掖者此皆胎稟不足之故也

胎毒者即父母命門相火之毒也命門者男子以藏精女子以繫胞道家謂之下丹田也夫二五之精妙合而凝質純粹之精銘液而成胎淫侏之火蓄之則爲胎毒矣蓋人生而靜天之道也感物而動人之欲也成胎之後其母之閑係尤繁凡思慮火起於心恚怒火生於肝悲哀火鬱於肺甘肥火積於脾淫縱火發於腎五欲之火隱於母胞遂結爲胎毒凡胎毒之發如蟲癢流丹淫瘡癰瘤結核重舌木舌鵝口口瘡與夫胎熱胎寒胎搐胎黃之類是也若夫七日之臍風百日之痰嗽半歲之真搐一週之流丹此又毒之至酷至烈而不可解者

胎寒者母娠時患熱病多服寒涼之藥又或過食生冷令兒受之生後昏昏多睡間或吮乳瀉白此內因也或百日之內忽病戰慄口冷手足跪

# 胎寒者

# 胎熱者

出不伸腹痛啼叫不止此生後受寒得之治宜溫散指迷七氣湯助胃  
膏爲佳

胎熱者母娠時曾食辛熱炙燂之物或患熱病失於清解使兒受之生後  
目閉面赤眼胞浮腫弩身呢呢作聲或啼叫驚煩遍身壯熱小便黃澀  
此熱也若不早治則丹瘤瘡癰由此而生宜集成沆瀣丹徐服解之以  
平爲度

# 胎搐者 名胎癇 證

胎搐者母娠時曾因驚恐氣傳於此生後頻頻作搐其後身熱面青手足  
搐掣牙關緊閉腰直身僵睛邪目閉多啼不乳此乃胎癇不治之證如  
因身有熱而作者必先啼叫雖曰胎病由外因也宜天麻丸後以六味  
地黃湯滋其化源久服自愈

盤腸氣者幼科稱內吊者是也皆因胎氣鬱積壅結榮衛五臟六腑無一

舒暢其氣不能外降築隘腸胃之間抵心而痛其聲輾轉如貓吐惡乾  
啼口開手足皆冷宜疎氣通氣調中散及木香丸

臍突者小兒多啼所致也臍之下爲氣海啼哭不止則觸動氣海氣動於  
中則臍突於外其狀突出光浮如吹起看提之則微有聲用亂髮燒灰  
枯凡等分爲細末敷突臍上以膏藥貼之自消

不乳者小兒生下二三日間忽然不乳當調問之勿以不乳作臍風治蓋  
臍風有多啼撮口之證此則無之但不乳耳有吐乳乳之又吐者或因  
拭口不淨惡穢入腹也宜用枳櫛木香甘草煎湯與服如啼哭不乳者  
腹痛也亦胎寒之證宜木香丁香乳香當歸甘草煎湯與服如無已上  
諸證無故不乳宜問其母之乳汁多少乳多者傷乳也宜少節之不久  
自思乳矣乳少者必有他證細心察之

胎黃者兒生下面曰渾身皆黃如金色或目閉身上壯熱大便不通小便如梔子汁皮膚生瘡不思乳食啼哭不止此胎中受淫熱也宜茵陳地黃湯母子同服以黃退爲度

胎肥者兒生下遍身肌厚肉色通紅面色亦紅而黑睛多時時生痰白滿月以後漸漸肌瘦五心熱而大便難白精粉紅色此名胎肥是亦在胎時母食甘肥淫熱太過流入胎中以致形質虛肥血分壅熱也加減大連翹飲外以浴依法浴之

胎怯者生下面無精光肌肉瘦薄大便白而身無血色目無精彩時時哽氣多噦者此卽胎怯也非盲於父母之暮年卽生於產多之孕婦成胎之際元精既已澆漓受胎之後氣血復難長養以致生來怯弱若後天調理得宜者十可保全一二調元散助之

〇入方

括述七氣湯

一切腹痛寒熱多啼不乳等證皆由陰陽不升降氣道壅塞而然並宜此方凡人身內之氣呼吸出入無刻不與天道陰陽之氣通故六淫外襲則感而致病一定之理也內氣閉塞則天道不通升者不升降者不降寒熱由此而生也是方疎利臟腑神化無方最宜領會

廣陳皮

杭青皮

藿香葉

茅結梗

蓬莪朮

香附子

法半夏

上肉桂

公丁香

益智仁

老生薑

大紅棗

炙甘草

右咬咀水二碗煎至一碗母子同服

助胃膏

治胎寒內釣胃氣虛弱胸脇脹滿嘔乳便毒

白豆蔻

肉豆蔻

麵包炒  
去油

官揀參

廣木香

各兩  
五錢

公丁香

三

藿香葉 雲茯苓 漂白朮<sup>上</sup> 真青桂 西砂仁 炙甘草

各一廣陳皮<sup>二錢</sup> 洋沉香<sup>二錢</sup> 淮山藥<sup>二兩</sup>

爲末蜜丸芡實大每一丸炒米湯化服

集成沆瀣丹

音九械北斗夜半所降之甘露也

治小兒一切胎毒胎熱胎黃面赤目閉

驚口口瘡重舌木舌喉閉乳蛾渾身壯熱小便黃赤大便閉結麻疹斑

療透風癰疥流丹癰疹痰食風熱疳腮面腫上種火丹諸般風搐神效

此方古書未載得之異授微似古之神方左近有能者妙出化裁而增

損之遂爲幼科有一無二之神方作三焦之主治蓋大臟氣流通者必

不鬱滯或受毒於胎前或感邪於誕後遂爾中氣抑鬱則見以前諸證

方內所有黃芩清上焦之熱大黃清中焦之熱又藉其有推陳致新之

功黃柏清下焦之熱能活血除煩力能導三焦鬱火從魄門而出猶慮

苦寒凝膩復加檳榔枳殼之辛散為行氣利痰之佐使川芎薄荷引頭  
面風熱從高而下榴連翹解毒除煩赤芍調榮活血牽牛利水走氣分  
而舒鬱滑石清潤邪陽火而扶陰又能引邪熱從小便而出用治以前  
有餘諸證應如桴鼓予生平最慎攻伐惟此方用之最久功效莫能殫  
述真濟世之良方也

杭川芎

九錢酒洗

錦莊黃

九錢酒蒸

寶黃芩

九錢酒炒

厚黃柏

九錢酒炒

黑牽牛

炒取頭末六錢

薄荷葉

四錢五分

粉滑石

六錢水飛

尖檳榔

七錢五分童便洗晒

陳枳殼

四錢五分麵炒

淨連翹

除土心隔取淨六錢

京赤芍

六錢炒

右十味依方炮製和勻焙燥研極細末煉蜜為丸如芡實大月內之兒

每服一九稍大者二九俱用茶湯化服乳母切忌油膩但覺微有泄瀉  
則藥力行滿即減矣如不泄再服之重病每日三服以愈為度此方斷

不峻厲。母疑畏。惟胎寒。胎怯。而青白者。忌之。

六麻丸 治胎搖先以此丸通其經絡。次服地黃丸。

明天麻 製法半夏 北防風 川羌活 牛膽星 直殭蠶

北全蝎 各五錢 爲末。蜜丸。芡實大。每一丸。鈎藤湯下。

六味地黃丸 卽仲景所製金匱地黃丸。原治腎水虧。遺小便淋瀝。頭目

眩暈。腰腿酸軟。陰虛發熱。自汗盜汗。憔悴瘦弱。精神困壯。水之主。以

制陽光。此方是也。○錢仲陽以之治小兒胎怯。稟受先天不足。併肝疳。

白膜遮睛。瀉血失音。身瘦瘡疥。腎怯語遲。解顛行遲等證。○薛立齋又

以治小兒肝經血虛。燥熱。腎經虛熱。作渴。小便便秘。痰氣上壅。或風淫。

客氣瘰。結核。或四肢搖擗。眼目瞶。純動。或欬血吐血。頭目眩暈。或咽。

喉燥痛。口舌生瘡。或稟腎不足。解顛失音。五遲五軟。腎疳。肝疳。腎肝。

不足之證皆宜用此以滋化源其功不能盡述予按錢薛二翁能用此方治小兒先天不足誠卓然有識者予所敬佩察今之小兒體質元氣更不及前古以地黃丸為補劑今則實為涼劑矣此藥用於陰虛枯燥者誠為得宜倘兒肌肥面白脾弱多痰者服此必致膩膈變生他證其害不小非方之不良也今稟受愈薄也予故為之斟酌其炮製必使地黃陰疑之質稍近陽和不致沉寒近診始能免膩膈損脾之患矣

大懷地

四兩以西砂仁一兩不必題碎生

二兩切片絳一

方入好酒煮二晝夜以地黃煎爛為

白雲苓

二兩乳

懷山藥

度取起其袋不用以地黃搗膏聽候

三兩乳

淨棗皮

二兩

粉丹皮

酒炒宜澤瀉

右依炮製和勻一處焙燥研為細末和前地黃膏少加煉蜜

石臼內勻重錢半一頓半週一歲者每用一九三五歲者

二凡俱空腹鹽湯化下倘凡一時未備卽以前藥十分之一但宜炮製不可生用水煎服之名六味地黃湯功效茲更捷

治嬰孩盤腸氣腹內築痛

青木香 川練子 暗沒藥 白雲苓 上青桂

枳青皮 萊菔子 陳枳殼 尖檳榔 炙甘艸

等分入葱白二寸鹽一錢水煎空心服

茵陳地黃湯 治小兒初誕面與渾身甚黃如金胎中受溼熱也 懷生地

京赤芍 正川芎 大當歸 天花粉 赤茯苓 結豬苓 茵陳藁

宜澤瀉 諸藥隨時定分兩水煎母子同服

大連翹飲 治胎肥解熱毒

浮連翹 瞿麥穗 白滑石 牛旁子 車前子 川木通

北防風 炒梔子 片黃芩 荆芥穗 大當歸 北柴胡

京赤芍 淨蟬蛻 炙甘草 竹葉十片 燈心十莖 水煎熱服

浴體法 治胎肥

明天麻二錢 淨全蝎去毒 箭硃砂各五分 烏蛇肉洗 枯白礬

洋青黛各三錢 真麝香分 共研勻 每用三錢水三碗 桃枝一握同煎

十沸溫熱浴之 但勿浴背

調元散 治胎怯

揀人參 漂白朮 白茯苓 化橘紅 大當歸 甘枸杞

炙甘草各二錢 陳粳米三合 為末 每服二三錢 龍眼煎湯調下

八味地黃丸 治稟受先天不足 即前六味地黃丸加青桂桂一兩熟

川附一兩 治稟賦命門火衰凡幽遲語遲行遲顙門開大腎疳等證

火衰不能生土以致脾土虛寒不思乳食臍腹疼痛夜多漩瀾皆稟先天不足自晬周時卽有虛病腎病能自幼填補亦多可復此方用水煎名八味地黃湯經曰益火之源以消陰翳之謂乳母肥白者母子同服

○驚風闕妄

喻嘉言曰驚風 門占人鑒空妄談後世之小兒受其害者不知千百億

兆蓋小兒初生陰氣未足性稟純陽身內易致生熱熱盛則生風生痰亦所恒有乃以驚風命名隨有八候之目夫小兒腠理不密更易感冒寒邪寒邪中人必先入太陽經太陽之脈起於目內背上額交巔還出別下項夾脊抵腰中是以病則無脈牽強遂有抽搐種種不通名目妄用金石腦麝開闢鎮隊之藥引邪深入臟腑千中千死徒據小兒八歲以前無傷寒之說而立驚風一門殊不知小兒不耐傷寒故初傳

太陽一經早已身強多汗筋脈牽強人事昏沉病勢已極湯藥妄投危亡接踵何由得至傳經解散哉故言小兒無傷寒也不知小兒易於外感惟傷寒爲獨多而世之妄稱驚風者卽此也是以小兒傷寒要在三日內卽愈者爲貴若至傳經則無力耐之矣且傷寒門中剛瘧無汗梲瘧有汗小兒剛瘧少梲瘧多世俗見其汗出不止神昏不醒便以慢驚爲名妄用參耆朮附閉塞腠理熱邪不得外越亦爲大害但比金石差減耳所以凡治小兒之熱切須審其本元虛實察其外邪重輕或陰或陽或表或裏但當徹其外邪出表不當固邪入裏也仲景原有桂枝湯舍而不用徒事驚風毫釐千里害豈勝言哉

又曰小兒體脆神怯不耐外感壯熱多成瘧病後世多以驚風立名有西證八候之鑿說實則指瘧病之顛搖手動者爲驚風之抽掣指瘧病之

卒曰際此驚風之急者爲驚風之搖擗指痙病之背反張者爲驚風之角弓反張幼科翁然宗之病家坦然任之不治外淫之邪反投金石腦癆之藥于中于死而不悟也

又曰凡治小兒痙病妄稱驚風色色輕用鎮慄之藥者立殺其兒此通國所當共禁者也蓋小兒不耐傷寒壯熱易致昏沉卽於其前放銃吶喊有所不知妄捏驚風輕施鎮墜勾引外邪深入內臟千中千死從未有  
一救者通國不爲厲禁寧有底止哉

又曰婦人產後血舍空虛外風易入仲景謂新產亡血虛多汗出喜中風故今痙後賢各從血舍驅風成法可遵非甚不肖者不妄用鎮驚之藥不似小兒驚風之名貽害千古在賢智且不免焉茲約通國共爲厲禁革除驚風二字不許出口入耳凡兒病發熱昏沉務擇傷寒名家循

經救治自不失一於以打破小兒人鬼關天人共快也

瘧瘵上聲風強病也

前爲喻先生闢除驚風指明病瘵之說誠善矣第驚風之名誤傳既久沉迷者眾倘不爲之剖晰詳明指出證候治療俾臨證者有所依歸則後人何能深信予不辭狂瞽請爲詳晰申明之蓋病瘵非止一端男婦皆有特小兒爲然也如太陽過汗變瘵風病誤下變瘵瘡家誤汗變瘵產後汗多遇風變瘵跌撲破傷當風變瘵風病誤下風寒變瘵一切去血過多變瘵然男婦病此医者皆從太陽厥陰循經救治未聞以驚風之治治瘵者無如小兒病瘵獨以驚風爲而治者由宋人之訛傳也一人倡之遂羣起而和之然亦無師之智各爲臆說愈趨愈下遂致於離經叛道乃有黃帝不知幼小之妄談殊不知內經通平虛實論有乳子病熱乳子病風熱脈證之辨刺論有嬰兒肉脆血少氣弱毫鍼之傳經