

肝臟方 凡五類

肝臟脈論第一 論二首

論曰夫人稟天地而生故內有五臟六腑精氣骨髓筋脈外有四肢九竅皮毛爪齒咽喉唇舌肛門胞囊以此總而成軀故將息得理則百脈安和役用非宜即為五勞七傷六極之患有方可救雖病無也無法可憑奄然永往所以此之中秩卷卷備述五臟六腑等血脈根源循環流注與九竅應會處所并論五臟六腑等輕重大小長短濶狹受盛多少仍列對治方法丸散酒煎湯膏摩熨及針灸孔穴並窮於此矣其能留心於醫術者可攷而行之其冷熱虛實風氣準藥性而用之則內外百病無所逃矣凡五臟在天為五星在地為五嶽約時為五行在人為五臟五臟者精神魂魄意也論陰陽察虛實知病源用補瀉應稟三百六十五節終會通十二經焉論曰肝主魄為郎官隨神往來謂之魂魄者肝之藏也目者肝之官肝氣通於目目和則能辨五色矣左目甲右目乙循環紫宮榮華於爪外主筋內主血肝重四肋四兩左三葉右四葉凡七葉有六童子三玉女守之神名藍藍主藏魂號為魂藏隨節應會故云肝藏血舍魂在氣為語在液為淚肝氣虛則恐寔則怒肝氣虛則夢見苑囿生草得其時夢伏樹下不敢起肝氣盛則夢怒厥氣客於肝則夢山林樹木凡人卧則血歸於肝肝受血而能視足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝凡肝臟象木與膽合為腑其經足厥陰與少陽為表裏其脈弦相於冬王於春春時萬物始生其氣來濡而弱寬而虛故脈為弦濡即不可發汗弱則不可下寬者開閉者通通者利故名曰寬而虛春脈如弦春脈肝也東方木也萬物之所以始生也故其氣來濡弱輕虛而滑端直以長故曰弦反此者病何如而反其氣來寔而弦此謂太過病在外其氣來不寔而微此謂不及病在內太過則令人善忘忘當忽忽眩冒而癲疾不及則令人胸痛引背兩脇胠滿肝脈來濡弱招招如揭竿末梢曰平源

作絃
之弦
如揭長竿

瑟

春以胃氣為本肝脈來盈實而滑如循長竿曰肝病肝脈來急而益勁如新張弓弦曰

肝死

真肝脈至內外急如循刀刃責責然巢源作如如按琴瑟弦巢源作如新張弓弦

胃微弦曰平弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死胃而有毛曰秋病毛甚曰今病

春

肝藏血血舍魂悲哀動

中則傷魂魄傷則狂妄其精不守一作狂妄不精不敢正當人

今人

陰縮而攣筋兩脅肋骨舉

不舉毛悴色天死於秋

足厥陰氣絕則筋縮引卵與舌厥陰者肝脈也肝者筋之合也筋者聚於陰器而脈絡於舌本故脈弗

營則筋縮急筋縮急則引卵與舌故唇青舌卷卵縮則筋先死庚篤辛死金勝木也

肝死

藏浮之弱按

之中如索不來或曲如蛇行者死春肝木王其脈弦細而長曰平反得沉濡而滑者是腎之乘肝母之

歸子為虛邪雖病易治反得浮大而洪者是心之乘肝子之乘母為寔邪雖病自愈反得微澀而短干

金

微浮而者是肺之乘肝金之魁木為賊邪大逆十死不治反得大而緩者是脾之乘肝土之陵木為微邪

短澀

雖病即瘥心乘肝必吐利肺乘肝即為癰腫

左手關上陰絕者無肝脈也苦癰遺溺難言脇下有邪氣

善吐刺足少陽治陽左手關上陰實者肝實也苦肉中痛動善轉筋吐刺足厥陰治陰

肝脈來濯濯

如倚竿如琴瑟弦再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡足厥陰脈也

肝脈急甚為惡

言一作妄微急為浮氣在脇下如覆杯緩甚為嘔微緩為水瘕痺大甚為內癰善嘔衄微大為肝痺縮咳引

少腹小甚為多飲微小為消痺滑甚為頸疝微滑為遺溺澀甚為淡飲微澀為瘻飛筋攣

肝脈搏堅而

長色不青當病墜若搏因血在脇下令人喘逆其濡散色澤者當病溢飲溢者渴暴多飲而溢入肌膚

痛足冷頭痛

扁鵲曰肝有病則目聶精虛則寒寒則陰氣壯壯則夢山樹等寔則熱熱則陽氣壯壯則

夢怒

肝在聲為呼在變動為握在志為怒怒傷肝精氣並於肝則憂肝虛則恐寔則怒怒而不已亦生

憂矣

色主春病變於色者取之榮

病先發於肝者頭目眩脹痛支滿一日之脾閉塞不通身痛體重

二日之胃而腹脹三日之腎小腹腰脊痛脹瘦十日不已死冬日入夏早食

病在肝

病在肝

不者若感金銀物得之 凡肝病之狀必兩脇下痛引少腹令人善怒虛則目眩瞤無所見耳無所聞善而急浮之亦然苦脇痛有氣支滿引少腹痛時小便難苦目眩頭痛腰背痛足為寒時癰女人月事不來時無時有得之少年有所墮墮 肝病其色青手足拘急脇下苦滿或時眩冒其目弦長此為可治宜服防風竹瀝湯秦艽散春當刺大敦夏刺行間冬刺曲泉皆補之季夏刺太衝秋刺中都皆瀉之又當灸期門百壯背第九椎五十壯 邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內腑善瘻節時腫取之行間以引脇下補三里以溫胃中取血脉以散惡血取耳間青脈以去其瘻 凡有所墮墮惡血留內若有所大怒氣上而不能下積於左脇下則傷肝 肝中風者頭目瞤兩脇痛行常僵令人嗜甘如阻婦狀 肝中寒者其人洗洗惡寒翕翕發熱面翕然赤熱熱有汗胸中煩熱 肝中寒者其人兩臂不舉舌本又作大燥善太息胸中痛不得轉側時盜汗咳食已吐其汁 肝主胸中喘怒罵其脈沉胸中必窒欲令人推按之有熱鼻室肝傷其人脫肉又臥口欲得張時時手足青目瞑瞳人痛此為肝臟傷所致也 肝水者其人腹大不能自轉側而脇下腹中痛時時津液微生小便續通 肝脈者脇下滿而痛引少腹 肝著其病人常欲蹠其胸上先未苦時俱欲飲熱 診得肝積脈弦而細兩脇下痛邪氣走心下足胫寒脇痛引少腹男子積疝女子瘕淋身無膏澤善轉筋爪甲枯黑春秋劇秋劇色青也 肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足如龜鱉狀久久不愈發咳逆瘡瘍連歲月不已以季夏戊己日得之何也肺病傳肝肝當傳脾脾適以季夏王王者不受邪肝復欲還肺肺不肯受因留結為積故知肥氣以季夏得之 肝病胸滿脇脈善恚怒叫呼身體有熱而復惡寒四肢不舉面白身體滑其脈當弦長而急今反短澀其色當青而反白者此是金之剋木為大逆十死不治 裏公問扁鵲曰吾欲不診脈察其音觀其色知其病生死可得聞乎答曰乃聖道之大要師所不傳黃帝貴之過於金玉入門見病觀其色聞其呼吸則知往來出入吉凶之

相角音人者主肝聲也肝聲呼其音琴其志怒其經足厥陰厥逆少陽則營衛不通陰陽交雜陰氣外傷陽氣內擊擊則寒寒則虛虛則卒然暗啞不聲此為厲風入肝續命湯主之方見第十八卷中但踞坐不得低頭面青黑四肢緩弱遺失便利甚則不可治賒則旬月之內桂枝酒主之方見第十八卷中又呼而哭哭而反吟此為金冠木陰擊陽陰氣起而陽氣伏伏則寃寃則熟熟則喘喘則逆逆則悶悶則恐畏目視不明語聲切急謬說有人比為邪熱傷肝甚則不可治若唇色雖青向眼不應可治地黃煎主之方見下肝虛寃篇中肝病為瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死者烏梅丸主之方見第十八卷中若其人本來少於悲恚忽爾嗔怒出言反常乍寬乍急言未竟以手向眼如有所畏若不即病禍必至矣此肝病聲之候也若其人虛則為寒風所傷若寃則為熱氣所損陽則潤之陰則補之青為肝肝合筋青如翠羽者吉肝主目目是肝之餘其人木形相比於上角蒼色小頭長面大肩平背直身小手足有材好勢心少力多憂勞於事耐春夏不耐秋冬秋冬感而生病足厥陰他他然脇廣合堅脰傾正則肝應之正青色小理者則肝小小則藏安無脇下之病粗理者則肝大大則虛虛則寒逼胃迫咽善膈中且脇下痛廣脅反駁者則肝高高則實實則肝熱上支責加脇下急為息責合脅危一作駁者則肝下下則逼胃脅下空空則易受邪脅骨堅者則肝堅堅則臟安難傷脇骨弱者則肝脫脫則善病消癥易傷脇腹好相者則肝端正端正則和利難傷脇骨偏舉者則肝偏傾偏傾則脇下偏痛凡人分部陷起者必有病生膽少陽為肝之部而藏氣通於內外部亦隨而應之沉濁為內浮清為外若色從外走內者病從外生部處起若色從內出外者病從內生部處隔內病前治陰後治陽外病前治陽後治陰陽主外陰主內凡人死生休否則藏神前變形於外人肝前病目則為之無色若肝前死目則為之脫精若天中等分墓色應之必死不治看應增損斟酌賒促賒則不出四百日八日死何以知之面青目赤但欲伏眠目視而不見人汗出如水不止一日二日死面黑目青者不死青如草滋見吉凶之色在从分部順順而見青白八日必病不出其年若年上不應三年之中風必患也

不能深入故而然脈分肉之間其脈根本並在竅陰之階應在督筋之前當筋者正首一月三才之
動者是也 其筋起於小指次指之上結外踝上循脛外廉結於膝外廉其支者別起於外輔骨上走髀
前者結伏兔之上後者結於尻其直者上脅乘季脇上走腋前廉俠於膺乳結於缺盆直者上山拔貫缺
盆出太陽之前循耳後上額角交顴上下走頸上結於軀其支者結於目外皆為外維 其脈起於目銳
皆上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上却交出手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出
走耳前至銳皆後其支者別銳皆下大迎合手少陽於頤下加頰車下頸合缺盆以下胸中貫膈絡肝屬
膽循脇裏出氣街繞毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胸過季脇下合髀厭中以下循髀陽出膝
外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上出小指次指之端其支者別跗上入大
指之間循大指歧內出其端還貫入爪甲出三毛合足厥陰為表裏厥陰之本在行間上五寸應在背腧
同會於手太陰 其足少陽之別名曰光明去踝半寸是也別走厥陰下絡足跗主肝生病實則膽熱
熱則厥厥則陽病陽脈反逆大於寸口一倍病則胸中有熱心脢頭領痛缺盆腋下腫虛則膽寒寒則痿
蹙蹙則陰病陰脈反小於寸口病則胸中有寒少氣口苦身體無膏澤外至脣絕骨外踝前及諸節皆痛
若陰陽俱靜與其俱動如引繩俱頓者病也此盡是足少陽胆經筋脈支別為病今取足厥陰肝經附於後 足厥陰之脈起於大指叢
毛之際上循足跗上廉去內踝一寸上踝八十交出太陰之後上脰內廉循股陰入毛中環陰器抵小腹
俠胃屬肝絡膽上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頤頰連目系上出額與督脈會於顱一本云其支者從
結於腰牒下第三四骨空中其支者從目系下頰裏環脣內其支者復從肝別貫膈上注肺中是動則病腰痛不可以
俛仰大夫頽疝婦人小腹腫甚則嗌乾面塵脫色是主肝所生病者胸滿嘔逆洞泄狐疝遺溺閉癃盛者
則寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也 足厥陰之別名曰蠡溝去內踝上五寸別走少陽
其別者循經上罩結於莖其病氣逆則罩腫卒疝寢則挺長熱虛則暴癢取之所別足厥陰之筋起於大

指之上上結於內踝之前上循脈上結內輔之上下循陰股結於陰器結絡諸筋。春三月者主肝膽青筋牽病也。其源從少陰而涉足少陽少陽之氣始發少陰之氣始衰陰陽鬱鬱於膝理皮毛之病俱生表裏之病因起從少陽發動反少陰氣則臟腑受屬而生其病相反若腑虛則為陰邪所傷腰背強急脚縮不伸脈中欲折目中生花若臟實則為陽毒所損澀澀前寒而後熱頸外雙筋牽不得屈伸頸直背強眼赤黃若欲轉動合身回側故曰青筋牽病卷傷寒門扁鵲曰炎肝肺二腑主治丹毒牽病當依源處治調其陽理其陰臟腑之疾不生矣

肝虛實第

脈四條方十一首

肝實熱 左手關上脈陰實者足厥陰經也病苦心下堅滿常兩脇痛息忿忿如怒狀名曰肝實熱也

竹瀝泄熱湯

治肝實熱陽氣伏邪熱喘逆悶恐目視物無明狂悖非意而言者方

竹瀝

一升

麻黃

咀以水九升煮取二升半去滓下竹瀝煮兩三沸分三服須利下

芒硝

三分

方無石膏生薑芍藥生葛用人參三分

衍義

喘逆狂悶明是木邪無畏反侮肺金之象方用竹瀝潤火清痰為主兼以麻黃升麻開泄肺滿於上大青引領知母石膏等味降泄肝實於下可謂峻矣設亢極不能即應須加芒硝以潤下之芍藥益氣不若地黃之滋血故易之

前胡湯

治肝實熱目痛胸滿氣急塞濶肝方

前胡

芒硝

秦皮

梔子仁

決明子

黃芩

升

麻

桂仁

細辛

各三

苦竹葉切車前葉切各一升

右十一味㕮咀以水九升煮取三升去滓下芒硝分

三服

一方有柴胡三兩

衍義

肝熱而見胸滿氣急火邪內蘊之兆火性上炎而害空竅所以目痛故用前胡決明桂仁專祛

肝實之風升麻細辛黃芩開發上盛之熱苦硝危子苦附

卷耳根世內溫之火

葛根生薑芍藥

生葛用人參三分

防風散 治肝實熱夢寐驚方

射干各一升 麻黃芩各一兩半 大棗三七酸棗仁三分

右十三味治下篩為粗散以兩方十七梟裹

以井花水二升煮時時動上裏子煎取一升分服日二

行義

夢中恚怒醒則虛驚熱並於肝而膽氣餒怯也夫木邪勢盛必致凌虐脾土土受木乘亦令善驚故用防風補膽射干瀉肝酸棗姜旋丹參平調肝膽血氣細辛升麻黃芩開發少陽風熱芩木橘甘大棗培護中土土寔則肝氣受陰不致木槁火炎則夢寐安寧可無驚怒之患君以防風非獨補膽補肝藥中亦須用以土中瀉木可無土敗木乘之患

遠志散

治肝邪熱出言反常乍寬乍急方

遠志

射干 杏仁 大青各一兩半

茯神

麥門冬

萬根

甘艸

各一兩

芍藥

三分

桂心

三分

知母

升麻各五

石膏二兩

右十三味

治下篩

為粗散

以水二升

五合煮

竹葉一升

取汁內藥

七半煎

取八合爲

一服

日一以綿裹散煮之

行義

山言反常木邪肆虐擾亂神明君主不能為政也方用遠志茯神麥門冬利竅安神滋培心氣升麻葛根杏仁開泄於上大青射干芍藥甘草知母石膏降泄於下清潤藥中得桂心之辛溫以開泄

木邪之去路也

地黃煎

治邪熱傷肝好生悲怒所作不定自驚恐方

生地黃

淡竹葉

生薑

車前草

乾藍

各切

升赤蜜

一升

丹參

元參各四

茯苓二兩

石膏五兩

右十味

㕮咀

以水九升

煮取三升

去滓停冷下

蜜更煎三兩沸分三服

行義

此言邪熱傷肝內藏津液雖為熱邪所耗而虛陽散漫或時擾肝則怒迫肺則悲薄膽則驚犯腎則恐以火無常性乘虛隨入諸經鄰壑為墟少陰尤為切近所以專取地黃兼滋肝腎真陰乾藍引領淡竹葉車前等味降泄諸經游火又須生薑赤蜜辛甘滋化肺氣不使虛陽留宿於上然蜜有赤白

之分白者補而赤者瀉兩不移易之定法

肝膽俱實 左手關上脈陰陽俱實者足厥陰與少陽經俱實也病苦胃脹嘔逆食不消名曰肝膽俱實也
肝虛寒 左手關上脈陰虛者足厥陰經也病苦脇下堅寒熱腹滿不欲飲食腹脹悒悒不樂婦人月經不利腰腹痛名曰肝虛寒也

補肝湯

治肝氣不足兩脇下滿筋急不得太息四肢厥冷發搶心腹痛目不明了及婦人心痛乳癰膝

熱消渴爪甲枯口面青者方

山茱萸

烏頭作甘草

桂心

兩翼作桃仁

柏子仁

細辛

茯苓

防風

各二兩

大棗

四十枚

右九味㕮咀以水九升煮取五升去滓分三服

行義

肝為風木之藏動則生火靜則生風動者實而靜者虛也

山萸桂心專補肝虛下脫防風細辛柏仁車散虛風內動然非山萸不能斂固於下非桂心不能鼓運於中故欲杜虛風須培強土苓甘大

棗意在培土尤賴防風桂心之風力運動則土膏發育木澤敷榮桃仁一味協濟桂心流通血脉調適婦人經候之要著也

補肝散

治左脇偏痛久宿食不消并目眩昏風淚出見物不審而逆風寒偏甚消食破氣止淚方

山茱萸 桂心 薯蕷 天雄 茯苓 人參

各五分

芎藭

白朮 獨活

五加皮 大黃

各七分

橘皮

三分防風

乾薑

丹參 厚朴

細辛 桔梗

各一兩半

甘草

乾菊花

一兩貰根半兩

陳麥麴

大麥

各一升

右二十三味治下篩酒服方寸匕日一若食不消食後服若止痛食前服

衍義

前補肝湯所主肝虛本病此補肝散所主木乘土衰故於萸桂天雄等補肝藥中參入大黃厚

朴貢以泄內蘊之滯人參白朮茯苓以補內虧之氣乾薑芎藭五加以溫內阻之血防風細辛獨活乾菊以化內虛之風其餘薯蕷丹參桔梗橘皮甘草麵蘖隨補瀉以為佐使耳

松膏酒

治肝虛寒或高風眼淚等雜病方

以松脂十兩細剉以水淹浸一周日煮之細細接取上膏

衍義

松脂堅勁而善祛風肝虛風濕內襲故用其膏釀酒以祛宿昔之風高風眼淚非肝風內蘊之

驗子

枸杞酒

治同前 枸杞子一斗搗碎內絹袋中酒二斗漬訖密封泥甕勿洩曝乾天陰勿出三七日滿

且溫酒任性飲之忌酢

衍義

枸杞酒方下主治同前然松膏燥濕枸杞潤血補肝之用雖同潤燥之性迥別

防風煎

治肝虛寒目眩視物不明諦視生花補方 防風 細辛 茵羈 獨活 白鮮皮 甘草

各三兩

橘皮 二兩 大棗 三七 甘竹葉 切一蜜 升合

右十味㕮咀以水一斗六升先煮九味取四升去滓

下蜜更煎兩沸分四服日三夜一若五六月以燥器貯冷水藏之

衍義

肝氣下襲於腎上擾水輪所以眩視物不明諦視生花防風白鮮甘竹上散頭目諸風細辛

獨活芎藭下通腎肝之結甘草橘皮蜂蜜大棗培土以禦木邪之下陷也

檳榔湯

治肝虛寒脇下痛脹滿氣急目昏濁視物不明方 檳榔 二十枚附子 母薑 七兩 茶荅 咸 橘皮

桂心 各三兩

桔梗 白朮 各四兩 吴茱萸 五兩 右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓溫服每服一升

若氣喘者加芎藭三兩半夏四兩甘草二兩

衍義

一派溫補肝脾藥中獨用檳榔以破脇滿氣急則桂附薑萸芩茶荅力祛中外虛寒而無旺

氣扼腕之患矣

治肝虛目不明方

炙肝膾二百壯小兒斟酌可炙一二七壯

肝膽俱虛

左手關上脈陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也病若恍惚戶厥不知人妄見少氣不能

言時時自驚名曰肝膽俱虛也

肝勞第三論

一首 方二首

論曰肝勞病者補心氣以益之心王則感於肝矣人逆春氣則足少陽不生而肝氣內變順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂關格病則生矣

猪膏酒 治肝勞虛寒關格閉塞不通毛悴色天方 猪膏 薑汁各二 右二味以微火煎取三升酒

五金和煎分為三服食

衍義 肝為藏血藏津之地肝氣過勞則血槁津枯關格之病生矣猪膏甘潤滋津生薑辛溫化氣使津液流布而關格通矣

虎骨酒

治肝虛寒勞損口苦關節骨疼痛筋攣縮煩悶方 虎骨

一升炙熟碎如雀頭丹參八兩

乾地黃七兩

骨皮

乾薑 芒硝各四兩

豬椒根

五加皮

白朮

枳實

各五兩

右十味㕮咀絹袋盛以酒四斗浸

四日初服六七合漸加至一升日再

衍義

肝主筋骨主骨肝勞而至筋攣骨疼風寒在下口苦煩悶風熱在上也虎骨猪椒芒硝內搜筋

骨之風

乾薑白朮五加下追關節之痛地黃地骨上清煩擾之熱枳實丹參中散瘀滯之血也

筋極第四

論二首 方七首
又法七首

論曰夫六極者天氣通於肺地氣通於嗌風氣應於肝雷氣動於心穀氣感於脾餽谷雨氣潤於腎六經為川腸胃為海九竅為水注之氣所以竅應於五臟五臟邪傷則六腑生極故曰五臟六極也論曰凡筋極者主肝也肝應筋筋與肝合肝有病從筋生又曰以春遇病為筋痺筋痺不已復感於邪內舍於肝則陽氣入於內陰氣出於外若陰氣外出則虛虛則筋虛筋虛則善悲色青蒼白見於目下若傷寒則筋不能動十指爪皆痛數好轉筋其源以春甲乙日得之傷風風在筋為肝虛風也若陽氣內發發則實實則筋實筋實則善怒嗌乾傷熱則咳咳則脇下痛不能轉側又脚下滿痛故曰肝實風也然則因其輕而揚之因其重而減之因其衰而彰之審其陰陽以別柔剛陽病治陰陰病治陽善治病者病在皮毛

橘皮通氣湯 治筋實極則咳嗽則兩脇下縮痛痛甚則不能轉動方

橘皮 四兩 白朮 石膏 兩

細辛

當歸 桂心 蔴苓各兩 香豉一升 右八味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

行義

肝傷筋極而復傷熱則咳嗽則脇下痛故用橘皮細辛以治咳香豉石膏以化熱桂心當歸以調肝白朮茯苓以實脾脾實則肝邪不能肆虐矣

丹參散 治筋實極則兩脚下滿滿而復痛不能行脚心如割筋斷折痛不可忍者方

丹參 三兩 茜草

杜仲

續斷

地骨皮各二兩

乾地黃

當歸

通草

升麻

麥門冬

禹餘糧

麻黃十八錢

牛

膝二兩

甘草

桂心十錢

生薑焦乾

牡蠣各二兩半

右十七味治下篩為粗散以絹袋子盛散二方寸

匕以井花水二升煮數動袋子煮取一升頓服曰二

行義

脚下滿痛多由遠行力乏極勞傷筋或用冷湯洗濯風寒之邪乘虛襲入遂致筋折如斷故於

治血舒筋劑中兼麻黃升麻以散邪牡蠣禹餘糧以杜虛風之復擾也

地黃煎

治筋實極手足爪甲或青或黃或黑烏黯四肢筋急滿方

生地黃汁三升

生葛汁

生元參

汁各一升

大黃

升麻各二兩

麻黃

梔子仁

犀角各三兩

石膏五兩

芍藥四兩

右十味㕮咀以水七升

先煮七物取二升去滓次下地黃汁煎一二沸次下葛汁煎取三升分為三服曰再

行義

筋極而見手足爪甲青黑頗有似乎陰寒之證然有煩滿而無厥逆洵為瘀熱無疑故於解利

藥中得麻黃升麻外通經氣之結得地黃大黃破蓄血之滿也此與前熱邪傷肝之地黃煎涇渭攸分彼專收攝虛陽故兼生薑此專攻逐瘀血故兼大黃觀金匱狐惑例中赤小豆當歸散治七日目四

皆黑病雖不同而瘀血之證則一

五加酒

治筋虛極筋痺好悲思顏色蒼白四肢痿痺手足拘攣伸痛縮急腹中轉痛方

五加皮一斤

薏苡仁半升

枳刺二升

大麻仁二升

猪椒根皮

丹參各八兩

乾薑各五兩

桂心

當歸

甘草各三

兩天雄 秦椒 白蘚皮 通草 酒 右十五味㕮咀以絹袋盛清酒四斗漬春夏四日秋冬六七

日初服六七合稍稍加以知為度

行義 筋虛極而好悲且色兼蒼白明是金刑木象筋病所以外見手足拘攣內顯腹中轉痛故用五加桂風逐濕而兼二椒薑雄壯筋強骨桂心芎藶益肝養營佐以薏苡枳刺麻仁丹參甘草蘚通得酒以行其力何憚筋極之不平復乎

人參酒 治筋虛極則筋不能轉十指爪皆痛數轉筋或交接過度或病未平復交接傷氣內筋絕舌卷唇青引卵縮脈脹急腹中絞痛或便欲絕不能飲食方 人參 防風 茯苓 細辛 秦椒 黃芪 當歸 牛膝 桔梗各一兩半 乾地黃 丹參 薯蕷 鍾乳 磬石 山茱萸 芎藶 酒 各二兩 白朮 麻黃各二兩半 五加皮 生薑切炒 乾烏麻碎各一升 大棗三十枚 右二十二味㕮咀鍾乳別以小袋子盛清酒二斗半浸五日溫服三合日再不知隨意增進 一本與烏麻用杜仲一兩半

行義 此治腎勞筋極故用山萸薯蕷地黃牛膝補養真陰芎藶當歸丹參烏麻滋培營血人參黃芪茯苓白朮保養元神麻黃細辛桔梗防風開泄肺氣鍾乳磐石秦椒五加固斂陽精生薑大棗調和營衛共襄扶陽續筋之功其間白朮與鍾乳相反千金每用相激以壯其威且與磐石並用不獨為氣傷精脫之所需并可禦麻黃發汗之外脫况漬酒緩進與湯藥急追用法迥乎不類也 治交接損卵縮筋攣方 燒婦人月經衣灰服方十七

行義 此即南陽陰陽易燒棍散變法取穢惡之氣以散穢惡之傷也

治筋絕方 熬蟹腦足體內瘡中筋即續

行義 筋絕而用蟹髓入傷處不但續筋并能散血然用生者為捷但足易脫不若用體尤勝

足法

勞冷氣逆

龍冷薄脚屈伸難久陽蹻一百壯在外踝下客爪

腰背不便轉筋急痙筋掣

第二十一

十壯在內踝前筋裏宛中 又云火下滿各五十壯老人加之小兒隨年壯 又云此二穴喚腰脈逆五臟所苦腰脹惡主之 轉筋腰骨痛不可忍久屈膝下廉橫筋上三壯 腹脹轉筋及臍上一寸二七壯

堅癥積聚第五

論一首

又法六首 方四十四首

論曰病有積有聚何以別之答曰積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟之所生聚者六腑之所成故積者陰氣也其始發有常處其痛一作不離其部上下有所終始左右有所窮處也聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛無常處謂之聚也故以是別知積聚也 經絡受病入於腸胃五臟積聚發伏梁息竇肥氣否氣奔豚積聚之始生至其已成奈何曰積之始生得寒乃生厥止乃成積人之善病腸中積者何以候之曰皮薄而不澤肉不堅而淖澤如此則腸胃生惡惡則邪氣留止積聚乃作腸胃之積寒溫不決邪氣稍止至其蓄積留止大聚乃起病有身體腰痺股脂皆腫環臍而痛是謂何病曰病名伏梁此風根也不可動動之為水溺溢之病小腹盛左右上下皆有根者伏梁也裏膿血居腸胃之外不可治治之每切按之致死此下則因陰必下體血上則迫胃管生王水云當作出膈俠胃腕內癰此久病也難療居臍上為逆慎勿動亟奪其氣溢於大腸而著於肓肓之原在臍下故環臍而痛

三台丸 治五臟寒熱積聚膕脹腸鳴而噫食不生肌膚甚者嘔逆若傷寒寒瘞已愈今不復發食後服五丸飲多者十九常服令人大小便調和長肌肉方 大黃熟前胡各二兩 茄梗 硝石 杏仁各一厚朴 附子 細辛 半夏各一錢芩半兩 右十味為末蜜和搗五千杵丸如梧子大服五丸稍加至十丸以知為度

衍義

五臟皆有寒熱積聚非獨肝也肝之積名曰肥氣心之積名曰伏梁脾之積名曰痞氣肺之積

名曰息責腎之積名曰奔豚奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱金匱主以奔豚湯燒針汗出不解放作奔
豚桂枝加桂湯所加之桂心為當臍下悸者欲作奔豚芩桂甘棗湯腹中寒上衝皮起出見有頭足三物大建
中湯寒氣厥逆用赤丸胸痹積痛九痛丸脇下偏痛大黃附子湯諸積雖有五臟之分大約不出金匱
等法為正治眼藏于金特舉肝臟為例者以肝臟生發之氣生氣旺則五臟環週生氣阻則五積留著
其方雖彙肝臟之門而所用之藥不獨治肝積也如三台丸耑取大黃附子湯專破腎肝脾三經之結
兼大陷胸丸但以硝石易芒硝以泄脾胃逆氣之滿更加前胡厚朴茯苓半夏導氣滌痰方中僅有細
辛一味達肝於此可以默悟堅癥積聚諸方不獨為肝臟一門設也

五石烏頭丸 治男子女人百病虛弱勞冷宿寒久癖反癰瘕積聚或嘔逆不下食并風濕諸病無不治
之方 鍾乳煉硫黃 磬石 紫石英 赤石脂 松實 甘草 白朮 紫菀 山茱萸 防風
白薇 桔梗 天雄 呂葵 細辛 茶朮 人參 附子 藜蘆各一兩半麥門冬 乾薑 蜀椒
吳茱萸 桂心各二兩半烏頭 三兩 厚朴 遠志 茯苓各一兩半當歸 二兩 乾地黃八兩 束膏五合 右三
十二味為末蜜和搗五千杵丸如梧子大酒服十九日三稍加之

烏頭丸 治男子女人寒冷腹內積聚邪氣往來厥逆搶心心痛悶吐下不止婦人產後羸瘦方 烏頭
桂枝加桂湯所加之桂心為當臍下悸者欲作奔豚芩桂甘棗湯腹中寒上衝皮起出見有頭足三物大建
十五 吳茱萸 蜀椒 乾薑 桂心各二兩半乾地黃一兩 前胡 細辛 人參 芳窮 白朮 呂葵
紫菀 白薇各一兩半 菖蒲八錢 右十五味為末蜜和如梧子大酒下十九日三稍加之以知為度
衍義 五石而兼雄附烏頭三建薑桂椒萸四烈可謂峻矣又以參朮藜蘆相激乳朮共襄克敵之功
復取歸地滋燥之品緩其悍烈之威深得緩急相需之妙 烏頭丸主治與五石烏頭丸輕重殊分彼
以積堅氣寔非五石雄附烏頭求參藜之反不能克應此以積微氣弱不勝峻伐但採方中性味稍和
者一十二味更退防風當歸而退前胡芎藭以示勒方之權度也

芎藭 茶荳 蕤蘆

壓蠅入鉢芍藥 防葵 蟬蠅

厚朴 半夏 酒

右二十味為末蜜丸如梧子

大服五丸日再漸加之

行義 瘰瘍而見小腹滿痛乃肝血結積部分非濁陰之氣填塞膈上之比有時擔心喜嘔胸中大氣失職不能駕馭陰邪然陰僭陽位必不能久據於上於此可立辨故用人參扶助正氣挾薑桂而散積結朴半椒萸破除濁氣大黃防葵為蟲廬開辟積血之門戶也其餘牡丹芍藥芎藭髮灰之屬總在輔佐蟲廬之流耳

恒山

凡 治肠下邪氣積聚往來寒熱如溫瘡方

恒山

蜀漆

白薇

桂心

蛇甲

白术

附子

蟇甲 蘆蟲

貝齒

兩半蜚蟲

六銖

右十一味

為末蜜和丸

如梧子大

以米泔清服

五丸日三

行義 積聚結於肝膽部分所以洗洗寒熱發作有時頗有似乎溫瘡之狀但不若瘡之發有常期也溫瘡得之冬月受邪至春夏蘊蒸而發故禁溫劑此沉寒固結雖用恒山蜀漆二甲蘆蟲貝齒削堅破瘀之劑不得附桂辛溫無以動之白薇功專開泄旺氣力除寒熱洗洗發作有時白朮生能逐濕散血并助諸藥破積之力也

又方

蒸鼠壤土熨之冷即易

服中切痛炒鹽半觔令焦內湯中飲之大吐瘻

若手足痛者烘青布納小口器中熏痛處

行義

外用三法土熨布熏皆取用一時以圖暫安未為不可其炒鹽引吐在西北水土堅厚之地固可無慮東南風氣易動之鄉不無激動上衝之患雖鹹未必便能斂降也

神明度命丸

治久患腹內積聚大小便不通氣上搶心腹中脹滿逆害飲食方

大黃

芍藥各二

右二味為末蜜丸如梧子大服四丸日三不知可加至六七丸以知為度

行義

積聚腹中阻逆二便故用大黃推陳致新芍藥和血止痛蜜丸緩投可無開泄之虞

附張路玉先生衍義

治萬病積聚方 七月間收葵藜子不限多少以水煮過熟取曝令乾搗篩蜜丸如梧子大酒服七丸
以知為度其汁煎如餡服之

行義 白蒺藜專祛肝腎之風為目科及白癲風要藥而本經首推治惡血破積聚也
陷胸湯 治胸中心下結積飲食不消方 栀藜實 大黃 黃連各二甘草一兩 右四味㕮咀以水

五升煮取二升五合分三服

行義 小陷胸用半夏黃連栝萎實以滌胸中痰垢大陷胸用大黃芒硝甘遂以散心下結梗此以食
積食廩而膿熱故於小陷胸中除去半夏參入大陷胸中大黃乃草去大小二字僅取陷胸之名以除
水穀陳氣而與有形堅積略無干預也

太乙神明陷水丸 治諸疾破積聚心下支滿寒熱鬼疰長病欬逆唾噫辟除眾惡殺鬼逐邪中惡客忤
胸中結氣咽中閉塞有進有退繞臍側側墮上下按之跳手心中慍慍如有蟲狀毒注相染減門方

雄黃油煮一日丹砂 磬石 當歸 大黃各二巴豆一兩犀角 鬼臼 射罔 蒜蘆各一珍珠 附子

各一兩半麝香 牛黃 人參各半蜈蚣 蛭各一芫青五枚烏頭八枚杏仁四十枚班貓七枚鷄血一枝地

膽各二十枝桂心三兩 右二十四味為末蜜和搗三萬杵丸如小豆先食飲服二丸日三不知稍加仍

以藥二丸安門戶上令眾惡不敢近家反視病人夜行獨宿服二丸令眾惡不敢近傷寒服之無不即

瘥此方與十七卷

蜥蜴丸

治癰堅水腫飛尸遁尸百注尸注骨血相注惡氣鬼忤蠱毒邪氣往來夢寤存亡留飲結積虎

狼所嚙獵犬所傷鳩毒入人五臟服藥以消殺其毒毒即消婦人邪鬼忤亦能遣之方 蜥蜴

蛇一枚 地膽五十枚 蟹蟲 蟑蟲 杏仁各三枚 蟑螂十四枚 朴硝

巴豆各七枚 敗冬花 犀角 桃奴 譯

桑赤雞 鬼督郵各半 藥

虎骨各六 甘草

乾薑各四 甘遂五分

右二十味為末別治巴

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com