

壽
世
保
元
x



新刊醫林狀元壽世保元庚

集七卷

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

男龔安校

婦人科

婦人之病有可治有不可治者皆由其心性善惡所關也聞有德性柔良舉止端重克盡婦道孝敬翁姑盡善者必無災病雖或有食自私全無宗祀之念犯療予因痛識此病借立醫方以爲勸戒其真胎前產後等病各自有方開列于後

婦人總論

夫婦人乃眾陰所集常與温居榮衛和平諸病無由而生榮衛虛弱則百病生

壽世保元

庚集七卷



中醫藥大學圖書館藏

焉經云二七而天癸至任脉通太衝脉盛月事以時上下交感則有子矣其
天癸者天一生水也在脉通者陰用之道泰也太衝脉盛者血氣俱盛也何
謂之月經月者陰也經者經絡也過期而行經者血寒也未期而先行者血
熱也經行作痛者氣之滯也來後或作疼者氣之虛也其色紫者爲風黑者
多熱淡者多痰如烟塵水者血不足余考古方耗其氣以調其經則以爲人
之正氣不宜耗也夫衝者氣也任脉者血也氣升則升氣降則降血隨氣行
無暫息若獨耗其氣血無所施正氣既虛邪氣必勝故百病生焉其經安得
調乎况心生血脾統之脉爲之元也養其心則血生實其脾則血足氣勝則
血行矣安得獨耗其氣哉此調經之要法也行經之時保如產母一失其宜
爲病不淺當戒暴怒莫損於衝任遠色慾莫損於血海一有抑鬱宿血必停
走於腰脇注於腿膝遇新血擊搏則疼痛不已散於四肢則麻木不仁人於
血室則寒熱不定或怔忡而煩悶或人室而狂言或湧上出或歸大腸皆因
氣七情之所致也余考產後一科胎前血氣用藥溫暖於理最當治法至於
子和論產後出血數斗世人皆以血氣兩虛妄用溫熱之劑養血補虛止作

寒治舉世皆然故有悞者
陰陽偏勝豈得孕乎譬如
結乃寒不發生也今婦人
法當行溫涼溫熱之劑實
惡露自盡故無後患耳况
後無窮之變焉余每經歷
者百無二三嘗考子和之
之劑故無禁耳其月裏可
亦若瓜果賴枝葉所蔭也
雖冒寒暑傷食調理不宜
產者猶若枝蔓瓜果有所
人所謂小產傷如大產者
或傷飲食或惡露不通或
可相類而用藥也又如產
寒治舉世皆然故有悞者
陰陽偏勝豈得孕乎譬如
結乃寒不發生也今婦人
法當行溫涼溫熱之劑實
惡露自盡故無後患耳况
後無窮之變焉余每經歷
者百無二三嘗考子和之
之劑故無禁耳其月裏可
亦若瓜果賴枝葉所蔭也
雖冒寒暑傷食調理不宜
產者猶若枝蔓瓜果有所
人所謂小產傷如大產者
或傷飲食或惡露不通或
可相類而用藥也又如產

食以致身熱氣口脈盛當行消食之藥世人多因身熱便為外感然行溫涼之藥發汗退熱胃氣轉傷豈無死者產後半月之前難去內外之邪亦當兼行血氣如過半月已後若有雜症不可偏執產後一門治療又當各類中求之庶無舛悞病體矣

調經諸方

○一論此方調益榮衛滋養氣血治衝任虛損月水不調臍腹疼痛崩中漏下血瘦塊硬發歇疼痛妊娠宿冷將理失宜胎動不安血下不止及產後乘虛風寒內搏惡露不下結生瘕聚小腹堅痛時作寒熱婦人百病宜

四物湯

當歸身 酒洗 川芎

白芍藥 酒炒 懷熟地黃 各二小

右剉一劑水煎溫服看病加減

經候將來腹中陣陣作痛乍作乍止者血氣實也用生地加黃連香附桃仁

紅花 玄胡索 牡丹皮 莪朮

經水常 不及期而行者血熱也用生地加黃連黃芩白芷



經水常過期而來者瘦人多是血少倍當歸地黃加黃芪甘草少佐以紅花
桃仁泥以爲生血之引用也肥人大槩是氣虛挾痰阻滯升降然也去地黃
加參芪甘草茯苓半夏陳皮香附

常過期而紫黑成塊者血熱也多作腹痛用生地加香附黃連玄胡索五靈
脂乳香沒藥

過期而血淡色者痰多血少也用生地黃合二陳湯煎服

肥盛婦人經水或三二箇月一行者痰盛而軀脂閉塞經脉以導痰湯加芎

歸香附蒼朮白朮

經水適來適斷往來寒熱如瘧者合小柴胡湯煎服

經行過三五日腹中綿綿走痛者此血行而滯氣未盡行也加木香檳榔煎

服

經水行後而作疼者氣血俱虛也加四君子湯煎服

經事欲行臍腹絞痛臨經者血澀也加川練子小茴木香檳榔玄胡索

行經時忽着氣惱後得心腹腰脇痛不可忍脉弦急不勻乃瘀血作痛也加



桃仁紅花玄胡義朮青皮行血即愈

經行不止加炒阿膠地榆荆芥穗

婦人因經血過多得五心煩熱日晡潮熱加胡黃連二三服効

婦人筋骨肢節痛及遍身頭疼兩手脉弦增寒如瘧每以散風止痛

効加羌活防風秦艽官桂立効

血崩初起不問虛實加荆芥穗燈上燒過防風升麻如不止加蒲黃炒白朮

炒升麻

治血崩加荆芥黃芩香附

治崩漏加沙參益母草香附炒阿膠炒蒲黃炒陳皮白朮甘草去黨

歸不用

赤白帶下加柴胡升麻酒炒各半夏姜汁炒白茯苓蒼朮米泔炒黃稻酒炒

知母酒炒乾薑炮升陽除濕帶自除也

胎動下血不安加艾葉阿膠炒黃芩白朮砂仁香附糯米

胎死腹中加官桂白芷麝香一產後惡露不行加益母草桃仁蘇木



產後血虛昏暈不醒加人參舌

腹中氣塊加水香檳榔

日乾煩湯加麥門乾葛烏梅

小便閉澀加澤瀉木通

虛煩不眠加竹葉人參酸棗仁

心神恍惚加遠志酸棗仁白茯苓

嘔加藿香半夏砂仁陳皮

婦人經水先期而至血紫有塊

荆芥香附小茴玄胡續斷杜仲

婦人血塊作痛不可忍者加三

木香甘草姜棗煎服

婦人經不下行逆經吐血不止

便同服立効

婦人女子經信愆期以致鼻衄

木白茯苓乾薑香附甘草

一血積塊痛加三稜莪朮官桂

一骨蒸勞熱加知母地骨皮柴胡

一大便不通加桃仁大黃

炒

神辰砂另研

一瀉加白茯苓白朮蓮肉山藥炮乾薑

腰痛手足冷痺口乾頭眩胸痞本方加條芩

地榆甘草

稜莪朮青皮陳皮小茴香附吳茱萸玄胡索

本方一兩加川大黃酒浸炒二兩水煎入童

錯經妄行本方去地黃加桃仁山梔炒大黃



北京中醫藥大學圖書館藏

酒炒甘草共七末水煎臨服入童便同服

一婦人經行三日後來多不止木方加伏龍肝地榆蒲黃黃栢側栢葉黃連

茯苓甘草梔子十三味○因氣惱加香附○脾胃虛少食加白朮

○一論婦人經不調或腹痛白帶或淋漓不止或肌瘦者頭目眩暈面色萎黃

四肢無力以十全大補湯加香附陳皮玄胡砂仁阿膠沉香小茴香吳茱萸

○一論室女十四歲經閉不通或天癸水至失於調理心腹脹滿惡寒發熱

頭身遍疼此感寒血凝自胃腹小溫經湯利氣散主之

小溫經湯

桂枝三分白芷四分白朮五分芍藥七分當歸酒洗熟地黃一分枳殼七分白芍酒炒

羌活四分柴胡四分砂仁四分香附炒甘草二分小茴酒炒血氣刺心

腹難忍加玄胡分五噎噎加杏仁七枚破尖五味子个桔梗分七

右劉一劑生薑三片水煎服

和氣散

香附炒五黃芩四分枳殼去陳皮炒藿香小茴酒炒白朮去苦

玄胡索 砂仁 草果各三枚 去沒 甘草八分 厚朴去皮 五分

右為細末每服二錢空心米湯調酒亦可

○一論室女十五六歲經脉不通日夜寒熱手足脉痺飲食少進頭疼惡心嘔

吐腹中忽然結一塊痛者此症誤食生冷所傷可服

加減四物湯

香附炒一 當歸酒洗 川芎 枳殼去煨 柴胡 白芍酒炒各

黃芩 陳皮 三稜醋炒 莪木醋炒各 熟地黄一 白芷 玄胡索

小苟酒炒 白木去芦 青皮去穰 砂仁 肉桂 甘草各五分

右剉作一劑水煎空心熱服遍身痛加羌活

○一論室女十七八歲經脉不通或百曰或半年顏色青黃飲食少進寒熱往

來四肢困倦頭疼目眩肚痛結塊五心煩熱嘔吐膨脹此乃脾胃受傷血氣

俱弱誤食生冷急宜和氣血扶脾胃先以逍遙散次服加味八物湯後經調

逍遙散

當歸酒洗一分 白芍酒炒一分 柴胡一分 黃芩一分 川芎七分

壽世保元

卷七



熟地黄 七分 半夏 七分 煨炒 人參 五分 麥門冬 五分 甘草 四分

右劉散生薑三片水煎熟服後服八切湯十劑又可服調經丸數服○若少

睡加酸棗仁炒以欽心血

加味八物湯

香附 當歸 白芍 白木 川芎 人參 熟地黄

小茴香 黃芩 柴胡 白茯苓 甘草 芍藥 枳殼 乾漆

漆○嘔吐惡心加良薑砂仁○手足麻痺惡寒加肉桂○咳嗽加杏仁五

味子款冬花

右劉水煎服

調經丸

香附 醋浸 三兩 當歸 酒洗 白木 去皮 痛以 一兩半 如腹 枳殼 麩炒 赤芍

陳艾 醋炒 陳皮 小茴 酒炒 川芎 厚朴 姜汁炒 熟地黄 酒蒸

青皮 兩三 不立胡 砂仁 三稜 醋浸 莪朮 牛膝 酒洗

白芷 粉草 兩一



右為細末醋打米糊為丸如梧子大每服百丸空心米湯送下
 ○一論婦人二十歲後過經脉動來沿身疼痛手足麻痺寒熱頭痛日眩可服

加減五積散

厚朴去皮 姜炒 蒼朮米泔 川芎

白芍酒炒 獨活 羌活

枳殼麸炒 麻黃去根 陳皮各等

白茯苓去 當歸酒 半夏煨
 牛膝去 桔梗 白芷

甘草三分

右剉散薑葱煎熱服○咳加五味杏仁○瀉去枳殼加肉寇

○一論婦人二十三歲經水不調或赤白帶下或如梅汁淋淋或成片有阻
 二三月者此乃氣血虛弱漸生潮熱咳嗽飲食少進四肢倦惰口必變生骨
 蒸即成勞瘵急當調治可服前加味八物湯四劑方可服大溫經湯

大溫經湯

香附入 當歸入 白芍酒 熟地黃

白朮 吳茱萸炒 玄胡索 川芎

沉香三 黃芩三 阿膠炒 肉桂

鹿茸酥炙 人參 白茯苓去

砂仁四 陳皮四 小茴四

甘草三



右剉一劑生薑三片水煎空心熱服如汗不止加酸棗仁炒黃芪蜜炙咳嗽
 加杏仁五味半夏桔梗各五分潮熱加柴胡黃芩
 ○一論婦人二十四五歲所服藥餌加味四物六君湯

厚朴姜汁炒半夏姜汁炒當歸酒洗香附絡五枳實炒白茯苓去皮

川芎 赤芍 蘇葉 檳榔 桔梗 白朮去芦各

砂仁 紅花絡三黃連酒炒全明三分陳皮四分甘草二分

右剉散生薑三片水煎空心熱服

○一論婦人二十五六歲血海虛冷經水不調或時小腹疼痛或下白帶如魚腦髓或似米泔不分信期每日淋瀝不止面色痿黃四肢無力頭暈眼花日眩宜服四物補經湯兼服烏雞丸調理

四物補經湯

香附 當歸 白芍酒炒各熟地黃 川芎絡五黃芪蜜炒

白茯苓去芦黃芩 玄胡索 陳皮絡四砂仁



小茴 酒炒 人參 二炒各分

沉香 另研三分 吳茱萸 三分 粉草 二分

右劉生薑三片水煎空心熱服

烏雞丸

海金沙

側柏葉 鹽水各

炒焙四兩

香附 二兩

厚朴 姜炒三兩

當歸 酒洗三兩

白朮 去芦

川芎 各二兩

白芍 酒炒二兩

熟地 二兩

羌活 半兩

防風 各半兩

人參 一兩

砂仁 各一兩

粉草 三小

右判用白毛烏肉膳雞一隻不問三五年者俱好殺淨去腸屎毛將藥一半入雞肚中放銅鍋內好酒五壺水二瓶文武火煮至乾取雞去骨取肉切細同藥晒乾為末用梗米粉酒水煮糊為丸如梧桐子大每服百丸空心米湯吞下酒亦可

○一論婦人二十七八歲身體虛敗經水不時淋瀝或成片或下黑水面色青

黃虛暈眼花四肢困倦宜服此四五劑後服前大溫經湯十餘帖

止經湯

當歸 酒洗三分 白朮 去芦八分

白芍

川芎

熟地黃

香附



呵膠炒

黃芩

蒲黃炒

側柏葉

砂仁各七

甘草炒

右劉生薑煎空心熱服○咳

加五味子杏仁各五○肚痛加枳殼玄胡索乾

○氣急加半夏蘇子各五

○一治婦人經水來多不止用

蘄艾一兩好生酒炒三次碗蓋淨入水煎去

渣溫服立止

○一論婦人三十一二歲年年

生育敗血過多以致經水不均不時腹中疼痛

結塊飲食少進困倦目眩潮

熱往來五心煩燥此血虛胃熱宜服紅花當歸

散兼用八物湯

紅花當歸散

當歸酒洗

川芎

赤芍藥

熟地黃

黃芩

香附各六

枳殼五分

玄胡索五厚

朴姜炒

小茴香酒炒

柴胡

陳皮

三稜醋煨各四分

莪朮醋煨四分

膝醋分紅花三分

甘草二分

右劉生薑水煎空心熱服

○一論婦人三十四五歲因經

水來時當風坐臥失於迴避膝理空虛外邪乘



入遍身麻痺不能轉側肺經受風咳嗽痰盛宜服五積交加散三四劑又服

八物湯十餘劑

五積交加散 只可服一二劑勿多服

羌活 當歸 酒洗 川芎

厚朴 煨 蒼朮 浸 米泔 防風 去 羌

右剉薑葱煎熱服再服去柴

○一論婦人三十六七歲經行

珍湯同烏雞丸治之

八珍湯

當歸 酒洗 白朮 去苦各 一各

熟地黃 白芍 酒炒各 八分

右剉生薑水煎熱服

○一論婦人三十八九歲經脉

早餘血未盡不時攻痛成疾 宜莪朮散逐去餘血

不行腹中有塊或頭暈眼花不思飲食乃血斷

獨活 白芷 半夏 煨 麻黃 桔梗 白茯苓

枳殼 燻 陳皮 柴胡 各八分 桂皮 加 甘草 各

胡加烏藥殭蠶各一錢酒煎熱服

太過血氣虛耗胃氣不足故經水不來可進八

白茯苓 去皮 人參 川芎

甘草 三分 加香附 八分



莪朮散

香附 三兩

當歸 酒洗

熟地黄

青皮 去穢

砂仁 各八分 乾漆 炒盡烟

右為細末每服二錢空心好

○一治婦人腹中常常作痛上

青皮 陳皮 三稜

右各等分醋煮焙乾為末空

○一論婦人四十二三歲經水

止宜服和經湯兼四物補經

氣藥乃香附陳皮小茴是也

和經湯

白芍 酒炒一分 當歸 酒洗

香附 白朮 去芦

莪朮 醋煨

白朮 去芦

紅花 各五寸 川芎 八分 甘草 一分

米酒調服

下不定經年積血也

莪朮 香附 烏藥 乾薑

心陳皮湯調下

斷絕五十二復來或淋漓或成片條漏下不

湯烏雞丸相間服之可好和經湯若三帖即去

熟地黄

白茯苓

黃芩

川芎 酸棗仁 炒 蒲黃 炒

