

臨川 葛籬 編 新安 吳勉學 校

## 習醫要用直格

## 諸證藥石分劑

## 麻黃散

麻黃一兩半去節湯泡  
去黃汁倍乾秤桂枝一兩削去皴  
皮官桂是也甘草半兩  
炙

杏仁二十粒湯浸去皮尖

雙仁者下並同法

臨川 葛籬 編 新安 吳勉學 校

## 習醫要用直格

## 諸證藥石分劑

## 麻黃散

麻黃一兩半去節湯泡  
去黃汁倍乾秤桂枝一兩削去皴  
皮官桂是也甘草半兩  
炙

杏仁二十粒湯浸去皮尖

雙仁者下並同法

油漿調下五錢併二三服以產為度。○或死胎不下者煎三乙承氣湯一服調下益元散五錢須臾更頻用油漿調益元散溫服前後俱下而胎下可活產母也。凡難產或死胎不下皆由風熱燥濁繁斂結滯而不能舒緩故產戶不得自然開通也。此藥力至則結滯頓開而產矣後慎不可溫補而反生燥熱也。俗未知產後亡血損血疼痛怖懼以致神狂氣亂則陰氣損虛邪熱太甚而為諸熱證由不讀素問不知造化故不識證候陰陽反以妄為虛諸虛百損便為虛冷而無熱也誤以熱藥溫補或見煩渴者不令飲水本雖善心為害多矣。豈治病之道但以臨時審其臟腑六氣虛實明其標本如法治之而已矣此藥泛常多用然須為效至大而俗以病異藥同將謂妄行反招侮慢今以黃丹加令桃紅色名曰紅玉散○加青黛令輕碧色名碧玉散○加薄荷葉一分名綠蘇散主療不殊收效則一俗目懵然何能別此可遠妄侮可顯玄功後之學者其究心焉。

桂枝湯

桂枝去皺芍藥甘草各六錢  
炙等分三分爲半

右剉如麻黃大每服八錢水一盞半姜三片東三枚擘破煎至七分令去滓溫服續後啜熱稀粥溫覆令遍身微汗或暖也及初夏可加黃芩一兩名陽旦湯大熱之分及素有熱人可再加知母半兩石膏一兩為末或更加升麻一分禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪息物等桂枝證反下之不成結胸及痞但腹滿証在者本方倍加芍藥大實痛者更加大黃半兩脉弱自利者不加。

桂枝加葛根湯

桂枝芍藥甘草各六錢葛根一兩  
三字

右如桂枝湯服謂如桂枝湯對煎  
服也下並倣此

葛根湯

葛根一兩麻黃泡去黃汁焙乾秤三分

桂枝去皺芍藥甘草各六錢

半兩

右如桂枝湯服

大青龍湯

麻黃如前 石膏為末各 桂一分 甘草炙一 杏仁十分

湯去皮狀仁

右剉如麻豆大抄五錢水一盞。生姜三片。棗三枚擘破煎至半盞。濾去滓溫服。令身汗。濕未潤再服。

### 小青龍湯

麻黃製如前 半夏湯洗 茯苓 細辛 乾姜 甘草炙 桂枝去皺三分 各 五味子 二錢

右剉麻豆大。每服八錢。水一盞半。生姜四片。煎至七分。絞汁溫服。渴者去半夏加桔梗根三錢。微利去麻黃。加芫花彈子大。嘔者去麻黃。加附子二錢。泡以開佛熱結滯。小便不利。少腹滿者。去麻黃加杏仁四錢。中喘前法製此方燥至溫散其水。以潤腸胃臟腑之燥。以開發佛熱結滯者也。

### 小柴胡湯

柴胡去苗叶二兩 黃芩 甘草 人蔘各半兩 半夏六錢泡五七次

右剉如麻豆大抄五錢。生姜三片。棗三枚切煎至半盞。濾去滓溫服日三。小兒一服作三服。諸藥法同。

### 涼膈散

一名通趣飲子

連翹一兩 山梔子 大黃 薄荷葉去毛 黃芩各半兩 甘草一兩 朴硝 一分

右為粗末。每服二三錢。水一盞。蜜少許。或無蜜亦可。舊用竹葉或亦不須。煎至七分。濾去滓溫服。熱甚者可服四錢。亦有可服二十錢者。治咽喉井涎漱加桔梗一兩。荆芥穗半兩。咳而嘔者。本方加半夏半兩。每服生姜三片煎。衄嘔血者。加當歸芍藥各半兩。生地黃一兩。淋者加滑石四兩。伏苓一兩。風眩者加川芎防風各半兩。石膏三兩。酒毒者。加葛根一兩。斑疹痘瘡加荆芥穗赤芍藥川芎防風桔梗各半兩。三歲兒可服七八錢。或熱甚。黑陷腹滿喘急。小便亦澀而將死者。此一服更加大承氣湯。約以下之得利立甦。凡言加者皆自本方加也。但加者。每服五七錢。以意加減調理。兩感傷寒下證。前後以退表裏之熱者。前本方四五錢。調下益元散三四錢。其本方皆能治此諸證。但加即為效也。

### 白虎湯

知母一兩 甘草一兩 棗米一合 石膏四兩

半兩 甘草一兩 棗米一合 石膏四兩

右剉麻豆大杪五錢水一盞煎至六分去滓溫服無時日三四服熱甚者服七八錢至十餘錢或眩或嘔或發汗或下後煩渴口乾或脉洪大或微惡寒者或不可下者或除可者之外並宜加人參半兩以調之名久多白虎湯

### 五苓散

猪苓去黑皮茯苓去皮白朮各半兩桂去桂心澤瀉一分一兩

右為細末每服二三錢熱湯調下惡熱欲冷飲者新水調下或生姜湯調下愈妙或加滑石二兩甚或喘咳微煩心不得眠者更加阿膠半兩泡

### 桂苓甘露飲一名桂苓白朮散

桂半兩茯苓半兩甘草炙澤瀉各半兩石膏炙寒水石各一兩滑石如前製

右為極細末熱湯調下三錢欲冷飲者新水調下或生姜湯調下尤良小兒服一錢

### 白朮散

白朮去皮茯苓去皮人蔘去皮藿香葉淨各半兩甘草半兩木香一分葛根一兩

右為細末白湯調下三錢若煩渴者加滑石二兩病甚者為粗末每服一兩半水一大升煎至七合絞汁放冷從意續續飲之小兒尤宜

### 四逆湯

甘草炙乾姜各一兩附子去皮臍

凡用附子以半兩重者佳小者力弱大者性惡非稱處方之宜也世皆美其大者未知古人之有則也

右剉麻豆大用水而益煮至一盞絞汁分溫二服強寢人二劑作三服或畜熱極深者手足厥冷則不宜此方當以下之也

### 茯苓半夏湯

茯苓去皮生姜取汁各半夏一錢

右剉麻豆大用水一盞煎至四分絞汁下姜汁溫服。

### 半夏橘皮湯

半夏泡如陳皮湯浸洗去穰甘草炙人蔘茯苓黃芩去腐心葛根半兩厚朴去皮各

右剉麻豆大用水三盞生姜一分切煎至一盞半絞取汁分四服作一日食後溫服。

### 黃連解毒湯

黃連去須黃蘖黃芩大梔子各半

右剉麻豆大每服秤半兩水一茶盞煎至四分絞取汁溫服無時日三四以效為度每一二服效或腹滿嘔吐或欲作利者每服加半夏三枚全用厚朴二錢剉茯苓去皮剉水一盞半生姜三片煎至半盞絞汁溫服名曰半夏黃連解毒湯或欲急下者本方加入承氣湯一服生姜煎如前法以利為度一法為細末水研如小豆大溫水下二十九治積熱勞咳瀉利甚良。

### 瓜蒂散

瓜蒂赤小豆等分

右為細末以香豉半合豆豉水一盞半煮取汁半盞調下一錢七不吐加服得快吐乃止虛人不宜

### 大柴胡湯

柴胡去苗大黃各半黃芩芍藥各一半夏二錢枳實三錢生用

枳實不去穰為效甚速下並同。

右剉麻豆大分作三服每服水一盞生姜三片棗三枚煎至半盞絞取汁溫服未利再服。

### 大承氣湯

大黃芒硝朴硝有芒頭者亦得厚朴去殼枳實各半加甘草一兩是名三乙承氣湯。

### 傷寒直各

右剉麻豆大分一半。用水一盞半。生姜三片。煎至六分。納硝煎一二沸。絞去滓熱服。

凡前藥須慢火煎沸。即下火為一沸。或言煎至幾分。亦如此法煎。不可強火耗去其水也。

凡病熱鬱甚而冷。服寒藥則病能拒。藥多不能下。故經曰寒因熱用。未利再服。熱甚者此一劑分大米作二服。未利再服少半。熱更甚者一劑都作一服。熱勢甚者亦可併此二劑為一服。副分副為一科方得利而效者。臨時消渴以利為度。消息謂損益多少也

凡用藥多少倣於此耳。

小承氣湯

大黃半兩 厚朴三錢 枳實三錢

右剉如麻豆大。作二服。每服用水一盞。生薑三片。煎至半盞。絞取汁熱服。未利再服。或微下者。一劑分作二服。或和胃氣。不欲利者。一劑分為四五服。

調胃承氣湯

甘草 大黃 芒硝各半兩

右剉如麻豆大。分一半。用水一大盞。煎至半盞。絞去滓。納硝煎一二沸。熱服。不利再服。

十乘湯

芫花慢火炒變色 大戟 甘遂各半兩

右剉如麻豆大。分一半。用水一大盞。煎至半盞。絞去滓。調下半盞。七強實人服一錢。七以意加減。快利為度。

桃仁承氣湯

桃仁湯去皮尖雙仁用搗搘破 芒硝半兩 大黃六錢 桂皮去皴 甘草各三錢

右剉如麻豆大。分作三服。每服用水一盞。煎至半盞。下硝。絞取汁熱服。日三以微利為度。

抵當圓

水蛭炒蟲蟲炒各 桃仁八粒 大黃一錢

右為細末蜜和作二圓用水一小盞煮一圓至六分溫服。時血未下者再服。

### 抵當湯

水蛭炒蟲蟲炒去翅足各十枚

桃仁七枚

大黃一錢

右剉如麻豆大分作二服每用水一盞煮半盞絞去滓溫服未下再服。

蛭之吉丁結二切水蛭也蟲莫庚切

### 茵陳湯

茵陳蒿

去莖一兩名山茵陳

川大黃半兩

七枚小者十枚

山梔子

右剉如麻豆大用水兩盞半慢火煮至一盞絞取汁溫服六分未利再服四分以利為度勢甚者作一服未利再作以意加減當下如爛魚肚及膿血膠膜等物及小便多出金色如皂角汁或見證將欲發黃者此二劑分作四服每服調下五苓散三錢凡治發黃尤越此法也。

世俗有傳烙黃而愈者或此強實之人素本中氣不衰而及濕熱鬱之微者烙之而誤中強劫開發得開氣血宣通即作汗而愈或體質本虛濕熱結甚則劫發不發而反致死者不為少矣莫若存景法對證以藥致之則免致強劫不開而反誤人性命也及夫近世妄傳有寒極陰黃而內外極救其陽為害多矣設若病微而誤中開發得愈亦以鮮矣而傷生者不可勝言也大抵凡諸黃者有二一則濕熱氣而黃萬物皆然又如麥秀而懿雨濕熱過極則黃痘者也及水滯而天氣濕熱則草木將死而色變黃者也或病血液衰則虛燥熱太甚而身體面癩黃者猶亢旱而草木萎黃也夫病燥熱而黃者當退熱潤燥而已此傷寒濕熱極甚而發黃者開發退熱雙利大小腑以除水濕則利加而愈也

齡於林切令作陰

結胸而發黃者同陷胸湯各半服下之或誤服巴豆熱毒圓藥下之及損陰氣遂協熱利不止而發黃者同大承氣各半服下之亦有協熱利不止更或結胸而發黃者用茵陳五分同陷胸湯三分大承氣二分以下之或兩感發黃者本方加黃連解毒湯一服急下之或頭微汗小便利而微黃者濕熱微也宜此梔子蘖皮湯。

大山梔子十五枚甘草一錢黃蘖半兩

右剉如麻豆大此劑則作二服每服水三盞煮至一盞絞取汁分三次作一日服。

大陷胸湯

大黃 芒硝 各三 甘遂末 七字

右剉如麻豆大。一劑分作二服。每服用水一盞。煮大黃至六分。內消至一二沸。絞汁一字。七半溫服。未快利再服。熱惡不利者。以意加服。

大陷胸圓

大黃 半兩 草庵 三錢 微炒 芒硝 一分 杏仁 十二個草  
反炒色變

右大黃為細末。下草庵杵。再羅研杏仁消如泥。和圓如彈子大。每服一圓。入甘遂末三字。七白蜜半匙水一盞。煮至半盞。溫服。當一宿許乃下。未利再服。

小陷胸湯

半夏 四錢 湯洗 生姜 切 二錢 黃連 二錢 括薑實 大者半個 剁但用或其中子者非也  
金用不剉 生姜 切 二錢 括薑實 大者半個 剁但用或其中子者非也 不

右以水三盞。煮括薑取汁一盞半。內餘藥煮至一盞。絞取汁一盞。分兩次溫服。以效為度。

大黃黃連湯

大黃 黃連 黃芩 各一 一法加生姜一分甚良

梔子湯

大梔子 七枚 剁碎 豆豉 半合

右以水兩盞。煮梔子至一盞半。內豆豉煮至半盞。絞汁溫服。

凡加者皆用梔子先煮。

或吐者止後服。凡諸梔子湯。皆非吐人之藥。以其燥熱鬱結之甚。而藥頗攻之不能開通。則鬱發而吐。因其嘔吐發開鬱結。則氣通津液寬行而已。故不須再服也。

梔子厚朴湯

大梔子七枚 厚朴去粗皮 枳實二錢

右劉如麻豆大以水一盞半煮。緩汁半盞溫服。

泛論

凡傷寒熱病下後熱不退。下證尚在者再三下之以熱退為度。雖熱退尚未痊愈者。隨證調之。凡下之前後或大汗將出或大汗已出。俗是好汗。或汗後煩渴。及諸吐瀉雜病。一切煩渴者。須以細細飲之。渴未止者。頻頓時與。但不可過多。以成留飲不散者也。留飲一名水瀉經曰。積飲。止其煩渴也。若以頓飲過多。則水濕過極而腸胃燥熱怫鬱。轉以加其水濕痞閼故成留飲而心腹滿痛或為吐瀉也。

設若不與飲之。則燥熱轉甚危而死矣。

夫腸胃之燥濕猶地最蕩適當其宜。皆不可過與不及。凡治病之道。以調六氣陰陽。使無偏頗。各守其常。平和而已。嗟夫世俗。或以妄為冷水寒藥。水損脾胃。隔郤大汗。但令中外俱熱。而欲望其作大汗者。或大汗欲出。腸胃燥熱煩渴。及汗已出。反慮水却大汗。不與水者。或氣弱久虛煩渴者。或吐瀉煩渴者。或產婦煩渴。皆以妄為氣虛不可飲水也。此乃未知古人云。渴欲飲水為熱在裏也。若夫正氣既衰。邪熱燥甚而煩渴者。若非水液寒藥滋潤救其殘陰。退其邪熱。則陽熱暴甚而為害甚大。也不與水而反以大毒熱藥燥之。寧無損者耶。且如酒之體者水也。比之飲水則過能多飲。而旋能消散之外。轉能發於渴者。以其苦熱養於心火。則陽盛陰衰。而燥去水濕之體。故旋能消散而善多飲水也。其酒之善多飲者。以其酒之熱毒。若非復以水體勝之。則亦少飲疾醉者。強以飲多。則燥熱太甚而多生病也。然酒力之熱。善消水體。復制酒力。以其熱力多於水體。故飲多即熱醉而燥盡。水體勢力尚在。則燥熱煩渴而病於酒也。然酒之熱耗盡水體之外。尚能燥熱煩渴為病。况病於燥熱太甚。而煩渴及不與水者。豈不知其害耶。況燥熱煩渴者。腸胃易為拂鬱。當以退熱開結散水潤燥之藥調之。免致燥熱太甚則拂鬱以成留飲。雖多飲亦不止其腸胃臟腑之燥熱煩渴而成腸胃之內熱甚。以成吐瀉也。涼膈白虎五苓及桂苓甘露之散類隨證以調之也。

或成留飲諸病者隨證燥之。

宜小青龍湯。五苓桂苓甘露黃連解毒湯。小陷胸大承氣之類證本方論中。

戰汗

夫熱病大汗將出而反寒戰者。

古人以百病皆為雜病。惟傷寒名曰大病。俗言汗病是也。經言大汗者。非謂邪熱自汗大出者也。乃陽氣怫鬱鬱結。後得開通發散宣通。則蒸蒸而為汗出。是謂大汗。言大病怫熱邪毒之氣鬱極。迺發以為汗出。故曰大汗也。故經曰大氣皆去。病得已矣。

表之正氣與邪熱并甚於裏。大熱亢極而反兼水化制之。故反寒慄也。

化謂造化也

經曰。少陰所至為驚。或惡寒戰慄譖妄。謂少陰君火熱氣之所至。而為此等之病也。又經曰。諸禁鼓慄如喪神守微者。當其本此實其過。亢則反兼勝己之化。以制其甚。老子云。天之道其張弓乎。高者抑之。斯其道也。經云水曰靜順。謂靜而自己無為。但順物之氣味也。及方圓不與物爭。乃至柔順者也。水本寒。寒極則水。水如地而能載物。又經曰。水發而雹雪。是水寒亢極而反似剋水之土化。是謂兼化也。故病寒極者。反堅滿也。夫土主濕。繁雲雨而安靜。雨濕極甚。則飄驟散落。是反兼風木制其土濕也。故經言瘦為濕極而反似風強病也。○木主生榮。而旺於春。其氣濕。其本風。風大則反涼而毀折。是兼金化制其木也。故風病過極。則中外燥濕。皮膚皴揭。反氣運行之燥潤。而筋脉癱緩。是反兼金化也。○金主於秋。而屬於陰。其氣涼。涼極則天氣清明。而萬物反燥。燥物莫若火。是金極反兼火化制之也。故為病血液衰少。燥金之化極甚。則反熱也。燥物莫若火。夏月火盛。熱極甚則天氣曠昧。而萬物反潤。以出水液。林木流津及體熱極而反化為水。是火極而反兼水化制之也。故病熱極則反出五溫。婦人帶下淋瀝。及厥逆身冷。或為惡寒戰慄。而或反冷痛也。俗以帶下直言冷病。及惡寒戰慄。便為陰寒者。俗醫未知此也。夫天道造化病微。必當其本化寒見水。化熱見火化也。病甚者。反似勝己之化。如寒極反似濕土。熱極反似寒水之化也。嗟夫百病之極甚者。其狀反似於己之相反者。俗醫不求其病之本氣。

而百端擬疑。莫知真源。不得已而但隨兼化之虛象。妄為其治。反助其病。而害於生命多矣。以至舉世皆云病至危極之時。則陰陽反變。而無能辨別也。殊不知但以運氣造化之理推之。則設若干變萬化。而歸其要則一也。何得有難易之二耶。故經曰。夫標本之有道要而博小而大。可以言一而知百病之害。經又曰。善言始者。必念於終。善言近者。必知其遠。是則至數而道不惑。所謂明矣。故老子曰。不窺牖見天道。不出戶見天下。其出彌遠。其知彌少。蓋知要與不知要也。古聖曰。反常合道。謂古聖天理大道合同。而常俗之心則有相反者也。然古聖道不離於俗者。謂道包於俗而入俗也。又云俗自離道者。常俗莫能合於道也。夫俗則有相。而道本無形者。正如五行之變化。微則守常。而本化自見。乃有相之俗。是化以自見也。甚則反以勝己之化。乃無相而反常合道。是謂變。以其取變於本化之相。而反見勝己之化也。變化之道多端。此則微甚外相之變化也。故仙經曰。大道似不肖厚德。若不足。即藏其本相於內。而反變化勝己之化於外。無相。乃反常合於道者也。却以道眼觀之。則求其內也。若但以俗眼觀其外。則逐相而遷。何由得其要也。故聖經所論。天地變化與道合同。而俗無所憚。但隨俗見編集方論。有乖其理。抵合俗心。致使後人皆由說反。自以為是。而聖經之妙理。瞢然罔究。病者無辜。竟罹橫夭。吁可痛者。且如理言。陽勝則熱。陰勝則寒。俗直謂陽熱之氣勝。則發熱。陰寒之氣勝。則發寒者。皆經之本旨也。此言表裏之陰陽。正氣之虛實。言正氣勝者。為不病。而不勝者。為病也。故經曰。陰勝則陽病。陽勝則陰病。陽勝則熱。陰勝則寒。是謂表陽之正氣。為不病。裏陰之正氣。衰而為受病也。裏陰之正氣勝。為不病。表陽之正氣衰。而為受病者也。此皆熱在表裏陰陽之部分者也。然病勝在裏。為陽勝。虛病當發熱。故發熱為病。熱在裏。陽勝陰虛。下之則愈。汗之即死者。是也。表熱裏和。則病當惡寒。為陰勝陽虛。汗之則愈。下之即死者。是也。故熱在表。為陰勝。陽虛而言惡寒之寒。則為寒也。熱在裏。為陽勝。陰虛而言發熱之熱。則為熱也。故傷寒表熱。則惡寒當汗。裏熱則發熱。而當下之。又經曰。重寒則熱。重熱則寒者。非謂病寒而極重反變也。此重言當有兩重。惡寒則不惡寒而惡熱。謂表熱惡寒。為一寒也。若裏之陽和。正氣又出之於表。則又當有一重惡寒。是謂重寒。則反不為寒而為發熱也。若表之正陽之氣。與邪熱并入於裏。則為兩重發熱。則不發熱。而後禁慄寒戰也。此反言陽和衛氣。并之於表陽分。則病氣之勝為陽勝也。病氣與衛氣并。甚於裏之陰分。則為陰勝也。此亦表裏之陰陽。正氣之與邪熱相併。而以言為虛寔也。然

邪熱在於表。則惡寒而熱與裏之衛氣并之於表。則反煩熱也。邪熱獨在於裏。則發熱。而表之正氣與邪熱并之於裏。則反寒戰也。故經云陽虛則外寒。陰虛則內熱。此言不併者也。正氣虛而受邪熱。故言虛也。又曰陽勝則外熱。陰勝則內寒。此言併者也。夫表裏陰陽之分。受其邪熱之所在。其冲和正陽之衛氣。又為邪熱相并而為病。之所正氣轉寔而不虛。故經言勝也。○故經瘡論云。陽氣并於陰。當是之時。陽虛而陰寔。外無氣故先寒。寒而陰氣逆極。則後出之陽。陽氣後併於外。則陰虛而陽寔。故先熱而渴。又曰併於陽則陽勝。並於陰則陰勝。陰勝則寒。陽勝則熱。是言表裏之陰陽。熱氣之虛寔。非寒熱陰陽之虛寔也。故經曰病在陽則熱而脉燥。在陰則寒而脉靜。然氣并於內。而外無氣。故寒戰脉不能燥甚。而沉細欲絕。靜或不見也。○夫瘡者。邪熱與衛氣并。則作發。而不升則休止也。故經曰衛氣相離。或病得休。衛氣集則復病也。故又云陰虛而陽實。實則熱矣。衰則氣復反入。則寒矣。此祇言表裏之陰陽。氣不并者為虛。而并者為實。其為病之氣者。乃熱之一也。俗未明之。直以經言陰勝則寒。不明其經意。以病熱而反惡寒戰慄。便為陰寒之病。誤之久矣。其陰寒之為病者。脉遲細不煩渴。小便清白。吐利腥穢。屈伸不便。厥逆禁固。體寒而不熱。不惡寒無戰慄者也。故經言人多病氣也。陽少陰多。故身寒如從水中出。又曰人有身寒。湯火不能熱。厚衣不能溫。不凍慄。此是陰寒為病而直云。不凍慄寒冷也。夫陽動陰靜。故經云戰慄動搖為陽。火熱氣以為病也。反寒冷者。亢則害。承乃制。是火熱極而反似寒水者也。故病寒戰者。反渴。及雜病而害戰者。多有燥薑也。及夫平人冒寒而戰慄者。寒主閉藏。而外冒於寒。則裏熱怫鬱而表之陽和衛氣。以外寒逼入於裏。則陽并於陰而寒戰也。夫恐極而戰者。經言五志過極。則勞傷本藏。恐為腎。故經曰恐傷腎。然腎傷而虛。則腎火自甚而熱也。又經曰恐則氣下。然陽生出行舒榮。故心火之志喜。則身心放肆。而陰主收藏。故腎水之志。恐。則身心收敛也。夫恐則腎虛心實而熱。正氣收藏。陷下於裏。亦是陽并於陰而寒戰也。夫酒噤而戰者。腸胃酒熱未散。身表酒力已消。則陽熱易為畜熱入裏。故但冒於寒。則陽并於陰而寒戰也。夫欲汗而寒戰者。傷寒日深。表證罷。畜熱於裏。則發熱也。若表裏之正氣并入裏。則火熱無極。而反寒戰也。陰分陽熱之氣。逆極而後出之陽。則煩熱而大汗作也。

世所謂交陽者。非陰寒交熱以為陽熱也。乃怫熱畜之於裏。而鬱極迺發。則交傳出之於表之陽分。是謂交陽而後

作汗也。或怫熱過極而不能交出於表者是鬱極不發否極不泰即正氣衰殘陰氣先絕則陽氣後竭而死矣。夫欲汗而脉忽沉細而或不見者陽表正氣并入於裏故也。交陽而燥亂昏冒者裏熱鬱極迺發而欲出以拂鬱而陽之氣極不能出故氣亂則神昏而燥擾也。○凡欲作汗無問病之微甚或以經新下者或下證未全者恒以涼膈散調之甚者宜黃連解毒湯或下後二三日或未經下腹滿煩渴脈沉實而有下證者三一承氣湯下之。蘇惡者加黃連解毒湯下之。或已戰不快者或戰後汗出不快者或微戰數次經大戰而汗不出者乃并之不甚而病之不速也。通宜三一承氣湯或更加黃連解毒湯下之以散怫熱而開鬱結也。○大法曰脉浮不可下傷寒病已有裏証脉沉之下裏証尚在脉漸浮至一二日汗不能出者裏証鬱發之不峻病已三乙承氣湯微下之凡此諸可下者或得利而汗使出者或服藥而怫鬱頓然開發先汗出而後利者或利性但隨汗出泄則氣和而愈更不利者說不快交不過而死者止由裏熱極甚而不能開發也故常以寒涼或下怫熱免致但以其作汗而為邪熱耗絕陰氣而死也或不戰而汗出者眾不能盡而陽不並陰也或戰而無汗而自愈者津液已衰以經發汗吐利或自汗吐利亡液過多則津液衰竭無由作津但氣和而愈也。

或不戰無汗而愈者陽不並陰則不戰津液已衰故無汗而已也。

世俗未知而直以惡寒戰慄名陽熱氣虛陰寒實勝因而為治誤人多矣。

### 受汗

夫大汗將出者慎不可恨其煩熱而外用水濕及風涼制其熱也。

陽熱開發將欲作汗而出者若為外風涼水濕所薄則怫熱反入於裏而不能出泄病多危極而死者亦不可恨其汗遲而厚衣壅覆欲令大汗快而早出也。

怫熱已甚而鬱極乃發其發之微則順甚則逆順則發易逆則發難病已怫熱作發而煩熱悶亂更以厚衣擁覆太過則陽熱暴然太甚陰氣轉衰而正氣不榮則無由開發即燥熱喘滿危而死者矣。

### 汗後

雙解散 普解風寒暑濕餓飽勞逸憂愁憲慮恚怒悲恐四時中外諸邪所傷億聳身熱頭疼拘倦強痛無問自汗

無汗增寒發熱渴與不渴有甚傷寒疫癟汗病而感風氣雜病一切舊病作發三日裏外並宜服之設若感之勢甚本難解者常服三兩日間亦無不可並無所損或裏熱極甚腹滿實痛煩渴譫妄緩喘急下者以大承氣湯不之三乙承氣湯亦妙也○下後未愈或證未全或大汗前後逆氣或汗後餘熱不解或遺熱勞復或感他人病氣汙毒傳染或中瘡氣馬氣羊氣一切穢毒并漆毒酒食一切藥毒及墮墮打撲傷損疼痛或久新風眩頭疼中風偏枯破傷風洗頭風風癇病或婦人產後諸疾小兒驚風積熱瘡瘍疹痘諸證無問日數但服之周身中外氣血宣通病皆除愈是防風通聖散加水散各一半

防風

川芎  
當歸  
切焙

芍藥  
薄荷葉淨

大黃  
麻黃去根連翹

芒硝別研

石膏別研

桔梗各一兩

滑石十五兩

白朮  
山梔子

荆芥葉  
甘草四兩

剝溫

黃芩一分

右為籠末每服五錢六錢水一大盞半入葱白五寸鹽豉五十粒生姜三片煎至一盞濾汁去滓溫服無時日三四服以効為度常服三錢水一中盞煎六分絞汁溫服不拘時兼夜四服設痊愈後更宜常服使病不再作新病不生並無過竟無問歲數乃平人常服之仙藥也凡人已衰老則腎水真陰損虛即風熱燥鬱其精血涸竭枯燥而死但以此藥扶補滋潤者也嗟夫世俗反以妄傳中年以上火氣漸衰止是虛冷更無熱病誤服熱毒之劑害人無數豈知識病之法全憑勝證以別寒熱陰陽虛實豈可以中年上下為則耶此藥除孕婦及產後月事經水過多并泄瀉者不宜服或治雜病亦宜沿風熱極妙一名通氣防風散一名通解散

傷寒傳染論

夫傷寒傳染之由者由聞大汗穢毒以致神狂氣亂邪熱暴甚於內作發於外而為病也則如西山記曰近穢氣而觸真氣錢仲陽云步履糞穢之履無使近於嬰兒若聞其氣則令兒急驚風搐也孫真人云乘馬遠行至暮當沐浴更衣然後方可近於嬰兒使不聞馬汗氣毒不然則多為天吊急驚風搐也故剝死馬者感其毒氣而成馬氣丁黃之疾皆由聞其毒氣之所作也故聖惠方一法大汗出則懸藥於戶辟其大汗穢毒無使傷於人也世以艾炙席隅者皆其義也多染親屬憂戚侍奉之人勞役者由其神氣怯弱易為變亂故也何以知傳染脉不浮者是也若誤以熱藥解表不維不解其病反甚而危殆矣其治之法自汗宜以蒼朮白虎湯無宜滑石涼膈散熱散而愈其不汗者適其表裏微甚隨證治之

河間劉守真編集 新安吳勉學校正

傷風

傷風之證。頭疼項強。肢節煩疼。或目痛。肌熱乾。嘔鼻塞。手足溫。自汗出。惡風。其脈陽浮而緩。陰浮而弱。此為邪在表。已上傷風之證。皆宜桂枝湯。第二次以解明傷寒。汗出怕風。而加項強痛者。桂枝葛根湯。第三傷風及無汗者。雖已服桂枝湯。反煩不解。而無裏證者。先刺風池風府。却與桂枝葛根湯服之。不若通用雙解散五十一。免致有桂枝麻黃之誤。傷風自汗白虎湯二十二。金匱方太陽病無汗而渴者。不可與白虎湯。

傷寒

傷寒之證。頭項病疼。腰脊強。身體拘急。惡寒不煩燥。無自汗。或致頭面目疼。肌熱。鼻乾。或胸滿而喘。手足指寒。微脈浮數而緊者。邪在表。以上傷寒之證。皆宜麻黃湯。第一以發其汗。傷寒冒風。頭目痛。四肢拘倦。比金散四十六。不若通用天水散四十九。或雙解散之類。五十一甚佳。無使藥不中病。而益加害也。○白虎合涼膈散二十三。乃調理傷寒之上藥。傷風甚妙。

中暑

中暑之證。身熱頭痛。背寒而枯。自汗煩燥。大渴口乾。倦怠而身不痛。或時惡寒。或畏日氣。脈虛而弱。無問表裏。通宜白虎。夏月感冒。發熱煩渴。五苓散二十四。桂枝甘露飲三十四。黃連香薷飲五十二。或雙解散。或裏熱甚。腹滿而脈沉可下者。大承氣湯下之。或三一承氣湯尤妙。半表半裏者。小柴胡涼膈天水散。

中濕

中濕之證。一身盡疼。重者發黃。關節煩疼。發熱。鼻塞時。或腹滿脹。大便利。脈沉而緩。以上中濕之證。先用雙解散。微汗之。次用五苓散。或淡滲散。桂苓甘露飲。曾用甘露飲不愈。却用黃連解毒則愈。問曰。苦劑止土之甘。此屬土。故以火劑燥土。其病則愈。

風寒俱中

風寒俱中之證。頭痛項強肢體疼。手足溫為中風。反無汗惡寒。脈浮緊為傷寒也。或頭項疼。腰脊強。身體拘急。指末微厥。不自汗為傷寒。反煩躁而脈緩者為傷風也。風則傷衛。寒則傷榮。榮衛俱傷。則表裏熱甚者。通宜以大青湯。或雙解散最妙。

### 内外傷寒

始得脈便沉。而裏病表和者。內傷也。脈浮而表病裏和者。外傷也。病在身體四肢為表病。病在胸腹之內為裏病。內傷通解散。外傷雙解散。內外一切所傷通神散。然不若雙解散。以子和為之三法至神。

### 一切汗候

風寒暑濕。飢飽勞逸。憂愁思慮。恚怒悲忿。四時中外諸邪所傷。但覺身熱。頭疼拘倦。強痛無間。自汗無汗。增寒發熱。渴與不渴。微甚。傷寒疫癟。汗病。而感風氣雜病。一切舊病發作。三日裏外。並宜雙解散。設若感之勢甚。本難解者。常服雙解散三兩日間。亦漸可減。並無所損。或裏熱極甚。腹滿實痛。煩渴譁妄。須可下者。三一承氣湯為妙。或下後未愈。或下證未全。或大汗前後逆氣。或汗後餘熱不解。或遺熱復勞。或染他人病氣。汗毒傳染。或中瘴氣。羊氣牛氣一切穢毒。并漆毒酒毒食毒。一切藥毒。及墮墮打撲傷損疼痛。或久患風眩頭疼。中風偏枯。破傷風。洗頭風。風癇病。或婦人產後諸疾。小兒驚風積熱。瘡瘍痘瘡。無問日數。但以雙解散服之。周身中外氣血宣通。病皆除愈。然雙解乃通仙之藥。但除孕婦及產後月經過多。并泄瀉者勿與服之。惟年老人最宜。自有造化於中矣。

### 傳染

凡傷寒疫癟之病。何以別之。蓋脈不浮者傳染也。設若以熱藥解表。不惟不解。其病反甚而危殆矣。其治之法。自汗宜以蒼朮白虎湯。無汗宜滑石涼膈散。散熱而愈。其不解者。通其表裏。微甚隨證治之。而與傷寒之法皆無異也。雙解散益元散皆為神方。

### 表證

凡表證脈浮。身體肢節疼痛。惡風惡寒者。可汗之不可下也。傷寒無汗。麻黃湯。傷風自汗。桂枝湯。一法不問風寒。通用雙解散。或天水散最妙。