

唐千金類方

上海千頃堂書局發行
嚴茹經署

後學三水黃恩榮幹南編述

學生	三男
廣州中醫藥學院專科大學畢業	中醫藥學院專科大學畢業
學館專門畢業	學士
陳景山	悌君校對
覆校	

九漏第一
附癰癤

腸癰第二

五痔第三

疥癬第四
赤癰易
疣白殿
目附

惡疾第五

九漏第一
論一首
法一首
方八十三首

論曰靈樞寒熱篇夫九漏巢源作瘻玉篇瘻也之為病皆寒熱瘰癧猶言累累似瘡非瘡硬實有在

于頸腋者何氣使生此皆鼠癭瘰癧寒熱之毒氣也堤音底留于脉而不去者也鼠癭之

本皆根在於臟其未上出于頸腋之下其浮于脉中。經曰陰肉痿而未著于肌肉。

未內著。而外。為膿血者。易去。去之奈何。曰。請從其末。引其本。言臟可使衰去而絕其

寒熱按其道以予之。徐往來以去之。其小如麥者。麥小粒如一一刺知。三刺已。決其死生。奈

何曰反其目。視其中有赤脉。從上下貫童子。見一脉一歲死。見一脉半。一歲半死。見

二脉二歲死。見二脉半二歲半死。見三脉三歲死。赤脉不下貫瞳子。可治。

凡項邊腋下。先作瘰癧者。猶言緊實欲作漏也。宜禁五辛酒麪。及諸熟食。凡漏初起有似石

癰。累累然作瘰癧子。有核在兩頸及腋下。不痛不熱。治者皆練石散。見卷二十二

附方用粗理黃石鹿角白欬。傳其外。內服五香連翹湯下之。中有黃已潰。治如癰法。諸漏結核起初

未破者。火針針。使著核。結中。無不瘥者。

幹南按。近人治瘰癧疾核。初起堅硬。或如梅李。用縫衣大針二口。將竹筋頭劈

開。以針雙夾縫內。相離一分許。用線扎定。將桐油一盞。用燈草六七根。油內排

勻點著。將針燒紅。用手將核捏起。當頭刺入四五分。核大者再刺數孔。核內或

疾或血。隨孔流出。徐酒溪謂強實人方可用。

何謂九漏。一曰狼漏。二曰鼠漏。三曰螻蛄漏。四曰蜂漏。五曰蚰蟥漏。六曰螻蛄漏。七

曰浮沮漏。浮源作瘰癧。八曰瘰癧漏。九曰轉脉漏。集源此頸之九瘰也。

幹南按。獨形而小核者為結核。生根而累累實者為瘰癧。諸瘡久則變膿潰而成

漏。謂之瘰。凡瘰皆有膿汁。瘰癧瘰亦因其變膿而潰名之。漏即瘰義同。世但以

凡累累實在頸。遂名為瘰癧。其實九瘰不盡起於頸。集源發于頸連或兩腋及

處。起于頸者不盡是瘰癧。不過混言累累實未破者為瘰癧。下有瘰癧附一條已

潰成膿為瘰癧瘰耳。下有瘰癧瘰症。要之無論瘰癧。無論瘰癧瘰。與非瘰癧瘰。其根在

臟。其經在肝。在膽。頸腋皆厥陰少陽脉所經。其因在氣。在火。在痰。而其毒則在蟲。巢源諸瘰

皆有蟲從治肝治膽治氣治火治癰多無交千金言一
痰而專治蟲以蟲毒既結成癰癰蟲不去則癰根不除所用之藥多透毒殺蟲
拔根破癰取金石通靈之品以深入經絡烏獸昆蟲臭腐神奇之物以引出蟲
毒專為強實人立法其中養血益氣祛寒散陰之藥不過為氣血大傷虛勞久
困及膿血不止惡候立法當斟酌而善用也

狼漏

空青商陸散 治狼漏始發于頸腫無頭有根起于缺盆之上連延耳根腫大

此得之憂恚氣上不得下其根在肝一作肺空青主之商陸為之佐

空青 蝟腦各二分 蝟肝乾之一具 芎藭半分 獨活 乳婦蓐草

黃芩 蟹甲 斑猫 乾薑 商陸 地膽

當歸 茴香 礬石各一分 蜀椒三十粒

右十六味治下節以酒服方寸匕日三十五日服之

寒熱毒氣稽留于脉不去著于肌肉變成膿汁始發于頸無頭有根起于缺盆之上

連延耳根腫大名狼漏得之憂恚氣上不下其根在肝肝氣虛則惡實則怒其脉上抵頭角下耳後循頸入缺盆

空青商陸散空青通血脉益肝氣經本為主商陸瀉結癰除腫毒為佐獨活茴香蜀椒

甘薑散陰邪黃芩清濕熱乳婦蓐草合當歸芎藭排膿血礬石蝟腦蝟肝蟹

甲斑猫地膽。拔癰根。酒服溫行。寒熱毒氣除。而狼漏根在肝臟以去。

鼠漏方七首

狸骨知母散 治鼠漏。始發于頸。無頭尾如鼯鼠。使人寒熱脫肉。此得之食于

鼠毒不去。其根在胃。巢源作在肺。狸骨主之。知母為之佐。

狸骨

鮫鯉甲

知母

山龜殼

甘草

桂心

雄黃

乾薑各等分

右八味治下節。以飲服方寸匕。日三。仍以蜜和納瘡中。無不瘥。先灸作瘡後。以藥傅之。已作瘡不用灸。

寒熱毒氣稽留于脉不去。著于肌肉。變成濃汁。始發于頸。無頭尾如鼯鼠。鼠之極小者。使

人寒熱脫肉。

謂瘦削

名鼠漏。得之食鼠毒不去。巢源飲食不擇蟲蛆變化所生。其根在胃。狸骨知母散

狸骨。治鼠癰惡瘡為主。知母清肺胃積熱為佐。桂心甘薑散陰邪。雄黃甘草解濕毒。

鮫鯉甲山龜殼拔癰根。飲服並蜜和納瘡中。寒熱毒氣除。而鼠漏根在胃腑亦除。

方 治鼠漏。

得蛇虺所吞鼠燒末。服方寸匕。日再。不過三服。此大驗。自難遇耳。並傳瘡中。

貓所吞鼠。可變通代之。

死鼠

一枚中

亂髮

女髮一枚

右二味。以臘月猪脂。取令淹鼠髮。煎之令鼠髮消盡膏成。分作二分。一分稍稍塗瘡。一分稍稍以酒服之。則瘡矣。鼠子當從瘡中出。良秘方。

狸捕鼠而蛇吞鼠。均取制伏之義。然哀之以其屬。以死鼠治毒鼠。亦一法。髮乃血餘。借其力深入血脉。以搜惡毒。或塗或服。鼠子自無所匿而自容。從瘡中出。亦奇術也。

熨方 治鼠癰。腫核痛。未成膿。

以柏葉傳著腫上。熬鹽著葉上。熨之令熱氣下即消。

傳方 治鼠漏瘡。瘡復發。及不愈。出膿血不止。

以不中水猪脂。吹咀生地黃納脂中。令脂與地黃足相淹。和煎六七沸。桑灰汁洗瘡。去惡汁。以地黃膏傳瘡上。日一易。

柏屬陰。與金相守。性後凋。耐久堅凝。取其葉。以制蟲毒。

蘇頌。柏葉殺五臟蟲。

而核腫痛可除。若

瘡後復發。膿血不止。瘡毒未清。生地消痰毒。和猪脂透肌理。桑灰汁。桑柴灰。蒸淋取汁。蝕膿腐。先洗後傳。瘡毒祛而膿血亦愈。

方 治風漏。及鼠漏。

赤小豆

白欬

黃耆

牡蠣 各等分

右四味治下節。酒服方寸匕。日三。

風邪在經脉。經脉結聚成風漏。亦有因瘡遇冷。膿汁不盡乃成者。其狀如腫。有似覆手。搔之皮脫。赤汁出。乍腫乍減。漸漸生根結實。且附骨間。即潰成漏。與鼠漏之久。潰毒深。同屬危候。赤小豆治癰腫膿血第一聖藥。白飲本經治癰腫散結氣消風腫。牡蠣本經除拘攣鼠瘻除癰結。黃耆託內毒。酒服溫行。而風漏及鼠漏亦愈。

蜈蚣漏方二首

荏子桔梗丸 治蜈蚣漏。始發于頸項。狀如腫。此得之食瓜果實。毒不去。其根

在大腸。荏子主之。桔梗為之佐。

荏子

龍骨各半兩

附子一兩

蜀椒百粒

桂心

乾薑

桔梗

礬石

獨活

芎藭

各一分

右十味末之。以棗二十枚合搗。醋漿和丸如大豆。溫漿下五丸。至十九。

寒熱毒氣稽留于脉。不去。著于肌肉。變成膿汁。始發于頸項。狀如腫。巢源狀如蛇形。癰疹而出。名

蜈蚣漏。得之食瓜果實。毒不去。巢源食藏于不避有蟲。即便噉之外。絕其根。在大腸。

大腸支脉從缺盆上頸貫頰。荏子桔梗丸。荏子即蘇子利氣寬腸為主。桔梗通肺開結為佐。桂心獨

活。蜀椒芎藭。乾薑附子。破濁陰。礬石龍骨。消濕腫。棗和附子。醋醬。又制食毒。溫漿調

下。寒熱毒氣去。而蜈蚣漏根在大腸以除。

桐葉灰先以泔清煮桐葉取汁洗拭乾納灰瘡中
槲皮化毒除蟲前治附骨疽飲服有效茲用葉煮汁洗拭乾納灰亦一法

蜂漏方五首

雄黃黃芩散 治蜂漏始發于頸瘰癧猶言三四處俱相連以潰此得之飲流

水水有蜂毒不去其根在脾雄黃主之黃芩為之佐

雄黃 黃芩各一兩 蜂房一具 蠶甲 茵香

吳茱萸 乾薑各半兩 蜀椒二百枚

右八味治下篩傳瘡口上日一十日止

寒熱毒氣稽留于脉不去著于肌肉變成膿汁始發于頸瘰癧三四處俱相連以潰

巢源瘰癧三四處或聚聚四五處蜂名蜂漏得之飲流水水有蜂毒不去巢源飲食

多飲流水即得蜂毒不去變化所生其根在脾雄黃黃芩散雄黃除穢濁水為主黃芩治疽蝕火瘍

經為佐茵香蜀椒乾薑吳茱萸降濁陰蠶甲蜂房消癰重以蜂治蜂衰以其屬惟其俱

腫以潰故篩傳瘡口寒熱毒氣去而蜂漏根在脾臟以除

著方 治蜂漏初生時狀如桃而癢搔之則引大如雞子如覆手者

熬鹽熨之三宿四日不瘥至百日成癰其狀大如四五寸石廣三寸中生蜂

作孔乃有數百。以石硫黃隨多少。燃燭燒令汁出。著瘡孔中。須臾間見蜂數十。惟蜂盡瘡。

傳方 治同上。

鴟頭灰傳之。

傳方 治同上。

人屎蛇蛻灰。臘月猪膏和傳之。

傳方 治同上。

蜂窠灰。臘月猪膏和傳孔中。

無形蜂毒。稽留于頸。俱腫以潰。雄黃黃芩散治法固然。若初生如桃瘡。搔引大乃至五寸。廣三寸。中生蜂作孔。蜂毒有形。以雄黃易硫黃。先鹽熨解毒。止癢。後燃燭燒令汁出。著瘡孔。以絕蜂根。最為得法。鴟頭蛇蛻灰。治風蟲人屎猪膏。消癰腫。蜂窠灰傳。猶是以蜂治蜂之法。症奇而方乃不得不奇耳。

虬蟬漏

礬石防風散 治虬蟬漏始發于頸。初得如傷寒。此得之因食。中有虬蟬毒。不

去。其根在腎。礬石主之。防風為之佐。

礬石

防風

桃白皮

知母

雌黃

乾地黃

獨活

青黛

斑猫

白芷

松脂柏一

柏一脂作

芍藥

海藻

當歸分

1

白木

蛻皮

分各
四

蜀椒
百粒

百粒

右十七味治下節。飲服一錢。凡日三服。

寒熱毒氣稽留于脉不去著于肌肉變成膿汁始發于頸初得如傷寒石蛇蛇瘡源

身寒初生痿之生癰疽不治到百日如生者浮腫得之食中有此毒不出其材不

礬石防風散礬石治寒熱鼠癰為主經治寒熱鼠漏蝕死肌防風治惡風口疳

佐。別錄。治金。獨活。白芷。蜀椒。散濁。陰知。母青。黛。疔。惡。腫。海。藻。下。硬。核。初。皮。瘡。蟲。汁。

濕熱地黃芍藥當歸排膿血白木別錄消腫消腫結毒黃松脂辟惡毒疥皮致疥

拔癭根。飲服和濟。寒熱毒氣去。而虵蟬漏根在腎臟。以陷

蟻
螬
漏

礬石白朮散

治蟻蟪漏始發于頸下無頭尾如棗核塊累移在皮中使人寒

熟心滿。此得之因喜。怒哭泣其根在心。磐石主之。白木爲之。佐

礪石

白米

空青

當歸分名二

細辛

大

1

蛭皮

斑
猫

枸杞。

地膽分

04

朝烏腦豆許

1

右十味治下篩。服方寸匕。日三。以酢漿服之。病在上。側輪臥。在下。高枕。臣位

藥流下。

寒熱毒氣稽留于脉不去著于肌肉變成膿汁始發于頸下無頭尾如棗核塊累移

在皮中使人寒熱心滿名蟬螬漏蟬螬初生時無頭尾腫如棗核或移動皮內狀如

有唇畔而瘻搔之引得之喜怒哭泣蟬螬而深坎蟬螬高而圓蟬螬瘻方五寸作坑暹

散礬石治寒熱惡瘡經本為主白朮除心腹急滿為佐甄別錄治心下急滿細辛散濁陰

當歸枸杞滋血液空青飲膿腐謂皮斑猫地膽地膽死肌如治寒熱瘻瘡烏腦殺蟲拔癰根

醋漿調濟寒熱毒氣去而蟬螬漏根在心臟以除

浮沮漏

地膽甘草散治浮沮漏始發于頸如兩指使人寒熱欲卧此得之因思慮憂

懣其根在膽地膽主之甘草為之佐

地膽

雄黃

乾薑

石決明

續斷

菴蘭根

龍膽各三分

細辛二分

大黃半分

甘草一分

右十味治下節傳瘡日四五度古今錄驗無雄黃有硫黃

寒熱毒氣稽留于脉不去著于肌肉變成膿汁始發于頸如兩指使人寒熱欲卧蟬螬初生時無頭尾腫如棗核或移動皮內狀如

始發時在頸亦在腋下如兩名浮沮漏蟬螬而深坎蟬螬高而圓蟬螬瘻方五寸作坑暹

根在膽地膽甘草散地膽治寒熱惡瘡經本為主甘草除寒熱邪氣經本為佐細辛乾薑

溫膽寒龍膽本經治骨間寒熱殺蟲毒石決明散結菴闍根本經治五臟瘕血續斷大腸瘕血消腫毒大黃

瀉肝本經治寒熱鼠瘻惡瘡死肌蝕死肌為散傳瘡寒熱毒氣除而浮沮漏根在膽膽以

去

瘰癧漏

雌黃芍藥丸 治瘰癧漏始發于頸有根初苦痛令人寒熱此得之因新沐濕

結髮汗流于頸所致其根在腎雌黃主之芍藥為之佐

雌黃 茯苓 芍藥 續斷 乾地黄 空青 礬石 乾薑 桔梗

蜀椒 恒山 虎腎 狸肉 烏腦 斑猫各一分礬石一分附子兩

右十七味末之蜜丸以酒服十丸如大豆日二

寒熱毒氣稽留于脉不去著于肌肉變成濃汁始發于頸有根初苦痛令人寒熱名

瘰癧漏得之新沐濕結髮汗流于頸巢源因強力入水坐濕地或新沐浴汗入頭中流在頭上所生其根在腎雌黃

芍藥丸雌黃治惡瘡蟲毒本經為主芍藥治寒熱苦痛本經治寒熱止痛為佐桔梗茯苓恒山

本經恒山治寒熱瘕結開痰結蜀椒乾薑附子破濁陰地黃續斷消癰腫空青礬石蝕膿腐狸

肉虎腎別錄虎骨治邪氣惡瘡鼠瘻虎腎功同斑猫烏腦拔瘰癧根蜜丸酒服溫行寒熱毒氣去而瘰癧

漏根在腎臟以除

幹南按巢源瘰癧瘰癧候風邪毒氣客于肌肉隨虛處而停結為瘰癧或如梅李

等大小兩三相連而時寒熱久則變膿潰成瘻數語所言瘰癧病情最為明白
強力入水或新沐浴汗入頭中流在頸中乃風邪毒氣從入原因後附瘰癧一
門尤當參用治法

傳方 治瘰癧橫闊作頭狀若杏仁形亦作瘰癧方

用雄雞屎灰獵月猪脂和封之

轉脉漏

斑猫白芷丸 治轉脉漏始發于頸濯濯脉轉若驚惕身振寒熱此得之因驚

卧失枕其根在小腸集驗作心斑猫主之白芷為之佐

斑猫 白芷 綠青 大黃各二 人參 當歸

桂心各三 麥門冬 白木各一 升麻 鍾乳 甘草

防風 地膽 續斷 麝香 礬石各一

右十七味末之蜜丸酒服十丸如大豆日三服勿食菜慎房室百日外臺無大黃桂

心麥門冬白木鍾乳

寒熱毒氣稽留于脉不去著于肌肉變成膿汁始發于頸濯濯脉轉若驚惕身振寒

名轉脉漏得之驚卧失枕巢源因飲酒大醉夜卧不安驚欲起轉側失枕所生又失

故失枕其根在小腸斑猫白芷丸斑猫蝕瘻疽死肌本為玉白足非農立也

心防風升麻散風熱大黃瀉毒麥冬當歸續斷上方通血結經青
鍾乳蝕膿腐地膽麝香拔癭根人參白朮甘草培元氣蜜丸酒服溫行寒熱毒氣去
而轉脉漏根在小腸以除

九漏方二十五首

方治九漏

空青

商陸

知母

狸骨

桔梗

防風

荏子

礬石

黃芩

白芷

芍藥

甘草

雌黃

白朮

礬石

地膽

斑猫

雄黃

各等分

右十八味末之蜜丸以酢服如大豆三丸三十日知四十日愈六十日平復

一百日慎房室

一方為散醋服一斗
去日三老少半之

寒熱毒氣稽留于脉不去著于肌肉變成膿汁其根深入變成九癰防風桔梗白芷
散風熱荏子商陸利濕濁知母黃芩芍藥清癰毒雄黃雌黃去死肌空青礬石礬石
蝕膿腐斑猫地膽拔癭根白朮甘草益脾土蜜丸醋服溫散寒熱毒氣去而九
漏根已深入亦除

方治同上

蝟皮半枚蜀椒

附子

當歸

蜂房

地榆

桂心

通草

乾漆

薏苡仁

牡丹

疾藜子

漏蘆

一作蘆龍膽龍骨

土辰

各二分

斑猫

四分

苦參

蛇床子

大黃

雄黃

蘭茹

細辛

蛇蛻皮

各二分

鶴骨

六分

鯪鯉甲

樗雞

各四分

蜥蜴

蜈蚣

各一枚

右二十八味治下篩酒服五分以知為度日二服

寒熱毒氣稽留于脉不去著于肌肉變成膿汁其根深入變成九瘻如上法加味桂心散風熱苡仁通草利濕濁牡丹苦參漏蘆龍膽清癰毒雄黃去死肌加用蝟皮鯪鯉甲鶴骨蛇蛻蜥蜴蜈蚣斑猫樗雞蜂房拔癭根變用大黃瀉瘀腫乾漆蘭茹地榆疾藜去惡土辰別錄治內痔熱血通血結細辛蜀椒蛇床附子破濁陰酒服溫行寒熱毒氣除而九漏根已深入而愈

方 治同上

斑猫

七枚

蝟皮

真朱

雄黃

各一分

右四味治下篩酒服半錢七日三

方 治同上

斑猫

二枚

雄黃

桂心

犀角

各一兩

右四味治下篩酒服一錢匕病從小便出日再

丸方 治一切漏

斑貓四枚

蛟九枚

元青一枚

地膽一枚

蜈蚣半寸

犀角棗核大

牛黃棗核大

生大豆黃十枚

右八味末之。蜜丸。飲服。如梧子二丸。須臾。多作酸漿粥。冷飲之。病從小便出。尿盆中看之。如有蟲形。又似膠汁。此病出也。隔一日一服。飲粥如常。小弱者

隔三四日。候無蟲出。瘡漸瘳。特忌油膩。一切器物。皆須灰洗。乃作食。崔氏云。治九癰。

初服藥。少夜食。明旦服二丸。至七日甚虛弱。可煮食蔓菁菜羹。自餘脂膩。醋口味果之類。並不得食。人強隔日一服。人弱兩三日一服。瘳後仍作二十將

息。不能將息。便不須服。

已上三方。如上法。互有增減。首方。加真朱佐雄黃。次方。加犀角佐雄黃。三方。去雄黃。用犀角。加牛黃。大豆黃。豉。清心。滌痰。泄濕。化濁。或散。或丸。或酒服。或酸漿粥。冷飲。病均從小便出。足補前諸方所未及。

方 治諸漏。

服白馬屎汁一升。

方 治同上。

正月雄狐屎。陰乾。杵末。水和服。

方 治同上。

豬脂一升。酒五合煎沸。頓服之。

方 治一切漏。

槲牡陰白皮三十斤剉之。以水一石煮取一斗。去渣煎如糖。又取都廁上雌雄黃鼠屎各十四枚燒令汁盡。末納煎中。溫酒一升投煎中。合攪之。羸人五合服之。當有蟲出。

白馬雄狐尿消腫辟惡。豬脂酒煮利脉殺蟲。槲皮合雌雄鼠屎入通血絡。深拔癰根。溫酒合服。當有蟲出。亦奇藥也。

方 治諸漏。

水研杏仁服之。

方 治同上。

故布裏鹽如彈丸燒令赤末酒服。

方 治漏發心胸以下者。

武都雄黃

松脂各三兩

右二味和為塊。刀子刮為散。飲服一方寸匕。日二。不瘥更合。

諸漏在頸腋或發心胸以下皆蟲毒所為。杏仁殺蟲消腫。治諸瘡疥消腫。鹽酒殺蟲。

解毒。藏器鹽殺蟲。去皮膚風毒。雄黃松脂殺蟲燥濕。三方內服亦治蟲所必須。

納方 治漏。