

竹林女科證治卷一

調經下

十三四歲經證

室女十三四歲天癸已行而忽不行或發熱或疼痛  
身體不甯口苦面赤寒熱不定頭目暈花此血脈壅  
阻也疏經湯和氣丸主之

疏經湯

白芷七分羌活 砂仁 桂枝 白朮各一錢 香附二分

姜三片葱白三莖空心熱服 如身體不熱不痛

羌活桂枝減半加當歸川芎各一錢 血攻心痛加乾



漆炒令烟盡 玄胡索

各三分

嗽痰氣急加半夏

製

桔梗杏

仁去皮

五味子

各三分

和氣丸

厚樸

姜製五錢

陳皮

藿香

如炒少用

白朮

蜜炙

玄胡索

枳

殼炒

各三錢

香附

童便製五錢

草果

甘草

砂仁

小茴

各二錢

木香

三錢

右為末蜜丸或為散每服二錢空心

白湯下

如不發寒熱去草果藿香

十五六歲經證

室女十五六歲經水不通日夜寒熱手足麻痺頭痛  
惡心嘔吐腹中忽然結塊冲痛此因悞食生冷所致



通經湯主之

通經湯

當歸

川芎

柴胡

黃芩

白芍

各八分

香附

各錢

青皮

砂仁

甘草

各四分

熟地

白朮

蜜炙 陳皮

枳

各錢

殼炒 小茴炒

三稜

莪朮

紅花

各五分

白芷

六分

肉桂

各錢

各錢

三分 姜

葱白

三根

水煎

空心服

如上部痛

加羌

活五分

下部痛

加獨活五分

漆各七分

寒熱瘧疾

加常山

草果

各七分

泄瀉

加肉豆

蔻各七分

栗壳

木香各七分

十七八歲

經證

不感

寒則

調半

辛

日

四

時

服

十七八歲經證

不感

寒則

調半

辛

日

四

時服



婦女十七八歲經脈不通或阻隔半年百日面色青黃飲食不思或作寒熱頭痛眩暈腹中結塊煩悶嘔吐或作膨脹此因脾胃虛弱氣血不行而致也  
湯柴胡湯調經丸主之

瀾經湯

人參

白茯苓

熟地

小茴

各七分

白朮

蜜炙

川芎

各一分

錢甘草

黃芩

柴胡

各一分

枳殼

麩炒三分

當歸

白芍

香附

各一錢五分

姜三片燈心

三寸長七莖

水煎空

心熱服如肚痛加乾漆

炒令烟盡

玄胡索

各七分

嘔吐惡

心加良姜砂仁

各七分

手足麻痺加肉桂

四分

咳嗽加



五味子杏仁去皮款冬花各七分

柴胡湯

當歸一錢二分白芍柴胡黃芩熟地甘草各五分

半夏製川芎各七分人參麥冬各五分去心

姜三片水煎空心服不睡加棗仁炒嘔吐加砂

仁七分白朮六分香附七分咳嗽加杏仁六分皮去五

味子五分蘇葉桔梗各七分

調經丸

當歸二兩白芍蜜炙厚樸姜製赤芍熟地枳殼炒小茴

各一兩陳皮砂仁三稜乾漆炒令盡白芷各一兩



青皮

陳艾

各二兩

粉甘草

五錢香附

五兩醋製

川芎

一兩五錢

右爲細末米糊丸空心米湯下三四十九

十九二十歲經證

婦人十九二十歲出嫁後但遇經脈動時遍身疼痛手足麻痺或寒熱頭痛頭目昏迷此由感冒寒邪而致也紫金散主之

紫金散

厚樸

姜製

蒼朮

川芎

茯苓

當歸

半夏

製

白芍

羌活

獨活

牛膝

各七分

陳皮

桔梗

枳殼

麩炒

白芷

各四分

麻黃

三分去節淨

甘草

五分

桂枝

四分



姜三片葱白三莖空心熱服咳嗽加杏仁去皮五

味子各五分泄瀉加肉豆蔻煨粟壳各五分

### 廿一二歲經證

婦人廿一二歲經脈不調赤白帶下或如梅汁或成  
片塊或二三月不行潮熱咳嗽飲食不思四肢困倦  
若日久不治則成骨蒸癆瘵急服扶金湯若帶如魚  
腦者冷極也繼服烏金丸

### 扶經湯

當歸 香附四製 鹿茸酥炙 川芎 熟地 白朮蜜炙

山茱萸去核 小茴各五分 生甘草三分

行林... 卷一



姜三片水煎空心服如盜汗加棗仁黃芪

蜜炙各五分

咳嗽加杏仁

去皮

五味子

各五分

潮熱加黃芩

酒炒

柴胡

各七分

烏金丹

阿膠

四兩半炒

熟艾

一斤端午日收

穀芽

麥芽

敗筆

各二兩即蘇木

龍衣

一條完全即地殼

凡修煉

此藥須擇天德月德天醫吉日

晝太極圖分兩儀定九宮而生八卦忌婦女雞犬

見聞至夜深寂靜室齋戒心意至誠淨口淨心

淨身敬天地唸神咒咒畢發火煉藥咒曰天精精地

精精精靈靈左朝北斗右拱北辰人逢此藥各保



西京中醫藥大學圖書館



安甯急急如律令煉成包好收貯候五月午日取五  
家角黍尖同搗勻爲丸如桐子大硃砂爲衣此丸兼  
治產後胎前催生護生無不立效

廿三四歲經證

婦人廿三四歲心腹脹滿氣升上隔飲食不思腹中  
結塊成膜此因經後潮熱誤入生冷聚成痰飲若不  
早治後成大患決經湯主之

決經湯

陳皮 白茯苓 枳殼 炒 川芎 赤芍 蘇葉 枳

榔 桔梗 白朮 蜜炙 半夏 製各 當歸 香附 製



厚樸姜製一分甘草三分紅花 黃連酒炒柴胡各六分砂仁

四姜三分水煎空心服如咳嗽加五味子杏仁各一分

五口乾潮熱加竹瀝陳酒各半姜汁少許

早 廿五六歲經證

婦人廿五六歲血海虛冷經脈不調腰腹疼痛或下  
白帶或如魚腦或如米泔信期不定每月淋漓不止  
面色青黃四肢無力頭暈眼花此血氣兩虛也補經  
湯溫經丸主之

補經湯

當歸 鹿茸酥炙 香附童便製 白芍 川芎熟



地各六  
黃芪蜜炙  
白朮蜜炙  
白茯苓  
黃芩酒炒  
陳皮去白

砂仁  
人參  
阿膠炒  
小茴  
山茱萸各五分  
沉香

粉甘草各二分  
玄胡索五分  
姜三片  
水煎空心服

嗽潮熱加五味子杏仁去皮尖各五分  
竹瀝少許

溫經湯

人參  
砂仁各五錢  
白朮蜜炙  
川芎  
熟地  
當歸  
厚

樸姜汁製  
香附各一兩童便製  
夏金砂  
銀蟲砂  
側柏葉各二

兩  
殭蠶炒  
防風各五錢  
粉甘草二分錢五分

右為細末分作三股聽用  
烏骨雞一隻要三四

年老大者用竹刀殺死除去血毛頭足肚內雜臟



不用水洗將陳老酒一大碗將研過藥末納一服  
於雞肚內一股入酒內以文武火煮極熟將  
肉并藥末曬乾或焙乾研極細末將留下一股藥  
末投入雞肉末內和極勻糯米飯為丸每日空  
酒下五十丸

廿七八歲經證

婦人廿七八歲身體困倦飲食少進經水時下淋漓  
不止或成片或流赤白黃水面色青黃目眩眼花四  
肢痠痛將成崩漏宜服潤經湯

潤經湯

當歸錢一

白芍

川芎

香附

醋製

熟地

各八分

阿膠

蛤粉炒

黃芩

蒲黃

炒

側柏葉

鹽水炒

白朮

蜜炙各六分

砂仁

分

炙甘草

三分

姜三

片水煎服

如咳嗽

加五味子

杏仁

各六分

蘇葉

各四分

去皮尖

氣急

加半夏

製

蘇葉

各四分

泄瀉

加肉豆蔻

各四分

煨栗殼

各四分

肚痛

加枳殼

炒

玄胡索

乾漆

炒令烟盡

各四分

分若虛冷

可服

補經湯

溫經湯

經丸

方見此

以補

方見此

以補

心血若口乾

潮熱

不可用溫經丸

可服

八珍散

方見此

見方

此條後

以扶其脾胃

此條中

以扶其脾胃

切忌亂服藥餌

若已半年不

調可用調經散

方見此條

治之

方見此條

治之

調可用調經散

方見此條

治之

方見此條

治之

方見此條

治之

方見此條

治之

廿九三十歲經證

經下

卷一



婦人廿九三十歲連年生育氣散血虛經脈不和或  
二三月不行不時腹痛結成血塊日倦夜熱飲食不  
思此血虛胃熱或由勞傷而致也先服紅花當歸散  
次服八物湯

紅花當歸散

當歸八分 川芎 赤芍 熟地 黃芩 香附 童便製

玄胡索 厚樸姜製各五分 小茴香 柴胡 陳皮

莪朮 三稜 牛膝各四分 甘草三分 紅花二分

姜三片水煎空心服一劑除去三稜莪朮再服二

三劑如惡心如嘔吐加砂仁良姜各二分泄瀉加肉



豆蔻煨 栗殼各四分 遍身痛加羌活獨活各四分 咳嗽

氣急加杏仁去皮尖 五味子 桔梗 蘇葉各四分

八物湯

人參 白朮蜜炙 茯苓 炙甘草 熟地黃 當歸

川芎 白芍各一錢 姜二片 棗二枚 水二鐘煎七分服

卅二三歲經證

婦人三十二三歲氣血盛實熱結血閉臍腹疼痛手不可近者先以三軍丸蕩其瘀穢後以養生湯潤其營衛若月候不調氣滯腹痛者宜服導經湯以順其氣則經血自行若賦稟衰弱者或素有失血之證或



生育過多血海乾枯或房室縱肆過傷除血或子多  
乳衰傷其血液皆足以致經閉失血過多者養榮湯  
主之生育過多者益損湯主之房勞過傷者雙和湯  
主之乳衰血枯者十全大補湯主之

三軍丸

大黃酒侵九蒸血竭研沒藥各五錢其為末水丸

以熟地白芍當歸川芎各一錢煎湯下七八十丸候

大便利一二次經脉自通後服養生湯

養生湯

黃芪二錢當歸 白芍 甘草各一錢





水煎不拘時服此方補脾養血可稍神劑

導經湯

香附錢一 烏藥錢一 當歸錢一 木香不見火 甘草各五分

水煎服此方亦治血海疼痛

養營湯

人參 白朮蜜炙 茯苓 黃芪蜜炙 熟地黃 當歸 陳

皮各一錢 白芍二錢 肉桂 炙甘草各五分 姜三片 棗二

枚水煎服

益損湯

熟地黃錢一 當歸身錢一 白芍 茯苓 白朮蜜炙

木 卷一 經下 九

