

訂正東醫寶鑑內景篇卷之二

御醫忠勤貞亮 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許奉教撰

血

陰血生於水穀

靈樞曰中焦受氣變化而赤是謂血又曰榮出於中焦又曰穀入於胃脈道乃行水入於經其血乃成○內經曰榮者水穀之精氣也和調於五臟灑陳於六府乃能入於脈也故循脈

上下貫五藏絡六府也

血為榮

榮者水穀之精也生於脾總統於心藏受於肝宣布於肺施泄於腎灌漑一身目得之而能視耳得之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足得之而能步藏得之而能液府得之而能傳注之於脈少則澀充則實常以飲食日滋故能陽生陰長取汁變化而赤為血也是故血盛則形盛血弱則形衰矣

血為氣配 夫血譬則水也氣譬則風也風行水上有血氣之象焉蓋氣者血之帥也氣行則血行氣止則血止氣溫則血滑氣寒則血澀氣有一息之不運則血有一息之不行病出於血調其氣猶可以導

達病原於氣區區調血何加焉故人之身調氣

血為氣配 止氣溫則血滑氣寒則血澀氣有一息之不運則血有一息之不行病出於血調其氣猶可以導

脈法 脈經曰脈得諸澀濡弱為亡血○脈訣曰諸證失血皆見於脈脈貴沈細浮大難治○正傳曰芤為失

者死○仲景曰脫血而脈實者難治○丹溪曰吐血衄血脈滑數者難治○吐血衄血脈小弱者生實大者

死○諸失血證脈大且數者逆

熱能傷血

凡熱皆出於心熱甚則能傷血熱出於心洗心散所不可闕○方見火門○熱能傷血四順清涼飲

見熱則行見寒則凝凡口鼻出血皆係陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經也○凡血得熱則渾溢故鮮得寒則凝澀故瘀瘀者黑色也鮮者赤色也○三因

七情動血

○怒氣逆甚嘔血暴癰內逆肝肺相搏則血溢鼻口但怒氣致血證暴甚故經曰抑怒以全陰者



訂正東醫寶鑑內景篇卷之二

御醫忠勤貞亮 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許奉教撰

血

陰血生於水穀

靈樞曰中焦受氣變化而赤是謂血又曰榮出於中焦又曰穀入於胃脈道乃行水入於經其血乃成○內經曰榮者水穀之精氣也和調於五臟灑陳於六府乃能入於脈也故循脈

上下貫五臟絡六府也

血為榮

榮者水穀之精也生於脾總統於心藏受於肝宣布於肺施泄於腎灌漑一身目得之而能視耳得之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足得之而能步藏得之而能液府得之而能傳注之於脈少則澀充則實常以飲食日滋故能陽生陰長取汁變化而赤為血也是故血盛則形盛血弱則形衰矣

血為氣配 夫血譬則水也氣譬則風也風行水上有血氣之象焉蓋氣者血之帥也氣行則血行氣止則血止氣溫則血滑氣寒則血澀氣有一息之不運則血有一息之不行病出於血調其氣猶可以導

達病原於氣區區調血何加焉故人之身調氣

為上調血次之是亦先陽後陰之義也(直指)

脈法

脈經曰脈得諸澀濡弱為亡血○脈訣曰諸證失血皆見於脈脈貴沈細浮大難治○正傳曰芤為失血澀為少血又曰吐血之脈必大○脈大為發熱芤為失血○靈樞曰衄而不止脈大者逆○內經曰

脈至而搏血衄身熱者死又曰腹脹便血脈大時絕者死○難經曰病若吐血衄血脈當沈細反大而牢者死○仲景曰脫血而脈實者難治○丹溪曰吐血衄血脈滑數者難治○吐血衄血脈小弱者生實大者

死○諸失血證脈大且數者逆

熱能傷血

凡熱皆出於心熱甚則能傷血熱出於心洗心散所不可闕(方見火門)熱能傷血四順清涼飲(方見火門)又不可無也(直指)○丹溪曰諸見血皆熱證所謂知其要者一言終是也又曰血

見熱則行見寒則凝凡口鼻出血皆係陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經也○凡血得熱則淖溢故鮮得寒則凝澀故瘀瘀者黑色也鮮者赤色也(三因)

七情動血

○怒氣逆甚嘔血暴瘁內逆肝肺相搏則血溢鼻口但怒氣致血證暴甚故經曰抑怒以全陰者



是也。否則五志之火動甚。火載血上。錯經妄行。宜用保命生地黃散。（方見下丹心）內傷七情者。暴喜動心。不能生血。暴怒傷肝。不能藏血。積憂傷肺。過思傷脾。失志傷腎。皆能動血。又曰。五志火動。笑血熱者。解鬱湯。虛者保命散。（方皆見下）又曰。大怒薄厥。此怒傷肝。而嘔血。以黃連香附青黛柴胡甘草平其肝。則自愈矣。（入門）○暴喜傷心。則氣緩而心不出血。故肝無所受。暴怒傷肝。則氣逆而肝不納血。故血無所歸。又房勞過度。以致陰火沸騰。血從火起。故錯經而妄行。（正傳）

故血無所歸又房勞過度以致陰火沸騰血從火起故錯經而妄行（正傳）

內傷失血

血虛則脈弱，血盛則脈強。血虛則面色萎黃，血盛則面色紅潤。血虛則手足麻木，血盛則手足煩躁。血虛則頭暈目眩，血盛則頭暈目眩。血虛則心跳怔忡，血盛則心跳怔忡。血虛則失眠多夢，血盛則失眠多夢。血虛則食慾不振，血盛則食慾不振。血虛則大便燥結，血盛則大便燥結。血虛則小便頻數，血盛則小便頻數。血虛則經水不調，血盛則經水不調。血虛則胎動不安，血盛則胎動不安。血虛則產後虛弱，血盛則產後虛弱。血虛則百病叢生，血盛則百病叢生。

失血諸證

失血為諸腸風妄行於上則吐衄衰滯於下則便膿血
則為陰虛陽搏則為崩中濕熱瘀則為癰腐化則為膿血火極似水則血色紫

熱勝於陰則發為瘡瘍滯於血則發為痛癢癰疹皮膚則為冷痺蓄之在上其人喜忘善之在
其人喜狂（丹心）○其從肺而上溢於鼻者血衄血從胃而上溢於口者嘔血吐血其喜忘善之在
其熱勝於陰則發為瘡瘍滯於血則發為痛癢癰疹皮膚則為冷痺蓄之在上其人喜忘善之在
其人喜狂（丹心）○其從肺而上溢於鼻者血衄血從胃而上溢於口者嘔血吐血其喜忘善之在

其出於大腸者曰腸風曰血痔（正傳）○從汗空出謂之肌衄從齒齬出謂之齒衄從舌出謂之舌

皆出謂之九竅出血（入門）
（九竅從委中出謂之腠血從九竅出謂之血）

色新舊
新血鮮紅
血瘀黑又曰風證色青寒證色黯暑證色重再便深褐色者愈重三便黑色者為陽證溢出鮮血陰證下如豚肝（綱目）○初便褐色者愈重三便黑色者為

尤重色變者以火燥也如羊血在日色中須臾變褐色久則漸變而為黑色即此意也（海藏）

蓄血證蓄黃

血即瘀血積蓄也○傷寒熱病身黃尿黑如狂喜忘者為蓄血也○仲景○海藏曰喜忘發狂身
黑疾已甚也○小腹滿小便不利皆輕也○蓄血外證○嘔渴昏瞶迷忘常喜湯水漱口○

直指
嘔唾

一○凡病日輕夜重便是瘀血又常喜漱水而不欲下咽（入門）○凡蓄血有上中下之別以衄血為上即血結胸中為中部蓄血下焦為下部血蓄上焦則善忘宜犀角地黃湯（方見下）血

蓄中
易丸

焦胸滿身黃漱水不欲嚥宜桃仁承氣湯（方見傷寒）血蓄下焦則發狂尿黑小便硬痛宜抵當
取盡黑物為效（方見傷寒）又生地黃湯通台三焦蓄血（海藏）○綱目曰瘀血燥結宜用王

燭散

生地黄

易治蓄血證。用生乾地黃二兩，乾漆半兩，生薑十片，黃芩一兩，與酒同煮。服之，大便色黑，小便自利。老幼氣弱者尤宜。生地黃汁。

握判

無則用乾末半升蟲盡二十個炒水蛭十個炒大黃一兩其要桃仁研半兩右水三升文火煮至一升無則用乾末半升蟲盡二十個炒水蛭十個炒大黃一兩其要桃仁研半兩右水三升文火煮至一升

族冷

分二服先服四日計血未下再服之此藥以拍齒瀉其長熱恐拍齒力下血不止故以此湯主

生地黄

湯治蓄血證
一升無則用
生乾地黃二兩乾炒
烟盡半兩生藕汁半升
無則用刺薊汁一升
半生藍葉一

握判
放冷

無則用乾未半升蟲二十個炒水蛭十個炒大黃一兩剉桃仁研半兩右水三升同熱至二升
分二服先服至半日許血未下再服之此藥比抵當湯丸甚輕恐抵當丸下血不止故以此湯主

之(海)

血病吉凶

凡血逆行難治順行易治無潮熱者輕有潮熱者重潮熱者重潮熱者大者死又曰九竅出血身熱不得臥者即死又曰凡血證陽盛則身熱多渴陰盛則身涼不渴然血陰也身涼者易愈又曰如心肝脈

破血若涌泉口鼻俱出者不治(入門)○靈樞曰淫而脫形身熱色天然白及後下血衄血衄血重是為逆又曰衄而不止脈大是為逆又曰咳且澀血脫肉其脈小動是為逆又曰嘔血衄血衄血小

疾是為逆又曰腹脹使血其脈大時絕是為逆又曰咳澀血形肉脫脈搏是為逆又曰血溢上行或唾或嘔或衄或

熱脈大者難治難治者邪勝也身涼脈靜者易治易治者正氣復也又曰血溢上行或唾或嘔或衄或

愈也若變而下行為惡痢者順也上行為逆其難治下行而復下行為惡利者其邪欲去是知吉也○

仲景曰吐血咳逆上氣脈數而有熱不得臥者死○無故忽然瀉下惡血名曰心絕為難治○傷寒太

陽證衄血者病欲愈熱結膀胱而血自下者亦欲愈以此觀之則他病伏熱之人上焦瘀熱而作吐者

亦其病之有瘳也雖然血既吐而自止則可矣(直指)

亡血脫血證靈樞曰鼻頭色白者亡血也又曰衝脈為血之海血海不足則身少血色面無精光又曰血脫

者色白天然不澤其脈空虛○內經曰臂多青脈曰脫血又曰安臥脈盛謂之脫血○東垣曰

六脉弦細而溫按之空虛其色必白而天不

澤者脫血也通用四物湯(方見下)三才丸

三才丸補血虛天門冬熟地黃人參各等分右為末

衄血鼻通於腦血上溢於腦所以從鼻而出兼以陽明熱鬱則口鼻俱出也又曰衄血出於肺宜沙芎散三

黃補血湯難蘇散陶氏生地芩連湯保命生地黃散(方見通治)清衄湯解鬱湯(入門)○丹溪曰衄

血以涼血行血為主犀角地黃湯入鬱金加片芩升麻○東垣曰衄血出於肺犀角升麻梔子黃芩芍

藥生半紫苑丹參阿膠之類主之○內經曰脾移熱於肝則為驚衄又曰春善病欬衄又曰少陰所至

為衄蟻又曰陽明厥逆喘咳身熱善驚衄吐血○衄不止以麝香散及諸藥塞鼻又用止血諸方法○

傷寒當汗不汗熱盛迫血必為衄宜麻黃升麻湯麻黃桂枝湯滑石丸鼻流涕久成衄宜犀角地黃湯

門入

沙芎散

治衄血香附子四兩川芎二兩右為末每二錢茶清調下不以時○丹溪心法芎附散同香

三黃補血湯

治六脈虛芩而衄吐血升麻白芍藥各二錢熟地黃一錢當歸川芎各七分半生地黃紫胡黃芪牡丹皮各五分右剉作一貼水煎服(丹心)

雞蘇散

治衄血不止乃肺金受相火所制然也雞蘇葉黃芪生地黃阿膠珠白茅根各一錢麥門冬桔梗蒲黃炒貝母炒桑白皮甘草炙各五分右剉作一貼薑三片水煎服兼以黃丹吹入鼻(正傳)

陶氏生地芩連湯

治鼻衄或流不止失血過多謔語失神閉目撮空不省人事生地黃黃芩黃連梔子川芎赤芍藥柴胡桔梗犀角鎊甘草各一錢右剉作一貼大棗一枚同煎服(蘇氏)

汁調服(入門)

清衄湯

治衄血當歸赤芍藥生地黃香附子黃芩梔子側柏葉各一錢黃連七分赤茯苓梗各五分生甘草三分藕節五個右剉作一貼水煎入童便調服(回春)

解鬱湯

治衄血柴胡黃連黃芩黃芪地骨皮生地黃熟地黃白芍藥各一錢右剉水煎服(入門)

犀角地黃湯

治衄血不止及上焦瘀血面黃大便黑能消化瘀血生地黃三錢赤芍藥二錢犀角鎊牡丹皮各一錢右剉作一貼水煎服(入門)○回春加當歸黃芩黃連各一錢尤佳

麻黃升麻湯

治傷寒表未解熱鬱作衄俗呼謂紅汗麻黃升麻赤芍藥黃芩各一錢右剉作一貼水煎服(東垣)

麻黃桂枝湯

治傷寒不得汗作衄又治感寒衄吐血麻黃白芍藥黃芪甘草炙各一錢桂枝當歸各五分麥門冬人參各三分五味子五粒右剉作一貼水煎服(東垣)

麝香散

治衄血不止白礬枯白龍骨各三錢麝香一分半右為細末每用少許先以冷水洗淨鼻內然後吹入鼻中或以淫紙蘸藥塞鼻尤妙(得效)○百草霜細末二錢水調服名曰黑神散入吹入鼻中衄不止蒲黃炒或血竭末或油髮灰末或人中白末並吹入鼻中(本草)

滑石丸

治傷寒不得汗以致鼻衄繞見血急用此止之滑石末飯丸梧子大每十丸微嚥破新水嚥下立止(綱目)

止衄法

治鼻衄久不止諸藥無效神效以大白紙一張或二張作十數摺冷水浸溼置頂中以熱熨斗熨之至一二重紙乾則血立止(東垣)○治衄血不止用線繫繫手中指中節如左鼻出血紫右手中指右鼻出血紫左手中指如兩鼻出血左右俱衄之一方用色線(種杏)○治衄不止白芨為末

冷手調塗山根上(兩眉間也)

立止仍以冷水調二錢服之尤妙又方大蒜一枚細研作餅子如錢大

左鼻出血貼左腳心右鼻出血貼右腳心

如兩鼻皆出貼兩腳心血止即洗去(本草)○洪寶丹治衄血不止取藥冷水調塗後頂上最絕血路(方見回春)

嘔血吐血

成碗有聲者為嘔成盆無聲者為吐(入門)○千金曰吐血有三種有內衄有肺疽有傷胃內衄者吐血如

鼻衄但不從鼻孔出是近從心肺間流入胃中或如豆羹汁或如切餚血凝停胃中因滿悶便吐或數

斗至一石者是也得之於勞倦飲食過傷也肺疽者或飲酒之後毒熱滿悶吐之時血從吐後出或一



合半升一升是也傷胃者因飲食大飽之後胃冷不能消化便煩悶強嘔吐使所食之物與氣共上衝

臧因傷裂胃口吐血鮮赤腹亦絞痛自汗其脈緊而數者為難治○傷胃吐血宜理中湯(方見寒門)

加川芎乾葛肺疽吐血宜葛黃丸內鯁吐血實者三黃瀉心湯加生地黃虛者茯苓補心湯人參救肺

散○仲景曰酒客咳者必致吐血此因極飲過度所致即肺疽之屬也○暴吐紫黑血或塊者此因熱

傷血瘀於中吐出血為好四物湯合黃連解毒湯(方見寒門)調之又曰吐血覺胸中氣塞桃仁承氣湯

(方見寒門)下之(丹心)○火載火上錯經妄行四物湯加山梔黃連使薑汁薑汁重便吐血寒者桂枝

熱毒入藏化為瘀血從口吐出多屬陽明血止見目紅骨熱神昏狂譫胸腹急滿皆血證也輕者犀角地

黃湯加黃芩梔子茅根藕節重者桃仁承氣湯派當湯丸(方見寒門)入門○吐血宜大黃散子連

心散是齋白朮散天門冬湯口鼻俱出宜四生丸蚌霜散黑神散側柏散藕汁散七生湯清熱解毒湯

花藥石散五神湯狗胆丸

葛黃丸一名葛連丸治飲酒多積熱以致吐血衄血垂死者黃連四兩葛花二兩無則

葛根代之右為末用大黃末水熬成膏和丸梧子大溫水下百丸(回春)

三黃瀉心湯治吐血大作此乃熱之甚也大黃三錢黃連黃芩各一錢加生地黃二錢右剉作一貼水煎

不足而害之故為吐衄以寒泄其熱以苦補其心蓋兩全之義也(東垣)

茯苓補心湯

治勞心吐血白芍藥二錢熟地黃一錢半當歸一錢三分川芎白茯苓人參前胡半夏各七分陳皮枳殼桔梗乾葛紫蘇葉甘草各五分右剉作一貼薑五片棗二枚煎服(三因)

人參救肺散

一名救肺散治虛勞吐血人參黃芪白芍藥地黃當歸補骨各一錢升

大薊飲子

一名大薊散治年熱物傷肺胃吐血名曰肺疽大薊根桑白皮犀

蓮心散

治勞心吐血蓮子心五十個糯米

是齋白朮散

治飲食過度氣重用力傷胃吐血白朮二錢人參白茯苓黃芪各一錢山藥百合各七分半甘草五分前胡柴胡各二分半右剉作一貼薑三片棗二枚水煎服(蘭易)

天門冬湯

治思慮傷心吐血天門冬遠志白芍藥藕節麥門冬黃芪阿膠珠珀藥當

四生丸

治吐血陽乘於陰血熱妄行生荷葉生艾葉生地黃葉各等分右爛

蚌霜散 治傷損吐血及酒食醉飽後低頭掄損血妄行口鼻俱出(方見諸傷)

黑神散 治傷損大吐血口鼻俱出深村鍋底百草霜右為末每二錢糯米飲調服(得效)一方取三錢冷水調下

側柏散 治內損心脾吐血下血其出如涌泉口鼻皆流噴與不救則死服此即安側柏葉蒸乾三錢半荆芥穗燒灰人參各一兩右為末每三錢入白麝二錢新汲水調如稀糊服(經驗)

藕汁散 治吐血衄血不止生藕汁生地黃汁小鍾(濟生)

七生湯 治血出口鼻如涌泉諸藥不效生地黃生荷葉生藕即生韭菜生茅根各一兩生薑五錢右俱搗取自然汁一梳濃磨京墨與汁同服(回春)

清熱解毒湯 治吐血衄血升麻二錢生地黃一錢半黃柏赤芍藥牡丹皮各七分乾葛黃連黃芩桔梗梔子連翹甘草各五分右剉作一貼薑三片水煎服(醫鑒)

花藥石散 治虛勞吐血五內崩損漏出升斗者花藥石火煨研如粉右取重尿一鍾煎溫調三錢錢服之如男用酒一半女用醋一半與童尿和服使瘀血化為黃水繼以他藥調治(可久)

五神散 治婦人吐血生藕汁刺薊汁生地黃汁白蜜各一盞生薑汁半盞右同煎三兩沸每取一小盞調炒白麝一錢服(雲岐)

狗膽丸 治連日吐血不止五靈脂為末狗胆汁和丸芡實大每一丸薑酒化下不得教口急進白粥不可太多(入門)

一方 治吐血不止將本人血聞不臭可治若臭不可治也將本人吐的血取來用磁鍋焙乾為末每服一錢或一錢二分以麥門冬煎湯調下血即止(回春)

薄厥證 證也得於大怒氣逆陰陽奔併用六鬱湯而得愈(方見積聚)

咳血嗽血唾血咯血 咳血者咳甚出血本於肺龍腦雞蘇丸雞蘇散(方見上)玄霜膏○嗽血者痰嗽帶血本於脾六君子湯加桑白皮片芩枳殼五味子有火者加味道遙散○六君子湯方見痰飲

痰飲○唾血者鮮血隨唾而出本於腎滋陰降火湯(方見火門)唾中有紅絲乃是肺癆難治○咯血者咯出血屑或咯而不出甚略則出或帶紅絲細如線此精血竭也四物湯加竹瀝薑汁童便青魚

或滋陰降火湯保命生地黃散(方見下)聖餅子(入門)○先見紅後見痰多是陰虛火動痰不下降四物湯加貝母天花粉以化痰山梔仁麥門冬牡丹皮以降火先痰後見紅多是陰虛火積熱降痰火

為急宜山梔地黃湯○痰嗽涎帶血出此胃中熱血蒸而出重者山梔輕者藍實(丹心)○先吐痰後見血是積熱宜清肺湯先痰後見血是陰虛宜滋陰降火湯(回春)○咳嗽唾咯血宜龍腦雞蘇丸

河間生地黃散清火滋陰湯清後見血是陰虛宜滋陰降火湯(回春)○咳嗽唾咯血宜龍腦雞蘇丸

唾湯坎離膏(方見下)玄霜雪梨膏恩袍散



龍腦雞蘇丸

治咳嗽唾咯血薄荷一斤麥門冬四兩蒲黃阿膠各二兩甘草一兩半人參黃芪各一兩右為末以紫胡木通汁慢火熬成膏然後將前

六兩攪勻入紫胡木通汁慢火熬成膏然後將前藥末同搜和為丸晚豆大熱水下二十丸(局方)

玄霜膏

治咯血吐血虛勞嗽神效烏梅汁梨汁柿霜白砂糖白蜜蘿蔔汁各四兩生薑汁一兩赤茯苓末一兩用乳汁浸曬九次款冬花紫苑末各二兩共入砂鍋內熬成膏丸如彈子其每二九服

化嗽下(入門)

加味逍遙散

治痰中見血牡丹皮白朮各一錢半當歸赤芍藥桃仁貝母各一錢山梔黃芩各八分桔梗七分青皮五分甘草三分右剉作一貼水煎服(入門)

聖餅子

治咯血杏仁四十粒去皮尖研細同黃蠟炒入青黛一錢捏作餅子用時以乾柿一枚破開以餅置其中合定濕紙包煨研爛米飲調服(正傳)

山梔地黃湯

治先吐血後見血宜以降痰火為急山梔仁一錢二分生地黃赤芍藥知母貝母瓜蒌仁各一錢天花粉牡丹皮麥門冬各五分右剉作一貼水煎服(入門)

清肺湯

先痰後血是積熱也赤茯苓陳皮當歸生地黃赤芍藥天門冬麥門冬黃芩梔子紫苑阿膠珠桑白皮各七分甘草三分右剉作一貼水煎服(回春)

河間生地黃散

治鬱熱衄吐咯血黃芩地黃甘草各七分右剉作一貼水煎服(丹心)

清火滋陰湯

治嘔吐咳嗽唾咯血天門冬麥門冬生地黃牡丹皮赤芍藥山梔子黃連山藥山茱萸黃連澤瀉赤茯苓各七分右剉作一貼水煎服(回春)

清咳湯

治咳血當歸白芍藥桃仁貝母炒各一錢白朮牡丹皮黃芩梔子炒黑各七分杏仁阿膠各八分青皮桔梗各五分甘草三分右剉作一貼水煎服(回春)

清咯湯

治咯血陳皮半夏茯苓知母貝母生地黃各一錢桔梗梔子炒黑各七分杏仁阿膠珠各五分桑白皮一錢半甘草五分薄桂二分右剉作一貼薑三片水煎服(回春)

清唾湯

治唾血知母貝母桔梗黃柏鹽水炒褐色熟地黃玄參遠志天門冬麥門冬各一錢乾薑炒黑五分右剉作一貼水煎服(回春)

玄霜雪梨膏

治咳嗽唾咯吐血除勞心動火勞嗽久不愈雪梨六十個去心皮取汁二十鍾酸者不用生藕汁十鍾生地黃汁十鍾麥門冬煎取汁五鍾白茅根汁十鍾右汁合和重

濾去渣火上煎煉入煉蜜一斤飴糖八兩柿霜八兩薑汁半酒盞火上再熬如稀糊則成膏矣每服三五匙日三服不拘時(醫鑒)

恩袍散

治咯血唾血吐血真生蒲黃薄荷各一兩右為末每三錢以桑白皮湯調下(綱目)



尿血

內經曰胞移熱於膀胱則癰尿血。○仲景曰熱在下焦則尿血。○凡小便出血或淋作痛或雜尿而出者從膀胱中來也。如血出不痛乃心移熱於小腸。從精竅中出也。○(正傳)○小便出血而不痛者為尿血。非淋也。是血從精竅中來乃心移熱於小腸。四物湯加山梔滑石牛膝。○連或髮灰散琥珀散。○清熱滋陰湯。小蓟飲子。薑蜜湯。或四物湯合五苓散。○(方見小便)○加麥門冬煎服。○(釣老)○尿血宜清腸湯。血鹿角膠丸。腎氣丸。○(方見虛勞)○老人六味地黃丸。○(方見虛勞)○婦人當歸散。小兒立效散。○(有實散之方見下)

當歸承氣湯下

髮灰散 ○治尿血亂髮燒存性為末每二錢以酸二合湯少許調服或以井華水亦得。○(綱目)○髮灰丸治同髮灰以側柏葉汁調糯米粉和丸梧子大白湯吞下五十丸。○(正傳)

琥珀散

○治尿血。○(方見下)

清腸湯

○治尿血。○(方見下)

清熱滋陰湯

○治尿血。○(方見下)

小蓟飲子

○治尿血。○(方見下)

薑蜜湯

○治尿血。○(方見下)

茯苓調血湯

○治尿血。○(方見下)

鹿角膠丸

○治尿血。○(方見下)

當歸散

○治尿血。○(方見下)

立效散

○治尿血。○(方見下)

便血

○治尿血。○(方見下)

五輪則陰脈不和

○治尿血。○(方見下)

間而為便血

○治尿血。○(方見下)

五輪則陰脈不和

○治尿血。○(方見下)



主之○便血宜胃風湯(方見大便)清藏湯榆砂湯地榆散連殼丸加減四物湯槐花散有實熱者當歸承氣湯日久便血元氣下陷者厚朴煎補中益氣湯(方見內傷)內傷飲食者平胃散(方見內傷)加枳殼槐花當歸烏梅酒毒便血酒蒸黃連丸(諸方)

平胃地榆湯

治結陰便血蒼朮升麻附子炮各一錢地榆七分葛根厚朴白朮陳皮赤茯苓各五分乾薑當歸神龜炒白芍藥益智仁人參甘草炙各三分右剉作一貼薑三棗二水煎服(寶鑒)

結陰丹

治結陰便血枳殼威靈仙黃芪陳皮椿根白皮何首烏荆芥穗各五錢右為末酒糊和丸梧子大每服五七十丸陳米飯入醋吞下(寶鑒)

黃土湯

治先大便後下血各一錢土三錢熟地黃白朮附子炮阿膠珠黃芩甘草炙各一錢右剉作一貼水煎服(仲景)

赤小豆當歸散

治先下血後大便赤小豆五兩浸令芽出曝乾當歸一兩右搗為末漿水調服二錢日三服(仲景)

清臍湯

治大便下血生地黃一錢當歸酒洗地榆各八分黃芩梔子炒黑黃柏炒各七分白芍藥黃連側柏葉阿膠珠各六分川芎槐角炒各五分右剉作一貼水煎服(回春)

榆砂湯

治結陰便血地榆四兩縮砂七枚研生甘草一錢半炙甘草一錢右剉水煎服(入門)

地榆散

治遠年下血地榆卷栢各五錢右剉砂餅煮十餘沸溫服(丹心)

連殼丸

治內傷下血用此以解絡脈之結黃連枳殼各二兩剉以槐花四兩同炒抹去槐花右為末蒸餅和丸梧子大白湯下五七十丸(入門)○正傳枳殼湯同但剉五錢水煎服

加減四物湯

治便血亦治腸風側栢葉生地黃當歸川芎各一錢枳殼剉荆芥槐花炒甘草炙各五分右剉作一貼薑三片烏梅一個煎服(得效)

槐花散

治腸胃有濕脹滿下血槐花炒二錢蒼朮厚朴陳皮當歸枳殼各一錢烏梅肉甘草炙各五分右剉作一貼水煎服(丹心)

當歸承氣湯

治實熱便血當歸二錢厚朴枳實大黃各八分芒硝七分右剉水煎服(丹心)

厚朴煎

治便血及諸下血厚朴生薑各五兩同搗爛炒黃白朮神龜麥芽五味子各一兩同炒黃右為末水糊和丸梧子大米飲下百丸蓋脾胃本無血緣氣虛腸薄自榮衛滲入而下用厚朴厚腸胃麥

芽消酒食白朮導水白米不作多有奇效(入門)

酒蒸黃連丸

治酒毒積熱便血肛門作熱黃連四兩剉酒淹一宿日乾右為末粟米糊和丸梧子大熟水下三五十丸(得效)



腸辟證詳見後陰

齒衄

入門曰血從齒齦出謂之齒衄又曰牙床屬胃牙齦屬腎如陽明傳入少陰二經相併血出於牙齦如

合犀角地黃湯或生地芍藥連湯方見

綠袍散

治齒縫出血不止黃柏薄荷芒硝青黛各等分右為末入龍腦少許搽牙床即止（入門）

荆槐散

治牙宣出血荆芥穗槐花炒各等分右為末常擦牙或點服（得效）

鬱金散

治齒齦出血鬱金白芷細辛各等分右為末常擦牙仍以竹葉竹茹入鹽煎水含漱（得效）

小薊散

治牙宣出血百草霜小薊香附子蒲黃炒各五錢右為末常搽牙齒上立止（得效）

又方

齒縫多出血以鹽湯常常漱口仍以鹽末塗之○青竹茹醋浸一宿含漱又竹葉濃煎入鹽含漱又濃煎老湯含漱皆妙（本草）○治牙疼牙宣出血香附子木薑汁浸一宿漱口後搽齒（得效）○滿口齒出血地骨皮煎

湯先漱後吃（綱目）

舌衄

入門曰血從舌出謂之舌衄宜蚊蛤散○又方蒲黃炒為末搽之即止又槐花炒為末搽之又赤小豆一升搗碎和水取汁服之（本草）○又方髮灰二錢醋二合調服且搽之（綱目）

蚊蛤散

治舌上出血如泉五倍子白膠香壯蠟粉右等分為末搽患處（得效）

血汗

內經曰少陰所至為衄衄釋曰衄血汗也○河間曰胆受熱血妄行為衄衄並血汗宜定命散○三因湯（方見虛勞）兼服妙香散（方見神門）以金銀器

入小麥麥門冬煎湯調下又產婦血汗宜葶草汁方

定命散

治衄衄血汗朱砂寒水石麝香右等分為末每半錢新水調下（河間）

葶草汁方

治產婦因大喜汗出汚衣赤色葶草搗取汁二升入醋二合和之空腹飲一盞或濃煎服亦可（三因）○蠟皮肉主血汗皮膚燒灰米飲調服肉煮食之（本草）

九竅出血

人卒大驚則九竅血皆溢出謂之九竅出血（本草）○傷寒少陰證醫者不識強發其汗則伏熱逼血從九竅而出名為下厥上竭不治（詳見寒門）○九竅出血宜側柏散（方見上）又百草霜



油髮灰龍骨末或吹入或糝之（入門）○辛驚悸九竅血皆溢出新屠猪羊血熱飲二升即止又人有九竅四肢指岐間出血暴驚所為取新生犢子臍中屎燒灰和水服日三四次又小薊搗取汁（蓋酒半盞調和頓服乾者為末冷水調服（本草）○又法并華水卒喫其面勿令病人先知之（本草）○指縫癢癢成瘡有竅出血不止多年黃桶箍幾燒灰傳之即止（得效）○血自皮膚間出用意酒敷上紙碎揉如楊花以手捏在出血處即止（入門）○胸中出血不止乃血虛也宜服十全大補湯（入門方見虛勞）

傷損失血

諸傷

失血眩暈

海藏曰一切去血過多則必致眩暈悶絕凡崩中去血多拔牙齒去血多金瘡去血多產後去血多皆有此證宜大劑芎歸湯（方見婦人）煎服救之○吐血衄太甚不止當防其血暈茅根燒酒將

醋灑之令鼻嗅氣以遏其勢或葛然以冷水噴其面使驚則止（入門）○失血多眩暈不省宜生地芎連湯救之又全生活血湯（方見胞門）亦佳（入門）○血暈者皆因去血過多虛而成暈脈微澀也急用芎歸湯救之繼用加味四物湯（回春）○吐血衄血過多昏迷不省生地黃三五片取汁連飲不暇取汁生吃呷汁以滓塞鼻神效又好墨濃磨汁飲之仍點入鼻中（本草）

生地芎連湯

治婦人因崩漏大脫血或男子去血過多因而酒燥循衣摸床撮空閉目不省揚手擲足錯語失神鼻乾氣麤生地黃川芎當歸各一錢半赤芍藥山梔子黃芩黃連各七分防風二錢

右對水煎徐徐呷下此危證也以此救之（入門）

加味四物湯

治血虛眩暈卒倒不可父灸驚哭叫動動則乘虛而死矣當歸川芎白芍藥生地黃熟地黃黃芪人參白朮陳皮白茯苓荊芥穗甘草各七分右剉棗二枚烏梅一個煎服（回春）

黑藥止血

綱目曰燒灰諸黑藥皆能止血經曰北方黑色入通於腎夫血者心之色也血見黑即止者由腎水能制心火故也○止血宜五灰散十灰散十灰丸如百草霜松烟墨油髮灰新綿灰棕櫚灰梔子乾柿荊芥蓬房蟬皮牛

角腮之類皆可燒灰單服

五灰散

治一切失血及血崩連送穀黃絹亂髮百草霜棕櫚皮右各燒存性等分加梔子炒黑蒲黃炒松烟墨血竭共為細末每三錢以生藕汁生蘿蔔汁調服之或蜜丸米飲下五十九亦可（回春）

十灰散

治嘔吐咯嗽血及虛勞大吐血大衄小衄栢葉荷葉茅根茜根大黃梔子棕櫚皮杜丹皮各等分右燒存性出火毒研為極細末用生藕汁或蘿蔔汁磨松烟墨半碗調服五錢即止（新書）

十灰丸

治血崩及一切失血黃絹灰馬尾灰藕節灰艾葉灰蒲黃灰蓬蓬灰油髮灰棕櫚灰赤松皮灰新綿灰各等分右為末以醋煮糯米糊和丸梔子大米飲下百丸（丹心）

禁忌

內經曰鹹走血血病無多食鹹又曰久視傷血凡血少血虛人針刺出血過多皆為禁忌



治血藥法 丹溪曰凡用血藥不可單行單止又不可純用寒涼藥必加辛溫升藥如用涼藥用酒蒸酒炒之類乃寒因熱用也又曰久患血證血不歸元久服藥而無效者以川芎為君則效○大凡血見熱

則行見寒則凝見黑(一作灰)一患血證血不歸元久服藥而無效者以川芎為君則效○大凡血見熱之止之消瘀宜犀角地黃湯涼血宜陶氏生地○凡血結之證皆用醋湯和之為妙(直指)○炙甘草炮乾薑每三錢煎服黃血色鮮紅用生地黃若脈洪實痛甚用酒大黃和血止痛用當歸(東垣)

通治血痛藥餌 一切失血諸病通用四物湯補藥散血餘散散側柏湯煮子尿

四物湯 通治血病熱地黃白芍藥川芎當歸各一錢二分半右剉作一貼水煎服(局方)○一方春倍川

和血歸經芍藥倍地黃冬倍當歸○春加防風夏加黃芩秋加天門冬冬加桂枝(綱目)○當歸欲求血藥其四物之謂乎夫川芎血中氣藥也通肝經性味辛散能行血滯於氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘寒能生真陰之虛者也當歸分三治血中主藥也通肝經性味辛溫全用能活血藥也其經也芍藥陰分藥也通脾經性味酸寒能涼血又治血虛腹痛若求陰藥之屬必於此而取則焉

補藥湯 通治諸失血當歸白芍藥生地黃熟地黃赤茯苓梔子仁麥門冬陳皮各一錢人參甘草各五分右剉作一貼煮二枚烏梅一個水煎服(回春)

保命生地黃散 治鬱熱吐血便尿諸失血無寒證者生地黃熟地黃枸杞子地骨皮天門冬白芍藥黃

坎離膏 治陰虛火動致吐血咳嗽哈吐血黃柏知母各四兩生地黃熟地黃天門冬麥門冬各二兩杏仁

渣又將天麥門冬去熟地黃入汁內添水二碗再煎去滓其下再搗爛如泥別用水一二碗熬熟絞汁入前汁將杏仁搗爛再濾去渣同蜜入前汁內熬成膏磁罐收貯封口泥水中一日去火毒每服三

五匙柏葉湯調空心服
終始忌銅鐵器(回春)

固本散 治吐血便尿一切失血真蒲黃地榆各一兩白芷五錢甘草二錢半右為末每服四錢溫酒調服(丹心)

血餘散 治吐血便尿一切失血兼治內崩亂髮以皂角水淨洗晒乾燒灰為末每二錢白茅根煎湯調下或醋湯調下(丹心)○作丸名髮灰丸(見上)



側柏湯

治吐血血崩血痢一切失血之疾採藥晒乾煎湯代茶吃止血滋陰一名柏湯一名柏茶皆同(入門)

童子尿

諸虛吐血咯血藥中每入童便一合其效甚速凡單用重湯頓服無不效應蓋濃尿解火滋陰能消瘀血止吐血諸血先賢有言凡諸失血服寒涼藥十無一生服濃尿者百無一死斯言信矣

用童便一鍾入薑汁二三點攪勻徐服之日進一二次為佳(醫鑒)

單方

凡二十二種

百草霜

深村鍋底者佳刮取細末用之凡血見黑則止此藥主之能治諸失血或吹入竅中或為散冷水調服或作丸服皆佳(本草)

井華水

治九竅出血及衄血不止以水卒然噴面勿令病人先知之(本草)

車前草葉及根

止衄吐血血尿取汁服五合(本草)

芎藭

能行血治吐血衄便尿一切失血煎服末服並佳(本草)

茜根

治吐血便尿崩中一切血疾搗為末每二錢水煎冷服(本草)

艾葉

治吐血乾者煮服一切失血搗取汁飲乾者煮服(本草)

大小蓴

治一切血疾能破血止血生搗取汁飲一小盞或和蜜少許飲(本草)

白芨

治吐血咳唾咯血冷水調末三錢服神妙米飲調亦可(綱目)○白芨至血竅則填補故血止音有死因拷掠遍身吐血並流血常服白芨末輒止後凌遲開胸見白芨末皆填補肺竅云(醫說)

鬱金

止吐血破瘀血為末童便薑汁酒相和調服○又治痰血取末和韭汁童便服血自消丹心松烟墨磨服之或井水磨服之(丹心)

槐花

涼血能止咯唾血及下血炒末熟酒取末二錢調服又治衄舌衄為末糝之(丹心)炒煎服亦可

側柏葉

治吐血便尿一切失血之證止血滋陰為末米飲調服或煎服皆可取汁服亦佳(入門)



生藕汁

消痰血能止一切出血取汁飲之或令地黃汁熱酒童便服並得(本草)

韭汁

止吐血咯唾血善消胸膈間瘀血凝滯取汁冷飲三四盞必胸中煩躁不甯後自愈(丹心)

亂髮灰

止一切失血吐衄便尿九竅出血皆治之取未醋湯或并華水調二錢服作丸服亦可(本草)

諸血

補人身血不足面無血色者並生飲之六畜及獐鹿之血皆可(本草)○虛勞吐血飲黑狗血神效(壽域)

蘆薈汁

治衄吐咳嗽痰血取汁入鹽少許服之或和好酒飲之即止蓋氣降則血止(種杏)

鍼灸法

衄吐血下血取隱白大陵神門大絡(易老)○衄血灸顙會上星(資生)○衄血灸大陵瘰癧即止(丹心)○衄不止以三棱針於氣衝出血立愈(東垣)○衄血取上星風府瘰癧門合谷內庭三里魚

海(綱目)

吐衄血風府大傾宣中上脫中脫氣海關元三里(綱目)○吐血灸大陵瘰癧即止(丹心)○吐血灸大陵瘰癧即止(丹心)○吐血灸大陵瘰癧即止(丹心)

取上脫

大陵神門(東垣)○關脈凡大便出血數斗者以膈俞傷故也宜灸膈俞(脈經)○虛勞

星五十壯

(得效)○下血不止量臍心與有骨平於脊骨上灸七壯即止(資生)

夢

魂魄為夢凡夢皆緣魂魄役物又曰形接而為事神遇而為夢(類聚)○古之真人其寢不夢寢不夢者神存故也(正理)○心實則夢可驚可怪之事虛則魂飛揚紛紅多夢宜別離散蓋無安神

湯(入門)

○解客使魂夢不安者血氣少也血氣少者屬於心心氣虛者其人多畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰者為癰陽氣衰者為狂(仲景)

別離散

治心風為病男夢見女女夢見男宜此去邪使不復見故云別離白朮一兩天雄附子肉桂乾薑

附薑桂

加知母黃柏各三錢當歸地黃各五錢(入門)

益氣安神湯

治七情六淫相感而心虛夜多夢寐睡臥不寧恍惚驚悸當歸神各一錢生地黃麥門冬

片棗二枚

水煎服(回春)

淫邪發夢

黃帝問曰淫邪淫行奈何岐伯對曰正邪從外襲內而未有定舍反淫於藏不得定處與榮衛俱

陰陽俱感

則夢相殺上感則夢飛下感則夢墮其飢則夢取其飽則夢與肝氣感則夢怒肺氣感則夢哭泣心氣感則夢喜笑恐畏脾氣感則夢歌樂身體重不舉腎氣感則夢腰脊兩解不屬○又曰厥氣



客於心則夢見丘山烟火客於肺則夢飛揚見金錢之奇物客於肝則夢山林樹木客於脾則夢見丘陵大澤壞屋風雨客於腎則夢臨淵沒居水中客於膀胱則夢遊行客於胃則夢飲食客於大腸則夢田野客於小腸則夢聚邑街衢客於胆則夢鬪訟自刻客於陰器則夢接內客於項則夢斬首客於腰則夢行走而不能前及居深地窅苑中客於股肱則夢禮節拜起客於胞肓則夢遺便(靈樞)○人常夢與鬼神交驚怕異常者陰之靈神堂陰司舟楫橋梁如此十五年竟無妊娠諸治無效戴人曰陽火盛於上陰水盛於下見鬼神者陰之靈神堂者陰之所舟楫橋梁水之用也診之兩手寸脈皆沉而數知其胸中有痰實也凡三瀉三泄三汗不旬日而無夢一月而有娠(子和)

五藏虛實為夢

肝氣虛則夢見菌香生草實則夢伏樹下不散起心氣虛則夢救火陽物實則夢媾約脾氣虛則夢飲食不足實則夢築垣蓋屋肺氣虛則夢見白物見人斬血藉藉實則夢見兵戰腎氣虛則夢見舟船溺人虛則夢伏水中皆有畏恐(內經)

陽氣之出入為寤寐

靈樞曰衛氣之行晝行於陽則目張而寤夜行於陰則目瞑而寐○鄭康成曰口鼻之呼吸為魄耳目之聰明為魄以耳目與口鼻對言則口鼻為陽耳目為陰以耳目口鼻與藏府對言則耳目口鼻為陽藏府為陰故陽氣行陽分二十五度於藏府之內則耳目口鼻無陽氣運動所以不能知覺而寐矣聰明者豈非陽氣為之乎(入門)

昏沉多睡

靈樞曰足太陽有通項入於腦者正屬目本名曰眼系在項中兩筋間入腦乃別陰陽蹻陽於陰常留於陽留於陽則陽氣滿陽氣滿則陽蹻盛不得入於陰故目不瞑又曰衛氣留於陰不得行於陽留於陰則陰氣盛陰氣盛則陰蹻滿不得入於陽故目閉(入門)○傷寒之邪傳入陰則多眠昏多眠者宜小柴胡湯(方見寒門)少陰之證脈微細但欲寐蓋麻則行陽寐則行陰必從足少陰始故

少陰病但欲寐宜茯苓四逆湯(方見寒門)以益陰回陽或熱病得汗後脈沉細身冷喜臥昏沉不省亦急與四逆湯令四肢溫不爾有熟睡而死者惟汗下後酣眠者為正氣已復不必藥也(入門)○風溫多眠狐惑多眠(並見本門)

虛煩不睡

靈樞曰黃帝問曰人之目不瞑不臥者何氣使然伯高對曰衛氣晝日行於陽夜行於陰常從足少陰之分間行於五藏六府令厥氣客於藏府則衛氣獨衛其外不得入於陰行於陽則陽氣盛

陽氣盛則陽蹻陷不得入於陰陰氣虛故目不瞑欬以半夏湯一劑陰陽已通其臥立至其方以流水十里外者入升陽之萬遍取其清五升煮之炊以葦薪火沸置秫米一升治半夏五合徐炊令竭為一

升半去其渣飲汁一小盃日三稍益以知為度其病新發者覆孟則臥汗出則已矣久者三飲而已也
○身不覺熱頭目昏疼口乾咽燥而不渴清清不寐皆虛煩也(三因)○大病後虛煩不睡湯主
之甚者益元散(方見暑門)○酸棗仁湯(入門)○但獨熱者虛煩也起臥不安睡不穩賴之煩
宜竹葉石膏湯(方見寒門)○酸棗仁湯(入門)○不寐者虛煩也起臥不安睡不穩賴之煩
○虛煩者心胸煩擾而不寧也內經曰陰虛則內熱今之虛煩多是陰虛生內熱所致是故傷寒吐下
後及霍亂吐瀉後津液枯竭多有虛煩之證(醫鑒)○虛煩不睡宜寧志膏酸棗仁湯高枕無憂散
珠母丸獨沽湯○勞心胆令夜臥不睡定志丸(方見神門)○加酸棗仁炒柏子仁炒朱砂乳香為衣
湯下五十丸加味溫胆湯亦主之(醫鑒)
○癲狂不睡傷寒不睡(並見各門)

酸棗仁湯

治虛煩不睡及傷寒吐下後虛煩不睡石膏二錢半酸棗仁炒人參各一錢
半知母赤茯苓甘草各一錢桂心五分右剉作一貼薑三片水煎服(入門)

溫膽湯

治心膽虛怯觸事易驚夢寐不祥虛煩不得睡半夏陳皮白茯苓枳實各二錢青竹茹一錢甘草
五分右剉作一貼薑五片棗二枚水煎服(醫鑒)○驚悸怔忡失志不寐皆是痰涎沃心宜理痰

氣此藥主之(醫鑒)

如味溫膽湯

治法同上半夏三錢半陳皮二錢二分竹茹枳實各一錢半酸棗仁炒遠志五味子人參熟
地黃白茯苓甘草各一錢右剉分作二貼薑五片棗二枚水煎服(回春)○前方加酸棗仁

五味子遠志人參熟地黃也
心肝氣血虛者尤宜服之

寧志膏

治虛煩不得睡或夢涉危險睡臥不寧酸棗仁炒二兩人參一兩朱砂五錢乳香二錢半右為末
煉蜜和丸彈子大每一丸溫酒化下大棗湯亦可(局方)○婦人失血過多心神不安不得睡臥

朱砂酸棗仁炒人參白茯苓神琥珀各七錢半乳香二
錢右為末每一錢燈心棗子煎湯調下(大全良方)

酸棗仁湯

治不睡及多睡酸棗仁微炒人參白茯苓各等分右為末每一
錢水一盞煎至七分如要睡即冷服如不要睡即熱服(醫鑒)

高枕無憂散

治心膽虛怯晝夜不睡百方不效服此如神人參五錢石膏三錢陳皮半兩白茯苓枳
實竹茹麥冬冬龍眼肉甘草各一錢半酸棗仁炒一錢右剉分作二貼水煎服(醫鑒)

真珠母丸

治神魂不寧驚悸不得睡真珠母七錢半熟地黃當歸各一兩半人參酸棗仁炒柏子仁犀角
白茯苓神各一兩沉香龍齒各五錢右為末蜜丸梧子大朱砂為衣每四五十丸薄荷湯下日二

服此方真珠母為君龍齒佐之真珠母入肝經為第一龍齒與肝同類也龍齒虎睛人皆以為鎮心藥
殊不知龍齒安魂虎睛定魄龍能變化故魂遊而不定虎能專靜故魄止而有守若魄不寧者宜用虎