

金匱啟鐫

痘至灌漿之時其時日已過半其收結不難爲候宜無不順矣更何
必言乎順哉然而亦有險且逆者雖欲不別言順而安得不別言之
果何爲順蓋曰氣盈血附其毒易化至七朝不期行而自行此氣血
之順也先起脹則先灌漿自頭面以及周身畧無差忒此次第之順
也痘先見紅点由紅轉白血變成漿漸漸肥滿而光澤此形色之順
也期至九日則漿自老其色則蒼如黃蜡色而顯結痂之形此成寔
之順也合此等順而謂順則誠順矣何憂乎收靨之難又何憂乎結
痂之或變哉

灌漿險症

灌漿既有順症。則有險症。何謂險。謂痘當灌漿之時。漿清不濃。及不按期而漿行遲。險也。此險在氣血之虛。漿行而收獨早。險也。此險在毒熱之甚。將收痘皮不能堅寔。是必易於損破。則氣洩而漿難成。險也。此險在元陽之不足。抑或痘根赤艷。亦險也。此險在血分。其毒未盡化。抑或水泡雜於痘中。亦險也。此險在脾虛多濕。此等險則真險矣。然雖險而不夾雜他症。雖險亦可醫也。

灌漿逆症

夫險且難免於灌漿之時。則能無逆乎。試詳陳其症。症至行漿之時。

氣血卽虛弱不能領載其毒。非逆也乎。又或漿未成而腐爛。或行漿時而瘳。非逆也乎。不但此也。且有壳空而無漿者。有稠密不分顆粒。而復乾枯而無漿者。甚有痘出大稠密。而眼目不封者。更有起脹之時。其目已閉。行漿之時。目忽然大開者。此皆灌漿之逆症也。凶也。醫者誌之。

灌漿治論

痘至灌漿。計日已八九矣。其至取靨。不亦近乎。所有伏毒。不盡出乎斯時也。痘家宜可以少寬其憂疑。醫者宜可以少寬其調治。然而未

也。憶斯時必膿漿充足。顏色蒼蜡。絕無他症。乃勿治而勿藥可也。若灌漿而不如期。且板硬乾黃。或灰滯紫黯。乾枯。此毒火傷其氣血。故漿不行。宜以清毒活血湯主之。在形氣壯寔之人。則當去參芪。若更便秘。可加大黃微利之。痘當灌漿之時。地界紅紫。痘形焦黑。而漿不行。此毒火熾盛。氣血錮滯也。宜以荆防敗毒湯主之。若壯寔之人。則用歸宗湯。加歸尾。紅花。紫草。犀角。黃連。山甲。地丁。主之。又有其色淡紅。或頂凹陷。又無膿漿者。此氣血虛弱。失其領載之功。宜用千金肉托散。或參歸鹿茸湯主之。如有皮薄漿清。根色無紅暈者。此氣虛血縮之候。急以參歸鹿茸湯峻補之。若無參茸。以大補元煎。或十全大

滿延至是時飲食多減。痰液甚多。豈無慮乎。即宜以養胃開痰湯主之。抑或此時漿滿。以偶失調。護被寒侵。而爲寒縛。一時痘俱紫黑。如紫葡萄色。然是可憂也。而亦不必驚惶。但急以上肉桂磨熟水。或煎湯服之。立見如舊。有寒戰咬牙者。此真氣外發。而內虛寒也。宜用建中湯大補之。立愈。蓋胃寒則咬牙。肺寒則寒戰故耳。痘當成寔而忽。壳中流出清水。此氣至而血不隨也。治當益營。以四物化毒湯主之。或內含清水。平塌不起。此血至而氣不隨也。治當益衛。以保元化毒湯主之。或巢囊浮腫。中含清水。如水泡之狀。此氣血俱虛之候也。治

當營衛并固。以十全化毒湯主之。痘至成膿。此收功之時。手足常要
和緩。若大寒大熱。六腑秘結。狂妄煩燥。口乾作渴。其脈洪數沉緊者。
寔也。手足熱。本病也。若手足冷。陽極似陰。謂之陽厥。下之勿疑。輕用
荊防地黃湯。加大黃微利之。甚用承氣化毒湯主之。若曾經吐瀉。其
脈沉細微弱者。虛也。手足冷。本病也。若手足熱。乃陰極似陽。謂之陰
厥。宜以回陽化毒湯主之。有吐利並作。而手足冷者。亦以回陽化毒
湯主之。有吐或瀉者。成漿時。大不宜之候。宜分別治之。吐而無物。惡
証也。此由衝任之火。上衝於胃。直犯清道而逆出之。爲不治。吐而有
物者。用養胃化毒湯和之。若瀉。須視其所出之物色。何如。色黃而臭。

治此脾胃將絕之候。宜附子化毒湯。有無時。瀉泄手足和緩。飲食如常。雖治之不止。亦可無妨。痘色灰白。本爲膿之正色。亦由氣之不足。宜大補化毒湯主之。若因泄瀉而灰白者。宜固本化毒湯主之。若痘氣腥臭。此有濕熱。宜解其標。內服解肌化毒湯。外以益元散薄敷塗上。勿令至於潰爛可也。痘至成漿。最防搔癢。然作癢而人清爽。自知慢行抓破。或言欲人附之者。吉。若癢而煩燥。悶亂。語之不聽。禁之不止。搖頭扭頸。手足舞亂者。凶。治法。其人清爽。搔癢不住者。當視其形體虛寔。未曾吐瀉者。以四聖化毒湯主之。若元氣弱而有吐瀉者。宜

參歸化毒湯主之。又看其抓破復灌成漿者。吉。扭破而不灌。且肌肉焦黑者。不治。痘出稠密成漿之時。昏昏而睡。呼之不醒。口中喃喃。妄語。如被邪祟之狀。時人不知。多生驚怪。殊不知此由膿血出多。心腦空虛。神無所附。須養血安神。病當自退。宜以寧神化毒湯與安神丸相併服之。痘出之初。腹痛爲毒瘡成。無膿而腹痛。則未可以爲毒也。當審大便與飲食何如。倘未得其便。此燥屎在裏而痛。宜大黃化毒湯微利之。甚不可拘於首尾。不可下也。若因誤傷生冷。或飲冷而痛。宜溫中化毒湯煖之。立效。凡痘順症。表裏無邪。膿血已成。可無患矣。若忽然腹脹氣喘。色變而煩悶者。必傷食得之也。何以知之。以其痘

盛攻於口齒。上下唇俱掀腫。口內牙牀舌上皆糜爛。且有臭氣。此時
急於清毒活血湯內。去人參。加天花粉一錢五分。煨石膏三錢。一劑
而臭氣少減。再劑而穢氣全無。牙疳之患可以免矣。曾見患此症用
此方。加減調治。由是唇腫漸消。痘漿充滿。潰爛膿水淋漓。用松花粉
鋪於席上。方能成痂。幾一月始獲全愈。足漿之後。有身涼而汗不止
者。歸芪湯主之。足漿之後。兒小痰多用白附子熟水磨服。此通論灌
漿之症治也。第病以葯治。而病之先能調護得法。不倚葯治。則更爲
美。出痘之家。可不慎哉。集成有曰。凡痘分三等。有順有險有逆。順者

不須治險者治之逆者無可治。今除險逆不必論。然順者亦有成漿之日。反變爲險逆者。此何故也。蓋有先調理觸犯禁忌。誤服湯丸。恃其輕少而不調護。故令輕者變重。此人事之害也。又有只出一二痘而殞命者。厲氣使然也。豈人能逆料者哉。

証治歌

日期八九痘生漿。收靨時逢毒豈藏。調理憂疑何可少。痘家醫者要相商。膿充色蜡無他症。勿藥誰云不自量。若是灌漿期不合。黯枯板滯及乾黃。火傷氣血漿行少。清毒活血湯投最善良。氣壯參芪方可去。更加便秘大黃臧。痘形焦黑紅而紫。漿不行兮毒火傷。宜以荆防

通氣血如人壯其足

地丁加入湯中是妙方或色淡紅兼頂陷無膿失領莫徬徨千金內

托散參歸鹿茸湯主皮薄漿清善治望紅暈根無虛縮候參歸鹿茸

湯峻補急宜膏參茸若缺大補元煎進妙劑十全大補湯不我戕痘

或密稠漿不滿痰多食減費周章即宜養胃開痰湯進寒縛寒侵肉

佳將寒戰咬牙真氣發建中湯進保安康痘當成寔流清水四物化

毒湯益營血遂洋清水內含平不起保元化毒湯氣宣揚囊囊浮腫

虛之候十全化毒湯拔氣血完洪數緊沉原是寔病名陽厥下難忘

荆防地黃湯輕用加大黃利承氣化毒湯重宜妙主張微弱細沉經

吐瀉病各陰厥要回陽

化毒湯

或兼吐利回陽

化毒湯

主吐瀉成漿

大不祥。無物不治。清道犯有投養胃

化毒湯

自沾光便分大小如黃

赤香連

化毒湯吞葶藶當瀉泄無時脾胃絕湯投附子

化毒湯

匪慌

忙痘膿灰白宜充氣大補

化毒湯

湯投不是狂泄瀉相因始灰白湯宜

固本

化毒湯

乃如常解肌化毒

湯

除腥臭外用益元散

潰爛防抓破

痘漿言附吉搖頭扭頸要端詳氣強四聖

化毒湯

參歸

化毒湯

弱皮

肉黑焦命不長妄語喃喃如被祟安神

九聖神

化毒湯

併能匡無膿

腹脹原非毒化毒湯投是大黃生冷悞傷兼厥冷溫中化毒白掌皇

邪驅表裏原無患脹喘悶煩必受殃痘症相知非妄語助脾化毒

湯

因亡羊長紫除症層搬腫清毒

陳參茸滋補石料不費力

便口中穢氣自消亡。淋漓膿水松花用。止汗歸芪湯是。約王兒小痰。
多磨附子。善爲調護。在爹娘湯丸。悞服由人事。謹慎醫人獨擅長。顯
粒稀疎而殞命。誰能逆料厲難禳。

方

歸芪湯

當歸身

三小

黃芪

二小
蜜炙

酸棗仁

一小五分
炒研

石水煎服。

四物化毒湯

治痘已起發氣至而血不至。壳中出清水。

當歸

川芎

白芍

牛蒡子

上薄荷

木通

生地

麥冬

生甘草

右加燈心水煎熱服。

保元化毒湯

治痘血至而氣不至。

人參

炙黃芪

當歸

川芎

荆芥穗

斗子

赤芍藥

防丰

炙草

上薄荷

右梗米一撮水煎服。

十全化毒湯

治血氣俱虛。窠囊浮腫。中含清水如水泡。

人參

白朮

白雲苓

炙甘草

當歸身

白芍 熟地 炙黃芪 上薄荷 枳殼

川芎 牛子

右加生薑大棗水煎溫服。

承氣化毒湯 治痘陽極似陰手足厥冷。

小只寔

紫厚朴

川大黃

酒炒

尖檳榔

生甘草

右加生薑三片水煎滾熱服。

回陽化毒湯 治痘陰極發燥手足大熱。

人參

甘草

炙

白朮

白雲苓

附片

肉桂

右加大棗水煎溫服。

養胃化毒湯。治成漿時吐。嘔而有物。胃虛也。

白朮

陳皮

雲苓

砂仁

薑水炒

蓮肉

右加生薑水煎服。

香連化毒湯。治泄瀉色黃而臭熱也。

南木香

炒黃連

猪苓

白朮

炙甘草

右加燈心十根水煎服。

附子化毒湯。治吐瀉不止。手足厥冷。脾胃將絕也。

熟川附

人參

白朮

炙黃芪

炮薑灰

炙甘草

右加炒米一撮。大棗一枚。水煎。溫合服。