

雜病篇

諸傷

解毒

救急

怪疾

雜方

東醫西寶鑑

十七

東醫寶鑑雜病篇卷之九

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

諸傷

金刃傷

金瘡腸斷者視病淺深各有生死腸一頭見者不可連也若腹痛短氣不得飲食者大腸一日

不治證

難過不治證凡被傷透內者。腸傷斷一半可

半死小腸三日死腸兩頭見者可速續之先以鍼
縷如法連續之斷腸便取鵝冠血塗其際勿令氣
泄即推納之但出不斷者作大麥粥取汁洗腸以
漬納之且作粥清稍飲之二十餘日乃喫糜粥以
百日後乃可進飯。○金瘡失血其人當苦渴然
須忍之常令乾食可與肥脂之物以止其渴又不
得多飲粥則血溢出血殺人又忌嗔怒及大言笑
動作勞力及食鹹酸熱酒熱羹輩皆使瘡痛衝發
甚者即死。○凡金瘡及折傷不可
飲冷水血見寒則疑入心即死。○

○醫全不可治。○小腹下傷內者。○證候繁多者。○脉不實重者。○老人左股壓碎者。○傷破陰子者。○用藥。○血出盡者。○肩內耳後傷透於內者。○皆不必。○髀內陰股兩乳上心鳩尾小腸及五藏六府俞。○皆死。○處又破腦出髓而不能語戴眼直視喉中沸。○聲口急。○啞出兩手。○妄舉。○皆不治。○

金瘡脉候

金瘡出血太多其脉虛細者生數實者死。○金瘡出血脉沉小者生浮大者死。○斫刺出血。○

不止脉來大者七日死。○滑細者生。○細者生。○金瘡出血。○虛細則宜實大則傾。○傷雖淺。○命脉虛促可慮。○傷至重。○命脉和緩永無慮也。○血出。○甚者脉不要洪大只要平正重實。○

腸肚傷治法

可治。○腸出在外若腸全斷難醫。○不斫者。○

白皮尖茸為線以花蕊石散付線上從裏縫之。○腸子則以清油熬活放入肚內乃縫。○肚皮不可縫。○外重皮留皮開用藥。○糝待生肉。○散。○傷破。○肚皮腸與脂膏俱出先用湯藥如法。○血散。○手散。○與服。○

用手擘去膏不妨此是開肉放心去之然後推腸入內用線縫之仍服通利藥勿令二便秘澀

金瘡先宜調血
大凡金瘡及折傷墜內損者必有瘀血停積先宜逐去瘀血若亡血過

多則調養氣血為主
傷至重者海味中鹹白鯽成片鋪散導滯散破血消痛湯復元活血散等可選用

止血生肌合瘡藥
在傷處以帛扎定血立止

血收口方白膠香老松皮白芷血竭為末付之單
血竭末付之尤妙○黃丹滑石末付之夏月以薄

荷葉貼之一日一次以藥水湯洗○金瘡散
付神效藥○金瘡血不止黃丹白礬為末糝之又

下子蚕蛾燒灰付之
勢火煨為末酒調服昔有一人自割其勢瘡久不

合用此方不
數日而愈

箭鏃及金刃中骨脉不出
白鯽半夏等分為末每取一錢淡薑湯調服日三至

二十日自出
水塗其上又螻蛄取汁頻塗又鼠腦塗之又好磁

石着其上
自出煙

救急方

金瘡及諸傷重痛悶欲死取牛一隻剖腹納

未醋湯調飲出血而愈或戰陣砲矢所傷血流滿

體氣貫胃膈悶絕者亦甦

活血散

治刀鎗傷腹裂腸出者黃芪當歸川芎白芷

續斷赤芍藥鹿茸黃芩細辛乾薑附子炮各

花藥石散

治一切金刃所傷及打撲損傷牛馬交踢

再服藥便活更不疼痛如藏府有瘀血內損煩悶

欲死服此藥則化為黃水或吐或下泄出花藥

石四兩硫黃一兩為末入瓦罐內鹽泥固濟晒乾

安四方磚上以炭火從巳午時煨至經宿候冷取

出研細每取一大匙童

尿入酒煎熱調服

奪命散

治金刃所傷及從高墮落木石壓損瘀血瘀積心腹疼痛二便不通水蛭以石灰拌炒焦五

錢大黃黑牽牛頭末各二兩右為末每取二錢熱酒調下過數時無效再用一服以下惡血為度

雞鳴散

治金刃傷打撲傷血瘀凝積煩悶欲絕大黃酒蒸五錢當歸尾三錢桃仁二七粒研右

作一貼酒煎雞鳴時服次日下瘀血即愈治折傷亦妙

導滯散

治傷損內有瘀血大便不通壅滯欲死大黃一兩當歸二錢半麝香少許右為末每三錢

熱酒調下

破血消痛湯

治傷損墮落惡血流於脇下痛楚不能轉側水蛭炒烟盡另研三錢柴胡連翹

當歸梢各二錢蘇木一錢半羌活防風桂皮各一錢麝香少許右除水蛭麝香外餘藥剉作一貼酒

水相半煎去滓入蛭麝調服空心兩貼立愈

復元活血湯

治同上大黃二錢半當歸一錢七分柴胡一錢半穿山甲妙研小蓰根甘草各

一錢桃仁十箇為泥紅花五分
右剉作一貼酒水相半煎服

金傷散

採草一切金瘡重午日早朝使四人各出四方

同搗極爛鑿大桑木三兩株作孔納藥實藥以桑皮
皮殺之油調石灰密塗之勿令泄氣更以桑皮填
固至九月九日午時取出陰乾百
日搗羅為末如遇傷慘之神效藥

單方

凡二十種

新汲水

人或被金瘡及損傷腸出以新汲
泉水噴之令身禁腸自入也

石灰

療金瘡甚良人為金刃所傷以石灰末裹之定
止痛止血神效○又石灰和雞子白火煨為末付

瘡立
差

葛根

療金瘡止痛為末付之
又濃煎取汁服之

桑白皮

可以縫金瘡取生皮作線縫腹破腸出者唐
安金藏割腹用此法便愈○神仙刀箭藥妙

不可言藥葉為末乾糝之○
金瘡止痛藥葉灰付之佳料

螻蛄

箭鏃在咽喉骨隔不出螻蛄搗取汁滴上三五度自出○鐵入肉不出螻蛄腦同硫黃研付覺

出并鐵白

蜣螂

箭鏃入骨不可拔微熬已豆與蜣螂同研勻塗傷處待極痒便撼動拔之立出後以生肌膏貼

之○出箭鏃方蜣螂全者麝香少許同為末撥動箭頭糝藥瘡內自出料

旋菖根

即旋花根也合金瘡續斷筋取根搗汁滴瘡中滓封瘡上妙料

象牙

主箭鏃及鐵入肉不出為末和水付瘡上即出舊牙梳尤佳料

蝙蝠

主金瘡出血內漏取二枚燒為末每一錢和水服令一日服盡當下如水乃血消也料

黑虱

主箭頭入肉不出取頭上黑虱及人牙齒同研塗之即出料

慈

治金瘡因驚出血不止取慈葉熱按取汁付之血即止○金瘡中風水腫痛慈葉煨研罾付立愈

小麥

主腸出不入小麥五升水九升煮取四升去滓令極冷使人含巽瘡上又巽其背腸漸自入勿

見令衆人

石榴花

治金瘡血流不止石榴花和石灰搗為末糝之血便斷

壁錢

汁主金瘡血不止取點瘡上良

鼠腦

治箭鏃及鍼刀在咽喉骨膈諸隱處不出取生鼠腦及肝搗付之即出

紫檀香

治金瘡急刮紫檀末付之止痛至妙

血竭

療金瘡止血止痛生肌最妙刮屑付之但性急不可多用

琥珀

止血生肌合金瘡作末付之○中弩箭悶絕琥珀末一錢童尿調服妙

蛇含草

主金瘡搗付之佳○又云蛇含膏連已斷之指

青蒿生接付金瘡止血

熟艾或搗金瘡止血或熏烟亦好

小蘗主金瘡血不止

藍葉汁金瘡血悶取

車脂鐵入肉不出取車軋脂攤紙上

顛撲墮落壓倒傷凡墮壓死者急安好處以袖掩其口

之若初覺氣絕急擊開口以熱小便灌之利去痰

血得卒墮顛壓倒打死心頭溫者皆可救將本

人如僧打坐令一人將其頭髮控放低以半夏末

或皂角末吹入鼻內如活却以薑汁香油打勻灌

之。人若取藥不及急吹開口以熱小便灌之

筋骨皮肉皆出血不止或瘀血停積若去之不早

則有入腹攻心之患

血黃連降火白朮和中以童便煎服妙傷在上宜
飲韭汁。凡顛打壓傷或從高墮落皆驚動四
肢五臟必有惡血在內專怕惡心先用通二便藥
和童便服之立效。大小腸俱通利則自無煩悶攻
心之患矣。○凡傷損專主血論肝主血不問何
經所傷惡血必歸於肝流於脇脅於腹而作脹痛
實者下之宜通導散桃仁承氣湯散寒調之奪命散
上虛者復元活血湯。○凡傷者難治宜用蘇木煎湯
出血已多而又嘔血不止者難治宜用蘇木煎湯
調蚌霜散服之。○諸傷疼痛宜乳香定痛散。○蘇
香散雙烏散尋痛元陣王丹補損當歸散。○蘇
合香元治打撲墮落挾驚悸氣血錯亂昏迷不省
急取三五丸溫酒童便調灌即甦。○方觀瀾門
上有傷或打破或金刃傷用藥糊角縛不使傷風
慎之

通導散

治傷損極重大小便不通心腹脹悶宜用此

仁各一錢厚朴陳皮木通枳殼甘草各五分右
剉作一貼水煎空服。○一名大成湯。○

當歸鬚散治打撲損傷致氣凝血結胃腹脇痛當歸

錢紅花八分桃仁七分桂皮六分甘草五分右剉作一貼酒水相半煎服

蚌霜散治傷損大吐血蚌粉百草霜各等分右為末每二錢糯米飲調服

乳香定痛散治諸傷損疼痛白芷當歸生芩牡丹皮赤芍藥川芎乳香沒藥白朮甘草各等

分右為末每二錢溫酒童便各半調勻服之

乳香散治打撲傷損痛不可忍白朮炒當歸炒白芷桂皮乳香沒藥甘草各等分右為末每二錢

溫酒調下

雙烏散治諸傷百損久後時常疼痛者及新被傷作痛亦宜川烏草烏略炮各三錢當歸白芍藥

蘇木大黃生乾地黃紅麴炒各五錢麝香少許右為末入瓦瓶以酒煮放冷服如覺麻痺無言但草

烏生用恐太猛所以畧炮

尋痛元

治諸傷止痛清心行氣活血如神草烏生用乳香火炙沒藥火炙五靈脂各三錢生麝香

少許右為末酒糊丸如指頭大朱砂

為衣每一丸薄荷湯薑汁磨化服

陣王丹

治諸折傷止血定痛入黃一兩石灰六兩右同炒紫色為度去火毒烏篩為末敷傷處妙

門八

補損當歸散

治墮撲折傷疼痛連川芎一兩半桂心川

板當歸甘草各七錢半附子炮澤蘭各二錢半右為末每二錢溫酒調服效如神

打撲傷消腫滅癰

九闔毆被打成破傷風頭面腫大發熱以九味羌活湯點

汗外用杏仁搗爛入白麴少許新汲水調付瘡上腫即消春○治傷損腫痛瘀血流注紫黑或傷眼

上青黑不○散大黃為末生薑汁調付患處即消名將軍膏○散被毆癰痕亦治跌撲麻油清酒各

一枕同煎數沸服之服了川火燒熱地上一夜痛止腫消無痕有被傷者仇家陰令街士以此治之

次日驗審了無一毫傷痕。打撲傷。凡膚青腫。

酒調二錢服。夜消盡無痕。

脉候及不治證。凡打撲損傷。內有瘀血。其脉堅強者生。

當虛細若得急疾大數者死。打撲傷損去血過多。脉骨者可治。內損藏府裏膜及破陰子耳後者並不治。

治總看叶。不脈證。如傷藏府。致命處一觀其脉虛促亢矣。

單方。凡十種。

蒲黃。治撲損瘀血在內。煩悶。蒲黃末三錢。熱酒調下。粥。

白楊樹皮。治撲損瘀血。痛不可忍。取對皮酒漬。服之。乾。

生龜。治撲損。厚塗傷處。立效。乾。飲之。

蟾蜍。主打撲。跌折。血在脇下。堅滿。痛。取汁和酒服。又研付傷處。乾。

鼠屎

治落傷筋骨痛不可忍取屎燒為末猪脂調急裹之不過半日愈

荷葉

治打撲落傷惡血攻心悶亂乾葉燒為末童便調服

利下惡

胡桃

壓撲傷損胡肉搗爛和溫酒頓服便差

麻根

主打撲落傷或煮服之非時則取乾麻煮汁飲

稻稈

灰淋取汁乘溫淋洗痛處立差

芥子

微煖塗貼患處即效

葱白

治打撲傷損痛不可忍取葱白入塘火煨乘熱

研付之痛立止且無癢痕

人尿

主撲損落傷瘀血攻心暈絕熱尿頓服一二升即愈

烏雞

摧折氣悶欲死烏雞一隻合毛拚一千下和苦

酒一升得所以新不搗病處取藥塗布上雞神效

對

烏鴉羽

治墮落損傷瘀血脹心面青氣短尿右

大膽

治撲損刀箭傷內有瘀血取膽熱酒調服瘀血

亦奇效

酒糟

主打撲墮落損傷瘀血腫痛

水蛭

主墮撲落傷折傷內有瘀血水蛭炒焦為末

骨折筋斷傷

凡脚手各有六出白四折骨每手有三處

互相鎖或出白則外則須鎖入內若出內則須骨於

入外方入窠臼只用手拽斷難入窠臼十有八九成

法整頓歸元先用麻藥與服使不知痛然後可用

手法一邊不用夾須存屈直處時時拽屈拽直不然

則愈後曲直一得○凡骨碎者須用麻藥歸元

與服或用刀割開甚者用剪剪去骨鋒使不傷破

肉或有粉碎者與去細骨免膿血之禍且以藥水

一日一洗莫令臭穢○凡骨碎者用接骨藥火

上化開糊骨上然後夾定○外骨碎者用法活血散接

骨丹二生膏糯米膏內服麥斗散沒藥降聖丹接

骨散自然銅散擦骨紫金丹○淋洗用蔓荊散

草烏散即麻藥也凡骨節出白用此麻之然後用手

歸川芎川烏各一兩二錢半草烏白芷半夏烏藥當

二錢半木香一錢並無煨製右為末諸搽骨節出

白窠者每服二錢好紅酒調下麻倒不識痛處然

後或用刀割開或剪去骨鋒以手整頓骨節歸元

用夾夾定然後醫治如箭鏃入骨不出亦用此藥

麻後或釗出或鑿開取出然後取鹽湯或鹽水與