

武昌醫館叢書

三一



仲景傷寒補亡論卷第七

河 南 郭 雍 撰 次

太陰經證治十條
少陰經證治四十七條

厥陰經證治六十三條

太陰經證治十條

仲景曰脈尺寸俱沈細者太陰受病也當四五日發
以其脈布胃中絡於噎故腹滿而噎乾龐氏云宜大
承氣湯下之雍謂更當詳證而後可下此卽仲景辨
太陰之說也未可遽下



又曰太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹
自痛若下之必胸下結鞭雍曰若太陰本證藏寒自
利不渴當依仲景溫之以四逆輩若本太陽病因誤
下腹痛轉屬太陰者依仲景用桂枝加芍藥湯以太
陽誤下表證未解也

又曰太陰中風四肢煩疼陽微陰濇而長者爲欲愈
又曰太陰病欲解時從亥至丑上

又曰太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯

又曰自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之



宜服四逆輩

又曰傷寒三日太陽脈弱至四日太陰脈大龐氏云脈大而胸滿多痰者可吐之無此證者宜汗之雍曰吐用瓜蒂散汗用桂枝湯仍須脈浮則可汗也

又曰傷寒脈浮而緩

龐氏云亦大之類

手足自溫者繫在太

陰太陰當發身黃

龐氏云小便不利者必發黃以五苓散加茵陳主之

若小便

自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也龐氏云可類要四

味橘皮湯



又曰本太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯主之

又曰太陰爲病脈弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也校正云下利者先煎芍藥二沸雍曰以脈弱故知胃氣弱也

少陰經證治四十七條

仲景曰脈尺寸俱沈者少陰受病也當五六日發以其脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴龐氏云



宜大承氣湯雍曰未可也更宜詳餘證可下則下之
又曰少陰之爲病脈微細但欲寐也

又曰少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而
渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰
病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令

色白也常氏云可四逆湯甘草乾薑湯

金匱方

又曰病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰
法當咽痛而復吐利常氏云可豬膚湯雍曰少陰有
伏氣病亦如傷寒法先咽痛次必下利與前證相似



古人謂之腎傷寒其病輕不傳經治法不可同咽痛則半夏桂枝甘草湯下利用四逆湯二三日卽愈又曰少陰病欬而下利譌語者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也常氏云桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯以救火逆豬苓湯五苓散以通小便

又曰少陰病脈細沈數病爲在裏不可發汗

又曰少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱濇者復不可下之雍曰可附子湯



又曰少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反去者爲欲解也雖煩下利必自愈

又曰少陰病下利若利自止惡寒而踰臥手足溫者可治常氏云可當歸四逆湯

又曰少陰病惡寒而踰時自煩欲去衣被者可治常氏云吳茱萸湯雍曰凡少陰病煩躁者不可下先服吳茱萸湯以煩躁非實熱且手足多逆冷也

又曰少陰中風脈陽微陰浮者爲欲愈

又曰少陰病欲解時從子至寅上



又曰少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至者灸少陰七壯常氏云少陰太谿穴也龐氏云言發熱者謂其身發熱也太谿穴在內踝後跟骨上動脈陷中

又曰少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也常氏云可桃仁承氣湯芍藥地黃湯

未見方

又曰少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭爲難治常氏云可芍藥地黃湯雍曰仍灸太谿三陰交及湧



泉穴

又曰少陰病惡寒身踈而利手足逆冷者不治雍曰
灸太谿等穴仍服四逆湯

又曰少陰病吐利躁煩四逆者死龐氏云煩躁者內
煩躁也與吳茱萸湯正宜細審其生死也又曰凡少
陰四逆者宜溫之雍曰此正仲景吳茱萸湯證不當
不治仍灸太谿

又曰少陰病下利止而頭眩時時自冒者死龐氏云
此當是少陽冒昧汗濺然出脈勻小浮者少陰無眩



冒之證雍曰千金翼作少陰

又曰少陰病四逆惡寒而身踈脈不至不煩而躁者

死

千金翼同一作吐利而躁逆者死

龐氏詳定云吐利煩躁者死雍

曰吐利煩躁四逆者死已見前證不應重出此正謂

不煩而躁屬利證也更宜吳茱萸湯當歸四逆加吳

茱萸湯仍灸太谿穴

又曰少陰病六七日息高者死

又曰少陰病脈微細沈但欲臥汗出不煩自欲吐至

五六日自利復煩躁不得臥寐者死



又曰少陰病始得之反發熱脈沈者麻黃附子細辛湯主之龐氏曰少陰病脈沈不知何沈也且沈緊發汗則動經沈數爲病在裏不可發汗此脈或沈而濡或沈而微是表中寒而裏不消脈應裏而發在表故以細辛之藥溫散而取汗也

又曰少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也龐氏曰謂初得病二三日常見少陰證無陽者須發小汗也

又曰少陰病得之二三日以上心中煩不得臥黃連



阿膠湯主之

又曰少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之常氏云當灸膈俞關元穴背俞第三行雍曰此有漏字當是灸膈俞及關元穴也膈俞是背俞第二行穴

又曰少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沈者附子湯主之

又曰少陰病下利便膿血者桃花湯主之

又曰少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利



不止便膿血者桃花湯主之

又曰少陰病下利便膿血者可刺常云刺幽門交信
雍曰宜灸

又曰少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯
主之雍曰凡少陰病四逆而煩躁者未問其餘證先
宜服吳茱萸湯四逆而無煩躁證者先宜服四逆湯
四逆下利脈不出者先宜服通脈四逆湯此三者治
少陰證大要藥也

又曰少陰病下利咽痛胸滿心煩者豬膚湯主之



又曰少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗湯龐氏云半夏散亦主之

又曰少陰病咽中痛半夏散及湯主之

又曰少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

又曰少陰病下利白通湯主之

又曰少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加豬膽汁湯主之服湯脈暴出者死微續者生



又曰少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利
四肢沈重疼痛自下利者此爲有水氣其人或欬或
小便利或下利或嘔者眞武湯主之雍曰眞武湯不
愈者小青龍湯

又曰少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲
絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛
或利止脈不出者通脈四逆湯主之

又曰少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹
中痛或瀉利下重者四逆散主之



又曰少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者
豬苓湯主之

又曰少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大
承氣湯

又曰少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者
急下之宜大承氣湯

一法用大柴胡

雍曰惟口乾燥一證見

熱更當細詳其餘證方敢用

又曰少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承
氣湯