

百代医宗

四

刻太醫院須行内外諸科方論百代醫宗目錄

甲集卷之一

原病賦

諸証綱目論

亢則害承乃制論

古養論

真中風河南山東風土之氣論

類中風証論

類中風江西浙江楚地南直四處地方總論

火証方論

飲食勞倦論

辯筋骨四肢論

氣少之氣短論

失聲啞聲不同論

酒病論 聲音論

手背手心辯熱論

氣升論

隨証治血藥論

隨証治火藥論

木腎論

腎癢論

內外因脈歌

不內不外因脈歌

血榮氣衛論

火濕分治論

治病必求其本論

受胎論

婦人病原論

經病論

崩漏論

赤白帶下論

胎前論

胎前諸症論

產後三証論

硬乳論

藥性賦

乙集卷之二

診脈切要

左右手寸關尺三部診法  
上下來去至六脈解

七種怪病歌

驗止斷死歌  
五臟六腑人迎氣口分別論

四字脈訣

浮沉遲數診脈切要訣  
十二支年分運氣

五運時行民病証治方畧

六氣時行民病証治方畧  
六氣爲病切要

五運主病切要

按四季順時節宣論

十二經見証切要

十二經絡臟腑病情藥性切身要錄

天干臟腑所屬定位

地支臟腑所屬流注

藥方名條治病捷應賦

瘡門捷徑用藥法

六經用藥確法  
五味用法

用藥根身稍三法

五入五走

五多五傷

養煉鹿角霜膠法

辯用硝黃巴豆悞人論

治十腫水氣病根主藥

丙集卷之三

風論 該傳大附子性

寒論

瘟疫論

附中寒論 夏論

附注夏論

濕論

燥論 火論

六鬱論

痰論

咳嗽論 哮論

喘論

丁集卷之四

瘡論 痢疾論

嘔吐論

泄瀉論

霍亂論 水腫論

陰腫論

脹滿論

積聚論 癥瘕論

虛損論

虧瘵論

怔忡論 癲狂論

諸癇論

血論

五痺麻木論 枝結論

黃疸論

戊集卷之五

剛柔二症論

翻胃膈噎論

頭痛論

腹痛論

腰痛論

腸痛論

腳氣論

痛風論

痿論

盜汗自汗論

厥論

三消論

內傷論

吞酸吐酸論

新增木腎論

便濁遺精論

新增漏濁論

## 已集卷之六

淋閉附遺尿小便不禁論

欬逆論

嘈雜論

痞滿論

邪祟論

眩暉論

惡心論

惡寒論

發熱論

諸氣論

丹溪活套云

傷食論附傷酒方

閑格論

結核論

梅核論

癟風論

跌撲傷損論附金瘡湯火等瘡

破傷風論

心痛胃脘痛論

注夏論

胃風論

脫肛論

腸風臟毒論

痼冷論

與集卷之七

耳論

鼻論

牙齒論

面論

眼科所用藥性

目論

鍼灸類

服藥合藥煎藥訣

用蜜煉蜜法

點眼藥訣

各臟所屬宜用某方并附詩歌

咽喉論

目疾証候

辛集卷之八

婦人科總論

疝瘕論

血風肢體骨節痛疼論

痃痃論

血膈論

經脈論

崩漏論

赤白帶下論

胎前論

期嗣論

轉胞論

產育論

生產分症七產論

產後論

附血水分論

產後脈法病機要畧

謹接伯岐論

乳汁不通論

附婦人陰瘡交接出血陰挺陰癰陰蟲等症論

小產論

附產後一十九症問答奇方出自葛塗亭秘書

頸項強痛論

口舌唇三論

丹溪活套

流注論

赤白遊風論

壬集卷之九

小兒脈法總歌 小兒科論

五癟論

諸瘡論

黃疸論方 遺尿尿濁二論

語遲牙遲行遲總論

膾耳論

癬疾論

附小兒五疳病源妙方

附錢仲陽小兒諸疳論

諸蟲論

蠱毒論

鼻病論

大小便閉論

桃生論

吐瀉論

腹脹論

啼論

解顱論

脫囊論

脫肛論

瘤論

美舌論

鼈背論

癸集卷之十

痘疹論

疹論

外錄痘疹方論于后

附陳氏痘瘡症

方論

痘疽瘡瘍論

乳硬乳瘡論

痔漏論

瘻論

疔瘡論

楊梅瘻論

背發腦發鬢發此發四總論

赤癰論

膿瘡論

鎖喉瘡論

赤癰瘡論

纏脣瘡論

骨槽風瘡論

五疳論

喉閉瘡論

火殞瘡論

火赤瘡論

魚脊瘡論

陰觸瘡論

漏睛瘡論

鴉踏瘡論

紅絲瘡論

鼎鍼太醫院頒行内外諸科方論百代醫宗卷之四

太醫院醫官 金谿

省吾

涂紳

著述

振吾

張文英

參訂

金陵

少泉

李潮

刻行

瘡論

夫瘡者曰外感風寒暑溫內傷飲食勞倦或飲食饑飽色慾過度而成也其始發之時有欠伸戰慄或頭疼渴飲或先熱後寒或先寒後熱或單寒單熱或寒多熱少或熱多寒少其爲患不宜審經治之若在足太陽經爲寒瘡法當汗之在足陽明經爲熱瘡法當下之在足少陽經爲風瘡法當和之此三陽受病謂之暴瘡發在夏至之後處暑之前乃傷之淺也其在三陰經者總云濕瘡發在處暑之後冬至之前乃傷之重也其三陰經之瘡發於子午卯酉日者足少陰之瘡也發於寅申巳亥日者足厥陰之瘡也發於戌辰丑未日者足太陰之瘡也其治之法當

發散外邪有汗有無汗無汗者要有汗散邪爲主有汗者要無汗正氣爲先然散邪正氣病不見退者必須分利陰陽以柴苓湯最捷又有云風瘧者自感風而得惡風自汗煩燥頭痛轉而爲瘧寒陽氣也故先熱後寒可以解散風邪如川芎白芷青皮紫蘇之類或細辛檳榔佐之溫瘧一証亦先熱後寒此爲傷寒壞病與風瘧大畧相同熱多寒少小柴胡湯加官桂寒瘧自感寒而得無汗惡寒癉痛面慄轉而爲瘧寒陰氣也故先寒後熱可以發散寒邪生料五積散倍桂養胃湯或良薑乾薑官桂草果之類甚則附子理中湯薑附湯暑瘧者暑勝熱多得之一名瘧瘧陰氣獨微陽氣獨盛但熱不寒裏實不洩煩渴且嘔肌肉消鍛可用小柴胡湯香薷散嘔者用縮脾飲加生薑煎服濕瘧者冒製雨濕汗出澡浴得之身體重痛嘔逆腹滿用五苓散除濕湯加蒼朮茯苓葷量良壯瘧者久受陰濕陰盛陽虛陽不能制陰所以寒多不熱氣虛而洩悽慄振振宜柴胡桂薑湯減薑芩加以半夏施之爲當食瘧一名

瘡飲食

飽有傷所致凡

生冷甘肥入於中脘而生痰轉爲食

瘡其狀饑

能食食則中滿嘔逆腹痛宜用青皮陳皮草果半夏砂

仁白豆蔻作劑或用四獸湯下紅丸子自有奇功瘡瘍者挾山嵐溪毒

之氣燥濕不常人多瘡瘍其狀血乘上焦令人迷困甚則發躁狂妄亦

有啞不能言此由敗血瘀於心毒凝聚於脾坡僂指爲脾胃實熱所致

須用涼膈疏通大腸小柴胡湯加大黃治瘡瘍木香丸觀音丸主之選

而施用或以截藥而收功其截又不愈者因氣血太虛必當扶胃氣爲

本益瘡之在陰分者難治在陽分者易治瘡之在陰分者又當提起陽

分用升麻柴胡川芎蒼朮之類升起其氣方可用截法所以人之一身

木衛晝行二十五度脊與背也夜行二十五度胸與腹也以其食積痰

飲稽留胸膈久而膠固致使氣血滯碍或寒而無熱或熱而無寒或無

汗者宜開鬱豁痰爲主用人參養胃湯草果飲子之類以發散爲主或

熱多而寒少或有熱而無寒或有汗者宜清熱補虛爲主宜白虎加桂

枝湯小柴胡湯之類以發散之則用截法須逐一審詳慎不可孟浪

柴平湯 治諸瘧神効此方小柴胡合平胃散是也

柴胡 半夏 人參 黃芩 陳皮

厚朴 茶末 甘草

右切一劑薑煎宜五更服

清脾飲 治脾瘧脈來弦數寒多熱少或熱多寒少口苦咽乾小便赤

青皮

厚朴各七分

白朮

半夏各一錢

黃芩一錢

草果

柴胡一分

茯苓

甘草五分

右切一劑前服

有汗加白朮茯苓 渴加知母麥門冬天花粉

熱多加柴胡黃芩

寒多加半夏草果

人參養胃湯

治久瘧虛瘧或間一日一發或三五日一發寒多熱少

人參一錢

半夏八分

陳皮八分

甘草五分

茯苓八分

藿香

一錢

厚朴

八分

蒼朮

八分

草果

七分

烏梅

一枚

右切一劑薑棗前宜通口進之忌生冷

草果飲

治寒熱之瘧初愈宜服此進食理脾

紫蘇

草果

良薑

川芎

青皮

甘草

陳皮

白芷

各等分

右切一劑煎服

白虎桂枝湯

治濕瘧

知母

四錢  
甘草

石膏

二錢

桂枝

二錢

糯米

一錢

右切一劑宜先煎米

祛癰飲

治瘧熱多寒少

前胡

柴胡

各四兩

桂心

桔梗

厚朴

半夏

各三兩

荳蔻

乾姜

甘草

各一二兩

右切每服一兩薑棗煎進

四獸飲 治五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚涎飲與衛氣相搏發爲瘧疾

人參

白朮

茯苓

陳皮

草果

半夏

紅棗

生薑

烏梅肉

各等分

甘草三分

右切一劑宜未發前進藥

散邪湯 治瘧無汗當發汗散邪爲主

川芎

五分

白芷

八分

麻黃

五分

白芍

八分

防風

八分

荆芥

八分

紫蘿

五分

羌活

五分

甘草

一分

右切一劑薑息煎露一宿次早溫服

有痰加南星陳皮

濕加荳蔻

夾食加香附

正氣湯 治瘧有汗當止汗正氣爲先

柴胡

六分

前胡

六分

川芎

三分

白芷

六分

半夏

八分

麥門冬

八分

檳榔

七分

草果

七分

青皮

七分

茯苓

七分

桂枝 五分 甘草 一分

右切一劑薑裹煎預先服

柴芩湯 治瘧分利陰陽和解表裏

柴胡 六分

黃芩 七分

人參 七分

半夏 七分

甘草 二分

猪苓 六分

澤瀉 六分

白朮 七分

茯苓 七分

肉桂 五分

右切一劑薑裹煎服

無汗者加麻黃

有汗者加桂枝

寒多者加官桂

熱多者加黃芩

紅丸子 治食瘧食積氣滯腹脹

三棱

莪朶

青皮

陳皮

各五兩

胡椒 一兩

乾薑 二兩

右爲末醋煮米粉丸梧桐子大暮紅爲衣每服五十丸用二陳湯下四

獸湯任下

木香治瘧丸

牽牛

一斤瓦頭末四  
兩另包藥用

檳榔

陳皮各二兩

青木香

人參

三稜

羌活

獨活

乾薑

甘草

川芎

大黃

白芍各五錢

內豆蔻六枚

右爲末磁器密封臨用稱牽牛末一兩諸藥末共一兩研和煉蜜爲丸梧桐子大每服二十九陳皮湯下以通利爲度

觀音丸 耳下暑毒瘡毒

圓白半夏

生用十枚

烏梅肉

十枚

母丁香

枝

巴豆

不去油十枚

右爲末薑湯和麵丸麻子大上下用厚絲盛益貼住一處見絲上下有油耳易之於綿暗病所用每服五丸臨卧冷水下如神耳妙此方有一舟人於海角遇一白衣人授之 紳擬是

白衣觀音醫此方救人苦難焚香錄之

不二飲 治一切新久寒熱瘧疾一服截之如神

常山

一錢

檳榔

一雄

知母

二錢

貝母

二錢

右切每用六錢酒煎不可過熟熟則不効露一夕臨發日五更溫服忌  
鮮魚休令婦女煎藥

瘡靈丹截瘡神効

五月五日午時用雄黑豆四十九粒先一日以水泡去皮研細入人  
言末一錢同搗爲丸如小梧桐子大雄黃一錢爲衣陰乾收貯臨發  
日早晨面東向用無根水送下一丸忌熱物仍忌畜腥生冷三日其  
雄黑豆者取其豆之圓者是雄之名也

神効飲子 治諸瘡神効

肉豆蔻

二個麪煨  
生用一

草果

二個麪煨  
生用一

厚朴

三寸薑炙  
生用一

甘草

二寸炙三十  
生用一寸

生薑

一塊李炙  
生全

石切一劑五更服不效再進二服

截瘡丹

雄黃

一兩

人參

五錢