

第三十一卷

蟲魚部中品

總五十六種今疏其要者一十七種

蜎皮

露蜂房

鼈甲

蟹

蟬蛻

烏賊魚骨

原蠶蛾

蠶沙附

蠶退

白僵蠶

鰻鱺魚

蛞蝓

蝸牛并入

蜚蠊

塵蠹

青魚膽

石首魚

鱸魚

蝟皮。味苦平。無毒。主五痔陰蝕。下血。赤白五色。血。汁不止。陰腫。痛引腰背。酒煮殺之。又療腹痛。疝積。亦燒爲灰。酒服之。

得酒良畏枯梗麥門冬

細別妙異文
疏○蝟鼠類。屬水。其皮毛戟刺如鍼。屬金。故

味苦平。平卽兼辛。大腸屬金。以類相從。故能治大腸溼熱。血熱爲病。及五痔陰蝕。下血。赤白五色。血。汁不止也。陰腫。痛引腰背。腹痛。疝

積皆下焦溼熱邪氣留結所致。辛以散之。黃以泄之。故主之也。肉味甘平。能開胃氣。止反胃。亦主痔瘻腸風。

主治參夕

同象牙末等。治通腸漏。見象牙條下。衍義
五痔下血。用蝟皮、穿山甲等分。燒存性。入肉
豆蔻一半。空心米飲下一錢。妙。楊氏家藏
方。腸風下血。蝟皮一枚。木賊草半兩。炒黑。爲

末每二錢熱酒調下

簡誤

凡食其肉當去骨誤食令人瘦劣諸節漸小也

露蜂房味苦鹹平有毒主驚癇瘈瘲寒熱邪氣

癰疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良又療蜂毒毒腫

惡丹參 乾薑 黃芩 芍藥 牡蠣 入藥多用

疏○蜂性有毒螫人則痛極以其得火氣之

生亦有毒別錄言賦

當作辛鹹。辛散苦泄。鹹可軟堅。故主驚癇瘳。
癰。寒熱邪氣。癰疾。鬼精。蠱毒。腸痔等證也。療
蜂毒腫者。取其氣類相從。以毒攻毒之義
也。蘇恭以亂髮蛇皮三物合燒灰。酒服方寸
匕。治惡疽。附骨癰根在臟腑。歷節腫。出下腫。
惡脉諸毒。大明煎水漱齒。止風蟲疼痛。洗乳
癰。蜂疔惡瘡。皆取其攻毒散邪殺蟲之功耳。

主治參互

子母秘錄。臍風溼瘡久不瘳者。蜂房燒末傳之効。袖珍方。風蟲牙痛。蜂房一枚。鹽實孔內。燒過。研末。擦之。鹽湯漱去。一方同細辛煎水漱之。又方。喉痺腫痛。露蜂房灰。白殭蠶等分爲末。吹入喉內。或用乳香湯服半錢。濟眾方。女人妬乳。乳癰。汁不出。內結成腫。名妬乳。用蜂房燒灰。研末。每服二錢。水一盞。煎六分。去滓溫服。經驗方。治漏痔。蜂房燒存

性研細。摻之乾。則菜油調傅。

簡誤

蜂房主驚癇瘈瘲。及諸癰疽惡毒。正取其攻散邪惡。以毒攻毒之意。若病屬氣血虛。無外邪者。與夫癰疽潰後。元氣乏竭者。皆不宜服。

鼈甲味鹹平無毒。主心腹癥瘕。堅積寒熱。去痞。

息肉。

陰蝕。痔惡肉。療溫瘡。血瘕。腰痛。小兒臍下。

堅。

要禁者

肉味甘。主傷中益氣。補不足。

惡禁石

五升浸二宿。取出洗去灰後。沈煮爛。去渣盡。以膠用更佳。

忌雞鴨猪肉兔肉雞子

忌菟菜芥菜桃海狗

疏○鼈甲全稟天地至陰之氣。故其味鹹平。

生於水遇蚊叮即死熬甲燒烟亦可辟蚊

無毒。潤下作鹹。象水明矣。本乎地者親下。益

陰何疑。甲主消散者。以其味兼乎平。平亦辛

也。鹹能軟堅。辛能走散。故本經主癰疽。堅積

寒熱。去痞疾。息肉。陰蝕。痔核。惡肉。別錄療溫

瘡者。以瘡必暑邪為病。類多陰虛。木衰之人

乃為暑所深中。邪入陰分。故出併於陽而熱

甚。入併於陰而寒甚。元氣虛羸。則邪陷而中

焦不治甚則結爲瘧母。甲能益陰除熱而消散。故爲治瘧之要藥。亦是退勞熱在骨及陰虛往來寒熱之上品。血瘦腰痛小兒脇下堅皆陰分血病。且其悉主之矣。勞復女勞復爲必須之藥。勞瘦骨蒸非此不除。產後陰脫資之尤急。

主治叅互

仲景鱗甲煎丸治瘧母之要藥。得牛膝當

歸佐以橘皮、何首烏、知母、麥門冬、治久瘧。

同知母、石膏、麥門冬、貝母、竹葉、治溫瘧熱甚。

渴甚、無肺熱病者、加人參、若瘧發熱甚、渴甚。

又寒甚、汗多、發時指甲黯、狀若欲死、并加桂。

枝有神、去桂枝、治痺瘧良、得青蒿、麥門冬。

五味子、地黃、枸杞、牛膝、治骨蒸勞熱甚、則加。

銀柴胡、地骨皮、胡黃連、肉桂向性冷多食損人如食冷及冷酒傷中益氣補。

不足下及夜浮食後即卧者最不宜腹中結熱、婦人漏下、陰虛羸瘦、性冷補。

以陰虛人宜常食之

簡誤

鱉甲、妊娠禁用。凡陰虛胃弱、陰虛泄瀉、產後
泄瀉、產後飲食不消、不思食、及嘔惡等證、咸
忌之。

蟹味鹹寒、有毒、主胸中邪氣、熱結痛、喘、僻、面腫、
敗漆、燒之致鼠、解結、散血、愈漆瘡、養筋、益氣。
爪主破胞墮胎。

食鱉忌柿

橘

寒

荊芥

薄荷

疏○蟹稟水氣以生。故其味鹹氣寒。本經雖云有毒。然今人多食之。卒無害。其有毒者大抵形質怪異。如後文所載諸種。始有大毒耳。外骨內肉。陰包陽也。入足陽明。足厥陰經。經曰熱淫于內。治以鹹寒。故主胸中邪氣熱結痛也。喎僻者。厥陰風熱也。面腫者。陽明熱壅也。解二經之熱。則筋得養。而氣自益。喎僻面腫俱除矣。鹹走血而軟堅。故能解結散血。漆

得蟹則化爲水燒之可集鼠于庭此物性之
相感相制莫能究其義也愈漆瘡者以其能
解漆毒故也瓜性迅利故能破胞墮胎也

主治叅互

日華子產後肚痛血不下者以酒食之筋骨
折傷者生搗炒習之陳藏器續斷絕筋骨

去殼同黃搗爛微炒納入瘡中筋卽連也

寇宗奭小兒解顱不合以蟹螯同白及末搗

塗以合爲度

唐瑤經驗方骨節離脫生蟹

搗爛以熱酒傾入連飲數碗其查塗半日內

骨肉谷谷有聲卽好

董炳驗方中鰱魚毒

食蟹卽解

胡洽方治孕婦僵仆胎上搶心

有蟹爪湯

千金方神造湯治子死腹中或

雙胎一死一生服之令死者出生者安神驗

川蟹爪一升甘草二尺東流水一斗以葦薪

煮至二升濾去滓入真阿膠三兩令烺頓服

或分二服。若人因不能服者。灌入卽活。

簡誤

蟹性冷。能散血熱爲病。故跌撲損傷。血熱瘀滯者。宜之。若血因寒凝結。與夫脾胃寒滑。腹痛喜熱。惡寒之人。咸不宜食。有獨螯。獨目。兩目相向。六足。四足。腹下有毛。腹中有骨。頭背有星點。足斑。目赤者。並有毒。不可食。能害人。被其毒者。冬瓜汁。紫蘓蒜。鼓蘆根汁。皆可解。

之。不可與柿及荊芥食。發霍亂動風。木香汁

可解。孕婦食之令子橫生

蟬殼。味鹹甘寒無毒。主小兒癩。女人生子不出

灰服之。主久痢。一名枯蟬。一名金牛兒。凡用洗去泥并去翅足。漿水煮晒乾用。

疏○蟬稟水土之餘氣。化而成形。其飛鳴又

得風露之清氣。故能入肝祛風散熱。如藥性

論主小兒壯熱驚癇是矣。其主婦人生子不

下者。取其蛻脫之義。治久痢者。以其有甘寒