

類經二十二卷

張介賓類註

鍼刺類

刺胃背腹病

四十

背與心相控而痛。所治天突與十椎及上紀。

素問

氣穴論○天突任脉穴。十椎督脉之中樞也。此穴諸書不載。惟氣府論督脉氣所發條下。王氏註曰。中樞在第十椎節下間。與此相合。可無疑也。上紀如下文。上紀者胃脘也。

下紀者關元也。

胃脘即中脘。胃之募也。為手太陽少陽足陽明所生。任脉之會。

關元。小腸募也。為足三陰任脉之會。故曰上紀下紀。背胃邪繫陰陽左右

如此其病前後痛瀉。胃脇痛而不得息不得臥。

上氣短氣偏痛。脉滿起斜出尻脉。絡胃脇支心

貫鬲上肩加天突斜下肩交十椎下。此詳言上文背與心

相控而痛者。悉由任督二脉之為病也。蓋任在前。督在後。背為陽。腹為陰。故為前後痛瀉等病。其在下者斜出尻脉。在上者絡胃脇支心。貫鬲上肩加天突。左右斜下肩交十椎下。所以當刺

天突。中脘。胃脘。關元等穴。

○病在少腹有積刺皮髓以下。至少腹而止。素問

刺節論○髑字。編考韻篇皆無。全元起本作
髑字。於義亦未爲得。新校正云。當作皮髑。髑字
誤也。其說近理。釋義云。髑。骨端也。此言皮髑以
下者。蓋謂足厥陰之章門期門二穴。皆在橫皮
肋骨之端也。及下至小腹而止者。如足陽明之
天樞歸來。足太陰之府舍衝門。足少陰之氣穴
四滿。皆主奔豚積。刺俠脊兩傍四椎間。此足太
聚等病。○髑。音括。刺俠脊兩傍四椎間。陽之厥
陰俞。手。心主脉氣所及也。按脉要精微論曰。心
爲牡藏。小腸爲之使。故曰。少腹當有形也。然則
厥陰俞能主少
腹之疾無疑。

刺兩髑。季脇肋間導腹中氣。

熱下已

腰骨曰髑。兩髑髑者。謂腰骨兩旁之居

導引也。導引腹中熱氣下入少腹。則病已矣。○髑。音格。又丘亞切。

○病在少腹

腹痛。不得大小便。病名曰疝。得之寒。刺少腹兩

股間。刺腰髀骨間。刺而多之。盡炆病已。

小腹間痛而二

便不行者。為疝病。乃寒氣之所致。當刺少腹者。去肝腎之寒也。刺兩股間者。去陽明太陰之邪也。刺腰髀骨間者。凡腰中在後在側之成。片大骨皆口髀骨。在後者足太陽之所行。在側者足少陽之所行。凡此諸經。皆非寒疝。但察邪之所在者。多取其穴而刺之。俟其少腹盡熱。則病已矣。

○髀。苦瓦切。炆。

居永切。熱也。

○氣滿胃中喘息。取足太陰大指之端。去爪甲

如薤葉。

靈樞熱病篇。○足大指之端。隱白穴也。○薤。音械。似韭而無實。

寒則留。

之熱則疾之氣下乃止

內寒者氣至遲故宜久留其鍼內熱者氣至速

故宜疾去其鍼總候其氣下不喘乃可止鍼也

○心疝暴痛取足太陰

厥陰盡刺去其血絡

心疝者如脉要精微論曰診得心脉而急病名心疝

少腹當有形也取足太陰厥陰盡刺去其血絡者以二經皆聚於少腹去其絡血即所以散其邪也

○中熱而喘取足少陰膈中血絡

靈樞雜病篇○中熱而喘

熱在中上二焦也取足少陰者壯水以制火也膈中血絡即足太陽委中穴取之可以寫火

○小腹滿大上走胃至心淅淅身時寒熱小便

不利。取足厥陰。

淅淅寒肅貌。肝經之脉抵小腹挾胃其支者從肝別貫膈故爲

病如此當取足厥陰經以刺之。

淅音昔。

○腹滿大便不利腹大亦

上走胃嗌喘息喝喝然取足少陰。

腎開竅於二陰其經脉從

腎上貫肝膈入肺中循喉嚨故其爲病如此當取足少陰經以刺之。喝喝喘急貌。○嗌音益。

○腹滿食不化腹嚮嚮然不能大便取足太陰。

脾失其職則食不能化腹滿而鳴氣滯於中大便不調當取足太陰經以刺之。

○氣逆

上刺膺中陷者與下胃動脉。

膺中陷者足陽明之屋翳也。下胃動

脉手太陰之中府也。蓋在中曰胃胃之旁卽謂之下耳。

○腹痛刺臍左右

動脈已刺。按之立已。不已刺氣街。已刺。按之立

已。

臍之左右動脈如足少陰之育俞。足陽明之天樞皆主腹痛。氣街即足陽明之氣衝也。

○腸中不便取三里盛寫之虛補之。

靈樞四時氣篇○小

腸不便者不能化物。大腸不便者不能傳道。大腸小腸皆屬於胃。故當取足陽明之三里穴。邪氣盛則寫之。正氣虛則補之。

○腹中常鳴。氣上衝胃。喘不能

久立。邪在大腸。刺盲之原。巨虛上廉三里。

九鍼十二

原篇曰。盲之原出於脾腧。即脾脈之下氣海也。巨虛上廉三里皆足陽明經穴。按本輸篇曰。大腸屬上廉。此以邪在大腸。故當刺巨虛上廉。若下文之邪在小腸者。則當取巨虛下廉也。○

小腹控臑引腰脊上衝心邪在小腸者連臑系。

屬於脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃。

燠肝散於育結於臍。

控引也。臑陰丸也。小腸連於小腹若其邪盛則厥逆。

自下上衝心肺燠於肝胃引於腰脊下及育臍臑系之間也。育義詳疾病類六十七。○臑音高。

故取之育原以散之刺太陰以予之取厥陰以

下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調

之。

取育原以散之散臍腹之結也。刺太陰以予之補肺經之虛也。取厥陰以下之寫肝經之

實也。取巨虛下廉以去之求小腸之所屬也。○按其所過之經謂察其邪之所在以調之也。○

善嘔嘔有苦長太息心中憺憺恐人將捕之邪

在膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦故

曰嘔膽

憺憺心虛貌邪在膽逆在胃木乘土也膽液泄則苦胃氣逆則嘔故嘔苦者謂

之嘔

取三里以下胃氣逆則刺少陽血絡以閉

膽逆却調其虛實以去其邪

三里足陽明經穴故可下胃氣之逆

又刺足少陽血絡以平其本則膽液不泄故曰以閉膽逆然必調其虛實或補或瀉皆可以去其邪也

○飲食不下膈塞不通邪在胃脘在上脘

則刺抑而下之在下脘則散而去之

上脘下脘俱任脉穴

即胃脘也。刺押而下之。謂刺上脘以寫其至高之食氣散而去之。謂溫下脘以散其停積之寒滯也。鍼藥皆然。○小腹痛腫不得小便。邪在三焦約。取

之太陽大絡。視其絡脉與厥陰小絡結而血者。

腫上及胃脘取三里。邪在三焦約者。三焦下輸

人絡膀胱約下焦也。太陽大絡飛陽穴也。又必視其別絡及厥陰小絡結而血者。盡取去之。以足厥陰之經亦抵小腹也。若小腹腫痛。○飧泄上及胃脘者。又當取足陽明之三里穴。

補三陰之上。補陰陵泉。皆久留之。熱行乃止。陰

之上。謂三陰交穴。脾肝腎之會也。陰陵泉足太陰脾經穴。補而久留之。則陽氣至而熱行。熱行

則泄止矣。

○脹取三陽，飧泄取三陰。

靈樞九鍼十二原篇○脹，腹脹也。飧泄，完

穀不化也。病脹者，當取足之三陽，即胃、膽、膀胱三經也。飧泄者，當取足之三陰，即脾、肝、腎三經

也。○殯，音孫。

○腹暴滿，按之不下，取太陽經絡者，胃之募也。

素問通評虛實論○太陽經絡，謂手太陽經之絡，即任脉之中脘、胃之募也。中脘為手太陽少陽足陽明脉所生，故云。○募，音暮。少陰俞，去脊椎三寸傍

五用員利鍼。

少陰俞，即腎俞也。腎為胃關，故亦當取之。係足太陽經穴，去脊兩旁

各一寸五分共為三寸兩傍各
五痛也刺當用第六之員利鍼○霍亂刺俞傍
五邪在中焦則既吐且瀉藏氣反覆神志繚亂
故曰霍亂俞傍即上文少陰俞之傍志室穴
也亦各刺五痛足陽明及上傍三
足陽明言胃俞也再
之外則意舍也
當各刺三痛

上膈下膈蟲癰之刺

靈樞上膈篇全○四
十八 附膈證治按

黃帝曰氣為上膈者食飲入而還出余已知之
矣蟲為下膈下膈者食晬時乃出余未得其意
願卒聞之
此言膈證有上下之分而復有因氣
因蟲之異也因於氣則病在上故食

飲一入，卽時還出。因於蟲則病在下。故食入時而復出，晬時周時也。○愚按上膈下膈，卽脘食證也。此在本經自有正條，奈何後世俱以脘之關格，認爲膈證，旣不知有上下之辨，亦不知有蟲氣之分，其謬甚矣。○晬，音醉。岐伯曰：喜怒不適，食飲不節，

寒溫不時，則寒汁流於腸中，流於腸中則蟲寒。

蟲寒則積聚，守於下管，則腸胃充郭，衛氣不營。

邪氣居之。

凡傷胃氣，則陽虛而寒汁流於腸中。蟲寒不行，則聚於下管，而腸胃充滿。

也。衛氣，脾氣也。脾氣不能營運，故邪得聚而居之。○管，腕同。郭，廓同。人食則蟲上

食，蟲上食，則下管虛，下管虛則邪氣勝之，積聚

以留。留則癰成。癰成則下管約。

蟲寒聞食則喜而土求之上則

邪氣居之而乘虛留聚以致癰於下腕要約不行故食入晬時復出也癰壅同如論疾診尺篇

曰目窠微癰者義亦猶此

其癰在管內者即而痛深其癰在

外者則癰外而痛浮癰上皮熱

管之內外即言下腕也邪伏於

中故熱見於皮肉之上

黃帝曰刺之奈何岐伯曰微按其

癰視氣所行

察其氣所必由以刺之也

先淺刺其傍稍內益

深還而刺之母過三行

先淺刺其傍氣所及之處稍納其鍼而漸深之

以泄其流行之邪然後還刺其所病之正穴以援其積聚之本但宜至再至三而止不可過也

示其沉浮。以爲深淺。已刺必熨。令熱入中。日使

熱內邪氣益衰。大癰乃潰。

邪沉者深刺之。邪浮者淺刺之。刺後必熨。

以火而日使之熱。則氣溫於內。而邪自潰散也。○潰音會。

伍以參。禁以除其

內恬憺無爲。乃能行氣。

三相參爲參。五相伍爲伍。凡食息起居必參伍。

宜否守其禁。以除內之再傷。又必恬憺無爲。以養其氣。則正氣乃行。而邪氣庶乎可散。蓋膈證最爲難愈。故當切戒如此。○恬音甜。憺音淡。後以鹹苦化穀乃下矣。

鹹從水化。可以潤下。軟堅。苦從火化。可以溫胃。故皆能下穀也。苦味詳按。見運氣類十七。少陰司天條下。○愚按上文云氣爲上膈者。食飲入而還出。夫氣有虛實。實而氣壅。則食無所容。虛

而氣寒則食不得化。皆令食入卽出也。至若蟲
爲下膈者。蟲上食則下脘虛。其寒汁流於腸中
而後致癰滯不行。則亦因陽氣之虛於下。故食
入周時復出也。然余嘗治一中年之婦。患此證
者。因怒因勞。皆能舉發。發時必在黃昏。旣痛且
吐。先吐清涎。乃及午食。午食盡。乃及蚤食。循次
而盡。方得稍息。日日如是。百藥不效。及相延視
則脉弦而大。余曰。此下膈證也。夫弦爲中虛。大
爲陰不足。蓋其命門氣衰。則食至下焦。不能傳
化。故直至日夕陽衰之時。則逆而還出耳。乃用
八味參杞之屬。大補陰中之陽。隨手而應。自後
隨觸隨發。用輒隨效。乃囑其加意慎重。調至年
餘始愈。可見下膈一證。有食入周日復出而不
止。晬時者。有不因蟲癰而下焦不通者矣。此篇
特言蟲癰者。蓋亦下膈之一
證耳。學者當因是而推廣之。

刺腰痛

四十

足太陽脉令人腰痛引項脊尻背如重狀

素問刺腰

痛篇全○足太陽之脉下項循肩膊內挾脊抵

腰中故令人腰痛引項脊尻背如重狀也○開高切腎也刺其郄中太陽正經出血脊無見血中郄

委中也一名血郄太陽正經崑崙也太陽合腎水水王於冬而衰於春故刺太陽經者脊無見血○郄○少陽令人腰痛如以鍼刺其皮中循

循然不可以俛仰不可以顧少陽之氣應風木陽分受之故如以

鍼刺其皮中循循然遲滯貌謂其舉動不便也足少陽之脉起於目銳眥上抵頭角下耳後循