

醫方十種彙編卷四



武進費伯雄鑒定

婦科雜症

京江
文成堂藏板



南京中医药大学图书馆藏
1964

婦科雜症目錄

鑑定

經候

後先期來甚多、經水後期而來多、經水斷續或前或

來、忽斷時熱時止寒熱往來、有經前腹痛數日而後行、

行經後少腹痛、經水不止、單方、經前腹痛吐血、經前

未老經水斷、經水將來三五日、下先腹痛、經前腹痛吐血、

經前一日大便先流血、治吐血、經閉、經血逆行上出口鼻、

友人經閉已久一治女子經閉、經閉乾血等症

陳修園加

減四物湯

帶下

白帶、青帶、黃帶、黑帶、赤帶、赤白帶下二則

血崩

血崩昏暗、年老血崩、少婦血崩、崩後三月交感

合即如血崩、婦人血崩不止、單方、血崩久甚不愈

紅白崩、婦人血崩、婦人血崩不止、單方、血崩久甚不愈

佳登婦人小便不通、大小便不通、陰冷、婦人陰痒或

多言生濕瘡、陰痛、雞眼痛、陰戶并蠱門生白蟲

婦科雜症目錄



婦人脚了及足底作痒 女子小戶嫁痛 女子乾血癆

失心 婦人乾血癆三方 婦人陰吹大便燥堅 婦人乾血癆

疼病手足搖弱 傷寒末愈交感病 婦人氣血不調 婦人乾血癆

乳頭腫硬 乳癰 乳癰 乳癰 乳癰 乳癰 乳癰 乳癰 乳癰 乳癰

乳卸拖長 陰挺 鬼胎 去秋胎 斷產 調經 調經 調經 調經 調經

少腹急迫不孕 骨蒸夜熱不孕 便澀腹脹足腫 行經 行經 行經 行經 行經

調經種子 保胎 保胎 保胎 保胎 保胎 保胎 保胎 保胎 保胎

或臨產產後四條 婦人產後敗血流出 結成腫塊 烏 烏 烏 烏 烏

髮并生髮 治 治 治 治 治 治 治 治 治 治

粉刺雀斑方 治 治 治 治 治 治 治 治 治 治

肝氣痛 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎

解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎

解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎

解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎

解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎

解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎

解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎

解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎

解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎

解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎

解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎

解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎

解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎

解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎

解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎

解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎

解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎 解恨煎

婦科雜證

武進費伯雄先生鑑定

萍鄉文 晟叔來輯

男星瑞重校刊

星輝 昭全校

經候經非血也乃天一之水出自腎中是至陰之精而有至

陽之氣故其色赤紅似血而實非血所以謂之天癸從

來以經為血沿誤已久倘果是血何以古聖賢不名曰血

水而必創呼曰經水乎○以下十五條見明末傳山文科

先期經來甚多是腎中水用地骨皮五錢丹皮酒白芍炒熟地三錢

青蒿二錢茯苓一錢黃柏鹽水浸炒五分水煎服二劑而火自平○又有先

期經來只一二點者是腎中火旺而陰水虧也元參大生地

酒炒各

白芍

炒炙冬

去心各

五錢

阿膠

地骨皮

各三錢

水煎服四劑而



經水後期而來多是血寒而有餘大熟地九白芍酒炒各一兩川芎酒洗

白朮土炒各五錢柴胡肉桂去粗皮各五分續斷一錢五味子分三煎服三劑

而經調矣。又有後期而來少者是血寒而不足前方加當歸酒洗四錢

阿膠人參各二錢服三四劑必效。○貧者用黨參四錢代人參。

錢以下皆同。

經水斷續。或前或後無定期此肝氣鬱結用定經湯。白芍酒炒當歸酒洗

兔絲子酒炒各一兩大熟地九山藥炒各五錢白茯苓三錢黑芥穗二錢

柴胡五分水煎服二劑而經淨四劑而經調矣。若臨時或有外

感者宜加紫蘇一錢羌活八分有內傷飲食者宜加神麴二錢傷肉食

者加查肉一錢



經水有數月一行者

亦無先後多少之殊本屬無病不必妄用藥餌也

或有因暗慾損

者用茯苓

五錢

白朮

土炒

陳皮

白芍

山藥

炒

三錢

鬼絲子

酒炒

杜仲

二錢

黑甘草

各一錢

河水煎服四劑仍如其舊不必再服

年老經水復行

五十以外或六七十經水忽復行乃肝不藏血脾不統血之故也

人參

黃芪生

熟地

九蒸各一兩

白朮

土炒

當歸

酒洗

山藥

蒸各五錢

黑芥穗

阿膠

蛤粉炒

甘草

木耳炭

各一錢

香附

酒炒五分

水煎服

一劑減

二劑至

四劑尤減

十劑

愈

此方加貫仲炭

一錢

研細末

以藥冲服

尤妙

有經水忽來忽斷時疼時止寒熱往來者

是肝氣不舒

大熟地

九蒸一兩

白芍

酒炒

當歸

酒洗

白朮

土炒各五錢

粉丹皮

川芎

酒洗各三錢

元胡索

酒炒

甘草

各一錢

水煎服

數劑效

此方加黑荆芥穗

一錢

尤妙

錢

水煎服

數劑效

此方加黑荆芥穗

一錢

尤妙

錢

水煎服

數劑效

此方加黑荆芥穗

一錢

尤妙

錢

水煎服



有經前腹痛數日而後經水行者

其經來多是紫黑塊是熱極而火不化也

用宣鬱湯

經湯

丹皮白芍

酒炒當歸五錢

梔子

炒三錢

白芥子

炒二錢

香附

酒炒鬱金

醋炒黃芩

酒炒生甘草

柴胡

各一錢

水煎服

連四劑

丁月經不

先腹痛而行經矣

行經後

少腹疼痛

人以為氣血之虛也誰知是腎氣之滯也

山藥

炒五錢

阿膠

炒當歸

酒洗

山茱萸

白芍

酒炒各三錢

巴戟

鹽水浸一錢

甘草

一錢

服四五劑

愈

經水不止單方

陳蓮蓬壳燒灰存性研末

每服二錢

熱酒下

經水過多

行後復行面色痿黃身體倦而困乏愈甚

用如瀉四物湯

熟地

九蒸

當歸

酒洗

白朮

土炒各五錢

白芍

酒炒

黑芥穗

山茱萸

各三錢

續斷甘草

各錢

水煎服

四劑而血歸經

十劑之後

加人參

錢



再服十劑下月行經適可而止○又膠艾湯

阿膠

錢半

炙草

各一錢

艾葉當歸

各半錢

熟地白芍

各二錢

水煎服

年未老經水斷

脾似血枯而非血枯乃肝脾之氣鬱而經閉耳

用益經湯

熟地九

白朮

土炒各一兩

山藥

當歸

酒洗各五錢

白芍

酒炒

沙參生朮仁

搗碎各三錢

人參

丹皮

各二錢

柴胡杜仲

炒照各一錢

水煎服八劑而經通三十劑而

經不再閉矣

經水不通單方

茶一碗

入紅砂糖二錢亮紗蓋定露二宿服之

○又方蠶砂四兩

炒黃色

無灰酒一壺重湯煮熟去砂飲一鐘即通

經前腹痛吐血

有經木行之前一二日忽然腹痛而吐血是肝氣之逆也

用順經湯

丹皮二錢

當歸

酒洗

大熟地

九蒸各五錢

白芍

酒炒

白茯苓沙參黑芥穗

各三錢



中醫藥大學圖書館版權所有

水煎服一劑而吐血止。二劑經順。十劑不再發。婦人年壯吐衄

遠作勞症治致成痼疾必須以前方加茜草牛膝各一錢如法服之必效

經前腹痛單方。紫蘇四兩。俟經期如肚腹脹痛煎湯薰洗下部。

摩運小腹。每經摩洗三四日。則經正痛止。

經水將來三五日前。臍下先疼痛。狀如刀刺或寒熱交作所下如黑痘汁是下焦寒濕交爭之效

用溫膽化濕湯。白朮土炒一兩。山藥炒。巴戟肉鹽水浸各五錢。白茯苓三錢。

扁豆炒搗各三錢。白果搗碎十枚。建蓮去心三十枚。水煎服必須于經未來

前服之。四劑即效。

經前洩水。經未來之前洩水三日而後行經是脾氣之虛也。用健固湯。白朮土炒一兩。人參

巴戟鹽水浸各五錢。白茯苓三錢。水煎連服十餘劑。不再洩水矣。



行經之前一日大便先流血

是經流錯於大腸也

當歸酒

白芍酒炒白朮

麥冬去心大熟地九蒸各

黑芥穗山茱肉二錢各

人參三錢巴戟肉水

錢一升麻分四

水前服

三劑大腸血止而經即由前陰而行矣服

三四劑經止兼可受孕

經水錯入大腸初起必精神照常可用前方

若非於行經之

際大便下血過多精神短少人愈消瘦

此脾不統血也

宜用補血湯

嫩黃芪

二兩生熟各一兩

當歸身酒洗

白朮

土炒

白芍

酒炒

杜仲

炒斷絲

黑荆芥各二錢

薑炭

錢半

引用貫仲炭

研一錢

沖服

四劑

必愈愈後減半再服二三劑

治吐血暨經血逆行上出口鼻病未深者

韭菜搗汁一盞入童便半盞頓溫服



女人經閉已久

晚盤砂四兩炒微黃色好黃酒二斤
淳之浸三日隨意飲之二料即效

治女子經閉形容枯稿

杭州麥冬去心四斤熬成膏何首烏半斤
黑豆半斤九蒸九酒為末入人乳浸之

數要晒得一斤重大懷熟地四兩紅花五錢酒流當歸酒
洗鹿茸五錢取炙共為末和勻入麥冬膏內再加煉蜜少許和
為丸如梧子大每服三錢
加至五錢黃酒浸湯任下

經閉乾血等症神方

雄雞一隻煮熟去肉取全骨一副即嘴爪俱
要不用再用童便生薑汁高醋各一盃將骨

人砂鍋或置新瓦上微火焙炒陸續將三汁酒在骨上仍留汁
一少牛將骨打碎又用香附米一兩同再焙仍將三汁陸續酒
在骨土焙之俟骨酥脆去香附不用將骨研成細末
分作三服黃酒調下一服汗出三服經行神效之極

陳修園加味四物湯

熟地當歸酒洗川芎白芍酒加香附製錢半

茯神

二錢
錢炙草亦用一錢此女科要藥也
經血先芤而至加知柏

而至加薑桂艾葉實者加陳皮枳實大實而閉音加大黃桃仁
牛膝更佐以桃仁承氣湯虛者加人參白朮大虛而枯者再加

鹿角膠牛膝更佐以人參養榮湯。經將行而腹痛推按者加
延胡索木香。經已行而腹痛者加人參白朮乾姜。經水不
通逆行而為吐血鼻血者加牛膝澤蘭非汁童便。若腹中
有痞飲食滿悶者除地黃加枳實牛夏。經色紫者風也加荆
防白芷黑者熱甚也加芩連丹皮地骨皮淡白者虛也加扶
停水以混之加參芪陳半色如烟塵或如屋漏水者加陳皮半
夏秦茺防風蒼朮如豆汁者加芩連或帶黃濁者濕熱也或成
塊作片血不變者氣滯也加枳實陳皮元胡索色變紫黑屬熱
者多屬寒者亦有之宜察脈審症。此外苦惡寒發熱頭痛有
汗加桂枝薑朮無汗加麻黃細辛之類詳於海藏六合湯不贅
帶下俱是濕症而以帶名者因帶脈不能約束或行房
而放縱或飲酒而顛狂加以脾氣之虛肝氣之鬱濕氣

之浸熱氣之逼安得不成帶下之病哉。以下各條俱見
傳山女科而單方則從壽世集驗諸書撮人不注書名

白帶

終年累月流白物如涕如醢不能禁止甚則臭穢乃濕氣感
而火衰肝鬱而氣弱則脾土受傷濕土之氣下陷是以脾精
不安不能化榮血以為經水反變成白濁之物直下而此宜用
不能自禁治法宜大補脾胃之氣稍佐以舒肝之品

完帶湯

白朮

炒

山藥

炒

白芍

酒炒

人參

錢

車前子

炒



製各
三錢甘草 陳皮 黑芥穗 各五
柴胡 分六 水煎服二劑輕四劑

六劑白帶全愈。倘未全效必係經水過期少腹為逆則當服

實帶湯 丹皮 當歸 酒洗各二錢 大熟地 九蒸 白朮 土炒 人參 各三錢

肉蓯蓉 淨洗 麥冬 肉杜仲 炒 黑 白 芍 酒炒 各三錢 巴戟肉 酒補 骨 脂 炒 各

錢五昧 分建蓮 不去心 水煎服四劑少腹無緊迫之狀服一月

可受胎。又單方用鱖魚 魚 即桂 六七十寸長者先洗淨破先腸肚

不必復洗用胡椒一歲一粒鹽一分煮食即愈以後再食胡椒

照土畧加鹽酒亦可二三次尤妙。又方棉花子半斤 燒存性

桐子 二兩 燒 存性 其為末空心淡酒下三錢。又方用隔年冬瓜子

仁 炒研 每服五錢空心白蜜湯下。又方白扁豆 炒 為末每服

二錢米飲下

青帶

帶下色青甚則尿如菜豆汁稠粘不斷其氣腥臭此乃肝經之濕熱也宜用加味逍遙散

白芍酒炒生甘草

茯苓各五錢

茵陳梔子各三錢

柴胡陳皮各一錢

水煎服三劑而色淡

四劑而青綠之色絕不必過劑矣

黃帶

如黃茶濃汁其氣膩穢乃任脈之濕熱也宜用易黃湯

山藥炒

芡實打碎炒

黃柏鹽水

製

二錢車前子酒炒

白果十枚

水煎連服四劑無不全愈○此方治

黃帶甚驗即凡有帶病者均可治之

黑帶

帶下而色黑甚則如黑豆汁其氣亦腥乃火熱之極其症必腹中疼痛小便時如刀刺陰門必發腫面色必發紅日久必

黃瘦飲食必兼人口中必熱渴飲以凉水少覺寬快此胃火與命門勝脫三焦之火合而熬煎憂為炭色非少育寒氣也

火湯石膏煉

日尤土炒各五錢

車前子酒炒

茯苓大黃王不留行黃連梔



子炒劉寄奴各三錢知母二錢水煎服一劑小便疼止而通利二劑

黑帶變為白三劑白亦少減再服二三劑全愈矣愈後當節飲食

戒辛辣調養脾土不可恃有此方病發而服致傷元氣

赤帶

帶下而色紅似血非血淋漓不絕是肝經之鬱火內燔下灼脾土脾土不能運化以致濕熱之氣蘊於帶脈之間而再下

藏血亦滲於帶脈之內皆由晚氣受傷運化無力故濕熱之氣隨氣下陷同血俱下所以有似血非血之形象也世人以赤帶

屬之心火誤矣治宜清肝火而扶脾氣方用清肝止淋湯杭白芍醋炒全當歸酒洗各生地酒

銅鍋炒阿膠炒丹皮各三錢黃柏牛膝各二錢香附酒炒紅東十個

小豇豆兩水煎服一劑少止二劑又少止四劑全愈十劑永斷

赤白帶下臍腹疼痛極效單方名曰白白芷炒二兩乾草二錢其為天

每服三錢空心溫米湯調下若肝經鬱結血虛火盛者宜用

當歸

錢二 白芍 錢五

黃芩 錢三 煎服

赤白帶下單方

槿樹皮

二兩

切細以白酒一碗半煎一碗空心服

白帶用紅酒甚妙○又方雞冠花煎酒服赤帶用白帶用

紅花○又方建蓮肉

炒去心

海驪硝

去頑壳煨過各三錢共為末熱酒服○

又方馬齒莧搗爛搾汁三合和雞子清二枚先溫令熟次下莖

汁微溫頓服之不過再服即愈

赤白帶下經行不止

白芷

一兩

海驪硝

煨去甲

胎髮圓煨存性共

為末每服二錢溫酒調下

血崩昏暗

婦人有血崩兩目黑暗昏到在地不省人事者人參不

於補陰之中行止崩之法方用固本止崩湯

大熟地

九蒸白朮

土炒焦

各一兩生黃芪



北京中醫藥大學圖書館版權所有