

瘧醫大全



南京中醫藥大學
南京中医药大学图书馆版权所有

瘍醫大全目錄

卷九

論辨膿法

論開口除膿法

論吸膿法

論膿熟不宜開遲

論內托法

癰疽已成門主方

論補法

論桑木炙法

論神妙拔根法

論瘡瘍去腐肉法

論死肉當去

論湯洗法

癰疽湯洗門主方

癰疽潰瘍門主方

論生肌法

論收口法



北京大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆

癰疽門生肌丹散膏方

論背癰頭開不住

論癰疽內肉不合法

論繩縛背瘡法

論生芻肉

論驗透膜法

論瘡疽鑽口

論培護法

論培護法



光醫正刀全
論療久成瘻

論九漏

試知百病生死法

夏月諸瘡傷碎蠅蛆門主方

碎瘡瘍惡穢法



北京中医药大学图书馆版权所有
Bjupc Library All Rights Reserved

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東賜

男

櫬燮用

合校

論辨膿法

李東垣曰夫瘡疽之疾毒氣已結者不可論內消之法卽當辨膿生熟淺深不可妄開視之可否不至於危殆矣凡瘡疽腫大按之乃痛者膿深也小按之便痛者膿淺也按之不甚痛者未成膿也若按之卽復者有膿也不復者無膿也非也必有水也



以手掩其上大熱者膿成而自軟也若其上薄皮
剝起者膿淺也其腫不甚熱者膿未成也

經曰膿血交粘用藥可全色鮮紅活腐肉易脫氣敗

血衰神仙歎哉

齊氏曰若發腫都軟而不痛者血瘤也發腫日漸增
長而不大熱時時牽痛者氣瘤也氣結微腫久而不
消後亦成膿此是寒熱所爲也留積經久極陰
生陽寒化爲熱以此潰者必多成瘻

伍氏曰瘡腫赤色按之色不變者此膿已成也按之



隨手赤色者其亦有膿也按之白色良久方赤者此遊毒已息可就赤白盡處炙斷赤腫自消无以手按之若牢鞭未有膿也若半軟半鞭已有膿也又按腫上下不熱者爲無膿熱甚者爲有膿宜急破之

澄曰凡腫癰按之軟陷隨手起者爲有膿按之堅硬雖按之有凹不卽隨手起者爲膿尙未成不可輕

易決破

又曰凡大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處

陷不復者無膿按之處卽復者有膿按之不復者可消若按之都牽强者未有膿也按之半軟者有膿也又以手按上下不熱者無膿若熱者有膿凡覺有膿急當破之無膿但氣腫若有血慎之慎之不可針破也用諸拔毒之藥敷散四圍堅中間軟者此爲有膿也一邊軟亦可有膿都堅硬者此爲惡核或有氣也都軟者此爲有血或血瘤也當審堅硬虛實爲要若堅疽積久後若更變熱中有軟堅硬虛實爲要若堅疽積久後若更變熱中有軟

之耳若針灸刺破不可療矣

有山齡曰凡治癰疽口小膿多則膿不出而
盡或薄膿可出硬膿難出以致瘀不出而
延綿難愈法宜爛開大口得瘀膿多出爲
藥烏金散最佳瘀內能去不傷新肉且不甚歎痛
創口妙也惟有膿者以細紙燃裹藥紙入頻換數
條即化此亦有頑硬之極非烏金膏所能去者



卷之二

耳味全述陳蔡子曰

有膿者以手按上一寸當有熱氣在中三
指有膿者當刺之如膜門氣膿者有血氣
不得針刺也用火拔刺之刺勿深四面圍
者此名火鍼也一透轉亦可有膿者刺破者
是拔刺有氣者都取君此為有血或無氣者起當審
望而虛實分要若當疽橫久後若更復熱中有膿

也又以手按上一寸當有熱氣在中三
指有膿者當刺之如膜門氣膿者有血氣
不得針刺也用火拔刺之刺勿深四面圍
者此名火鍼也一透轉亦可有膿者刺破者
是拔刺有氣者都取君此為有血或無氣者起當審
望而虛實分要若當疽橫久後若更復熱中有膿



論開口除膿法

程山齡曰凡治癰疽口小膿多則膿不出或出而盡或薄膿可出硬膿難出以致瘀不出而生延綿難愈法當爛開大口俾瘀膿多出爲善其爛藥烏金散最佳瘀肉能去不傷新肉且不甚焮痛爲至妙也若有膿管以綿紙撲裹藥紙入頻換數條卽化祛耳亦有頑硬之極非烏金膏所能去者則用白降丹或化腐紫霞膏搽之然終不及烏金膏爲至穩

十法

李東垣曰夫瘡瘍生於外皆由積熱蘊於內內經謂
血熱肉敗榮衛不行必將爲膿留於節腠必將爲
敗蓋瘡疽膿爛之時頭小未破瘡口未開或毒氣
不出疼痛難忍者所以立追餌膿之方法使毒氣
外泄而不內攻惡肉易去好肉易生也若其瘡痏
之血出不止者則未可綏當於瘡上摻追餌之藥
待其熟可綏方綏若其瘡痏之痛應心根者亦不
可強綏之悞觸其瘡其歎痛必倍變證不無不可
不慎也若瘡癰膿成未破於上薄皮剝起者卽當

用破頭代針之劑安其上以膏貼之膿出之後用
拔膿化毒之藥取效如神矣

十書

竇漢卿曰凡瘡瘍之起疼痛固屬於心火久而陽氣
升上蒸肉化而爲膿若不三思原其膿之有無遽
而開刀則鮮血突出膿從何來致患者前寒發熱
日夜疼痛無法可止必先將指頭按患處隨手而
起四畔悉軟觀其頭聚擇尻神不犯吉日將刀頭
向上開之方不致傷新肉取出刀再燃綿紙條潤
油度之使膿水齊會半日扯出則膿水易乾外貼

中医大全

膏藥四圍敷藥 全書

五

行 二



南京中医药大学图书馆版权所有

論吸膿法

陳實功曰古之良醫有好生之德以口吮膿後世人漸嫌膿每多重手強擠致患者狼狽不堪或因循聽其自潰膿毒不得外發必致內攻乃生煩躁如負石非用藥筒拔提內蓄之膿毒氣終難外泄也法預用徑口一寸二三分新鮮嫩竹一段長七寸一頭留節鑽一小孔以杉木條緊塞將羌活獨活分許羌節鑽一小孔以杉木條緊塞將羌活獨活紫蘇蘚艾鮮菖蒲白芷甘草各五錢連鬚葱二兩

灌入筒內筒口用葱塞之將筒橫放鍋內以物壓住勿得浮起用清水十大碗滌筒煮數滾約內藥濃熟爲度候用再用披針於瘡頂上一寸內吊字放開三孔深入淺寸約在筒圈內將藥筒連湯用大磁鉢盛貯患者搘前將筒藥倒出急用筒口乘熱對瘡合上以手捺緊自然吸住約待片時藥筒已溫拔去塞孔木條其筒自脫將器倒出筒中物色看其何樣如有膿血相粘鮮明紅黃之色亦有一二杯許此是活瘡治必終愈如拔出物色純是