

傷寒續論

卷下

藏結結胸痞篇

溫熱病篇

脈法篇

正方

合病併病篇

雜篇

傷寒例

附古今分兩

傷寒續論卷下

清

長洲石頑張

璐路玉

銓次

男

登誕

參訂

倬飛疇

從學郭求友三較正

日本大泉長菴前田安宅子仁

再訂

男

典子守

藏結結胸痞篇

問曰病有結胸。有藏結。其狀何如。荅曰。按之痛。寸脉浮。關脉沉。名曰結胸也。何謂藏結。荅曰。如結胸狀。飲食如故。時時下利。寸脉浮。關脉小細沉緊。名曰藏結。舌上白胎滑者難治。結胸者。陽邪結於陽也。藏結者。陰邪結於陰也。然胸位高。

藏位卑。其脉之寸浮關沉。兩俱無異。但藏結之關脉。更加小細而緊者。以關脉居上下二焦之界。外邪由此下結。積氣由此上干。實往來之要衝。所以病在下而脉反困於中也。若見舌白胎滑。則外邪固結於裏。其勢最重。以表裏兩解之法。俱不可用。故爲難治。其不出方者。正欲人深究其旨而施治。非不治也。治之務在分解表裏錯雜之邪。使陰氣漸下而內消。客邪漸上而外散。庶可圖功於萬一也。藏結無陽證。不往來寒熱。其人反靜。舌上胎滑者。不可攻也。藏結之所以不可攻者。從來置之不講。以爲仲景未嘗明言。後人無從知之。不知仲景言之甚明。人第不參討耳。夫所謂不可攻者。乃垂戒之辭。正欲人詳審其攻之之次第也。試思藏已結矣。匪攻而結。何由開耶。所謂其外不解者。

尚未可攻。又謂下利嘔逆不可攻。又謂表解乃可攻痞。言之已悉。於此特出一訣。謂藏結無陽證。不往來寒熱。其人反靜。則證不在六經之表裏。而在上焦下焦之兩途。欲知其候。但觀舌上有無胎滑。有之則外感之陽熱挾痞氣而反在下。素痞之陰寒挾熱勢而反在上。此與裏證已具表證未除者。相去不遠。但其陰陽悖逆。格拒不入。證轉凶危耳。豈結胸膈內拒痛。而藏結腹內不拒痛耶。此而攻之。是速其痛引陰筋而死。不攻則病不除。所以以攻爲戒。是則調其陰陽。使之相入。而滑胎旣退。然後攻之。則邪熱外散。寒氣內消。此持危扶顛之真手眼也。

病脇下素有痞。連在臍傍。痛引少腹。入陰筋者。此名藏結死。按病人素有動氣。在當臍上下左右。則不可發汗。素有痞

氣在脇下連臍傍。則不可攻下。醫不細詢。病家不明告。因而貽禍者多矣。

已上藏結例

病發於陽而反下之。熱入因作結胸。病發於陰而反下之。因作痞。所以成結胸者。以下之太早故也。

病發於陽者。太陽表證誤下。邪結於胸也。病發於陰者。皆是內挾痰飲。外感風寒。中氣先傷。所以汗下不解。而心下痞也。凡結胸正在胸中。此正太陽全盛之邪。因誤下乘虛而入。故曰熱入因作結胸。是處方名爲陷胸。若痞則多偏胸脇。而無正中結痛之候。故但言因作痞。而不用熱入二字。其邪之盛衰可知。是處方名爲瀉心。觀其主治。則虛實迥然不侔。則知表邪爲陽。裏邪爲陰也明矣。或言中風爲

陽邪傷寒爲陰邪。安有風傷衛氣氣受傷而反變爲結胸。寒傷營血。血受傷而反成痞之理。復有誤認直中陰寒之陰。下早變成痞者。則陰寒本無實熱。何得有下早之變。設陰結陰躁而誤下之。立變危逆。恐不至於成痞。停日待變而死也。

太陽病。脈浮而動數。浮則爲風。數則爲熱。動則爲痛。數則爲虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒者。表未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。客氣動膈。短氣躁煩。心中懊憹。陽氣內陷。心下因鞭。則爲結胸。大陷胸湯主之。若不結胸。但頭汗出。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身必發黃也。脈浮而動數。雖主風熱。亦主正虛。虛故和持日久。頭痛發熱惡寒。表終不解。醫不知其邪持太陽。未傳他經。反誤下

之。於是動數之脉變遲。而在表之證。變結胸矣。動數變遲。三十六字。形容結胸之狀殆盡。蓋動數爲欲傳之脉。變遲則力綿勢緩而不能傳。且有結而難開之象。膈中之氣。與外實之邪兩相格鬪。故爲拒痛。胃中水穀所生之精悍。因悞下而致空虛。則不能藉之以衝開外邪。反爲外邪衝動其膈。於是正氣往返邪逼之界。覺短氣不足以息。更煩躁有加。遂至神明不安。無端而生懊懣。凡此皆陽邪內陷所致也。

結胸者。項亦強如柔瘕狀。下之則和。宜大陷胸圓。

結胸而至頸項亦強。證愈篤矣。蓋胸間邪結緊實。項勢常昂。有似柔瘕之狀。然瘕病身首俱張。此但項強。原非瘕也。借此以驗胸邪十分緊逼。以大陷胸湯下之。恐過而不留。

卽以大陷胸圓下之。又恐滯而不行。故煮而連滓服之。然
後與邪相當。觀方中用大黃芒硝甘遂。可謂峻矣。而更加
葶藶杏仁。以射肺邪。而上行其急。煮時又倍加白蜜。以留
戀潤導之。而下行其緩。必識此意。始得用法之妙。

結胸證。其脉浮大者。不可下。下之則死。

胸既結矣。本當下以開其結。然脉浮大。則表邪未盡。下之
是令結而又結也。所以致死。此見一誤不堪再誤也。

結胸證悉具。煩躁者亦死。

亦字承上。見結胸證全具。更加煩躁。卽不下亦主死也。煩
躁曷爲主死耶。蓋邪結於胸。雖藉藥力以開之。而所以載
藥力上行者。胃氣也。胃氣亢溢於津液之內。汗之津液一
傷。下之津液再傷。至熱邪搏飲結於當胸。而津液又急奔

以應上。正有不盡不已之勢。胃氣垂絕。能無敗乎。此結胸諸法。見幾於早。兢兢以滌飲爲先務。飲滌則津液自安矣。傷寒六七日結胸熱實。脈沉而緊。心下痛。按之石鞕者。大陷胸湯主之。

熱實二字。形容結胸之狀甚明。見邪熱填實於膈間也。前條言寸脈浮。關脈沉。此言脈沉緊更明。蓋緊脈有浮沉之別。浮緊主傷寒無汗。沉緊主傷寒結胸。則知結胸非中風下早而成也。

傷寒十餘日熱結在裏。復往來寒熱者。與大柴胡湯。但結胸無大熱者。此爲水結在胸脇也。但頭微汗出者。大陷胸湯主之。

治結胸證。所用陷胸之法者。以外邪挾內飲。搏結胸間未

全入於裏也。若十餘日熱結在裏。則是無形之邪熱蘊結。必不定在胸上。而非結胸明矣。加以往來寒熱。仍兼半表。當用大柴胡湯。兩解表裏之熱邪。於陷胸之義無取也。無大熱與上文熱實互意。內陷之邪。但結胸間。而表裏之熱。反不熾盛。是爲水飲結在胸脇。其人頭有微汗。乃邪在高。而陽氣不得下達之明徵。此則主用大陷胸湯。允爲的對。太陽病重發汗而復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡所小有潮熱。從心下至少腹鞭滿。而痛不可近者。大陷胸湯主之。

不大便燥渴。日晡潮熱。少腹鞭滿。證與陽明頗同。但小有潮熱。則不似陽明之大熱。從心下至少腹。手不可近。則陽明又不似此大痛。因是辨其爲大陽結胸。兼陽明內實也。

緣誤汗誤下。重傷津液。不大便而燥渴潮熱。更加痰飲內結。必用陷胸湯。由胸膈以及胃腸。始得蕩滌無餘。若但下腸胃結熱。反遺膈上痰飲。則非法矣。

太陽少陽併病。而反下之。成結胸。心下鞭下利不止。水漿不下。其人心煩。

此條雖係併病。以其反下之而成結胸。當隨見所變之證。而歸重於結胸也。誤下之變。乃致結胸下利。上下交征。而陽明之居中者。水漿不入。心煩待斃。傷寒顧可易言哉。小結胸病。正在心下。按之則痛。脉浮滑者。小陷胸湯主之。小結胸病。正在心下。則不似大結胸之高在心上也。按之則痛。比手不可近。則較輕也。而脉之浮又淺於沉。滑又緩於緊。可見其人外邪陷入原微。但痰飲素盛。挾熱邪而內

結。所以脉見浮滑也。黃連半夏枳實。藥味雖平。而泄熱散結。亦是突圍而入。所以名爲小陷胸也。寒實結胸。無熱證者。與三物小陷胸湯。白散亦可服。寒實結胸。乃寒飲結聚而無大熱也。意謂小陷胸半夏枳實。足以去其痰飲。又慮黃連難祛寒實。故又主白散。取巴豆之辛熱破結。貝母之苦寒開鬱。桔梗載之上涌爲的當耳。

已上結胸例

傷寒汗出解之後。胃中不和。心下痞鞭。乾噫食臭。脇下有水氣。腹中雷鳴下利者。生薑瀉心湯主之。汗後外邪雖解。然必胃氣安和。始得脫然無恙。以胃主津液故也。津液因邪入而內結。因發汗而外亡。兩相告匱。其

人心下必痞鞭。以伏飲搏聚。胃氣不足以開之也。胃病故乾噫食臭。食入而愛餒酸也。胃病故水入而傍滲脇肋也。胃中水穀不行。腹中必雷鳴而搏擊有聲。下利而清濁不分也。雖不由誤下。而且成痞。設誤下之。其痞結又當何似耶。

傷寒中風。醫反下之。其人下利日數十行。穀不化。腹中雷鳴。心下痞鞭而滿。乾嘔心煩不得安。醫見心下痞。謂病不盡。復下之。其痞益甚。此非結熱。但以胃中虛。客氣上逆。故使鞭也。甘草瀉心湯主之。

此條痞證。傷寒與中風互言。大意具見。可見病發於陰下。之而成痞者。非指傷寒爲陰也。下利完穀腹鳴嘔煩。皆誤下而胃中空虛之互辭也。設不知此義。以爲結熱而復下。

之。其痞必益甚。故重以胃中虛。客氣上逆。昭揭病因。方用甘草瀉心湯者。卽生薑瀉心湯。除去生薑。人參而倍甘草。乾薑也。客邪乘虛結於心下。本當用人參。以誤而再誤。其痞已極。人參仁柔無剛決之力。故不宜用。生薑辛溫最宜用者。然以氣薄主散。恐其領津液上升。客邪從之犯上。故信用乾薑代之以開痞。而用甘草爲君。坐鎮中州。庶心下與腹中漸至寧泰耳。今人但知以生薑代乾薑之僭。孰知以乾薑代生薑之散哉。但知甘草能增滿。孰知甘草能去滿哉。

傷寒五六日。嘔而發熱者。柴胡湯證具。而以他藥下之。柴胡證仍在者。復與柴胡湯。此雖已下之。不爲逆。必蒸蒸而振。却發熱汗出而解。若心下滿而鞭痛者。此爲結胸也。大陷胸湯

主之。但滿而不痛者。此爲痞。柴胡湯不中與之。宜半夏瀉心湯。

五六日嘔而發熱。爲太陽之本證。蓋嘔多屬陽明。然有太陽邪氣未罷。欲傳陽明之候。有少陽邪氣在裏。逆攻陽明之候。所以陽明致戒云。嘔多雖有陽明證。不可攻之。恐傷太陽少陽也。此本柴胡證。誤用下藥。則邪熱乘虛入胃。而膽却受寒。故於生薑瀉心湯中去生薑之走表。君半夏以溫膽。兼苓連以除胃中邪熱也。瀉心諸方。原爲瀉心下痞塞之痰飲水氣而設。此證起於嘔。故推半夏爲君耳。

傷寒大下後。復發汗。心下痞。惡寒者。表未解也。不可攻痞。當先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連瀉心湯。

大下之後復發汗。先裏後表顛倒差誤。究竟已陷之邪。痞結心下。證兼惡寒。表邪不爲汗衰。卽不可更改其痞。當先行解肌之法以治外。外解已後。乃用大黃黃連攻其濕熱。凝聚之痞。方爲合法耳。

脈浮而緊而復下之。緊反入裏。則作痞。按之自濡。但氣痞耳。心下痞。按之濡。其脈關上浮者。大黃黃連瀉心湯主之。心下痞而復惡寒汗出者。附子瀉心湯主之。

傷寒脈浮而緊。卽不可下。誤下而緊反入裏。則寒邪轉入轉深矣。外邪與飲搏結。故心下滿。鞭若按之自濡而不滿。鞭乃是濁氣挾濕熱痞聚於心下。則與外邪無預也。濁氣上逆。惟苦寒可瀉之。上條大黃黃連瀉心之法。卽爲定藥。若惡寒汗出。雖有濕熱痞聚於心下。而挾陽虛陰盛之證。

故於大黃黃連瀉心湯內。另煎附子汁和服。以各行其事。共成傾否之功。卽一瀉心湯方中。法度森森若此。

傷寒胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。黃連湯主之。傷寒邪氣傳裏。而爲下寒上熱也。胃中有邪氣。使陰陽不交。陰不得升而獨滯於下。爲下寒腹中痛。陽不得降而獨菀於上。爲胸中熱欲嘔吐。故於半夏瀉心湯中。除去黃芩而加桂枝。去黃芩者。爲其有下寒腹痛也。加桂枝者。用以散胸中之熱邪而治嘔吐也。經曰。上熱者瀉之以苦。下寒者散之以辛。故用黃連以瀉上熱。乾薑桂枝半夏以散下寒。人參甘草大棗以益胃而緩其中。此分理陰陽和解上下之正法也。常因此而推及藏結之舌上胎滑。濕家之舌上如胎者。皆不出是方。