

輯增

醫學實在易

廣益書局
石印

卷三

寒下清其火宜寒藥未與陽附子理中湯加茯苓半夏川椒之類或以真武湯八味丸間服然金匱有大半夏湯主降衝脈之逆為陽證反胃初起之神方

陰陽別論曰一陽發病其傳為隔按一陽少陽也手少陽三焦是少陽膽為初發從中惡之相火治之大小柴胡湯諸渴心渴按證用之如神又曰三陽結謂之隔按三陽太陽也手太陽小腸是太陽膽就從本為寒從標為熱結者熱熱之氣皆能為結此源一層論也張景岳謂小腸屬火膽腑屬木火不化則陽氣不行而傳導失職水不化則陰氣不行而清濁不分皆致結之由此一層論也傷寒論中儘有神妙之方邪氣滯府病形滿曰脾脈微急為隔中食飲入而還出後沫沫按脈微為脾虛而中氣欲發沫沫為脾虛而涎涎不攝理中凡為上策如若未效宜于脈之多處尋出所以急之源頭而治之大奇論曰胃脈沉鼓滿胃外鼓大心脈小緊急皆陽偏結按此即前論高鼓峰之意也通評虛實論曰隔則閉絕上下不通則暴脹之病也本仲扁曰憂愁者氣閉塞而不行按此二節即於難辨所謂噎隔是神思間病之意金匱茯苓厚朴湯升麻越鞠丸可治但當更求其本則得矣血氣形志偏曰形苦志苦病生于咽噎治以苦約愚謂亦不外瀉心湯之類反胃證內經無常論當以金匱為主

隔證詩

左路去扶古傳心心生地當婦養胃陰病重必瀉求峻刺三一承通結得良策

反胃詩

食入反出胃家寒信服吳萸黃連治不難更有下焦之火化理中八散附令加茶

隔證及胃總治詩

胃反證雖別以首推半夏瀉心名曰大過尋常陽明能納衝能降不在寒溫論短長

隔證餘論

隔證余宗經之三陽結一句為主以大便如羊矢為死證今改雷振邪氣液府病形篇曰胃脈微緩為洞洞者食不化下噎還出此三句堪為隔證對面診法路龍吉遺內經篇立病名曰洞註云腎王二便令腎脈少緩則腎氣虛矣腎氣既虛則大便不能禁固所以食飲不化一下咽噎旋即吐出按與遺篇名為洞風是也洞當作過風氣洞微五臟也史

記太倉公曰遇風者食飲下噎而輒出不留病得之濕又曰遇風之收飲食下噎輒後之病得之飽食而疾走註謂後如廁也為元臺註為洞泄少誤況下文又有小甚為仁壽直指以不換金正氣散送下安腎凡又用二神久收功

腰痛證內經刺腰痛篇曰足太陽脈得令人腰痛言外感也以五精散主之脈要精微論曰腰者腎之府轉搖不動腎將髓矣言內虛也以六味地黃丸桂附八味丸加牛膝杜仲濟羊脂鹿茸補骨脂主之痛如刺者為死血以鹿角為末又以肉桂牛膝乳香沒藥元胡桂枝紅花酒煎送下四錢痛而重者如帶五千錢者為濕氣宜腎者為痛而重或作止不定者為虛積宜二陳湯加南星及快氣之品使痰隨氣運又白朮能利腰膝之死血凡腰痛諸證因敗者用白朮兩許少佐他約一服如神太平聖惠方治風冷寒痺腰痛用川草烏三個生搗為末少加鹽水攤于紙上貼痛處即愈以腰為腎府故列于裡證

腰痛詩

腰痛外邪五積宜內虛六味化裁之善選瘀血毒虎角腎者利港沉不轉移

不寐證經文外金匱主肝經不守宅用酸棗仁湯余以陽不歸陰用乾百合一兩半紫蘇葉三錢龍骨牡蠣從神裏仁之類隨宜加入

邪客篇伯高曰厥氣客于五臟六腑則衛氣獨行其外行于陽而不得入于陰行于陽則陽氣盛陽氣盛則陽陷此

去其邪欲以半夏湯一劑陰陽已調其卧立至大感益帝曰病不得卧者何氣使然岐伯曰衛氣不得入于陰常留于

陽留于陽則陽氣滿陽氣滿則陽盛不得入于陰則陰虛故目不寐矣

不寐詩

不寐內經論最詳肝魂格納 憂仁湯紫蘇百合歸陰分 龍牡夜神佐使

良

不能食者胃中元氣虛也然有虛冷虛熱之異虛冷者而黃身白常怕寒所食不能消化懶不欲食大便溏泄無常病在上中二焦宜用消食丸若病在下焦命門之火化之難宜用本草二神丸虛熱者由黃中熱身常熱煩躁飽悶不食

食則或吐或小便短少不便不通病在上下二焦輕者用滋生丸重者用滋陰散若病在下焦當數吐謂腎乃胃之關不利升降是矣關門即氣交之中元之結也故腎旺則胃降足則思食當急以六味加歸芍養之若血燥大腸乾枯有寒者宜用胃氣則當以熟地五錢當歸麻仁各三錢白芍桃仁各二錢微火燉之提其形體如常氣血尚足可加大黃三錢助血動大腸一順利胃自開矣江蘇顧西塘最得意之秘法其徒徐炳南刻金匱其謂尤在溫所著余未敢信然此法余少年亦用之多效似不必愛古而傳今也又此證有疲勞一證其人志情好卧肢體煩重腹滿善飢而不能食食已則脘腹氣不行使然也金匱多用沉香湯肘後云飢食便卧得微勞病令人四肢煩重數臥飲食不舉其用大麥芽一升川椒一兩並炒薑蜜三兩搗末每服方寸匕日三服

不能食詩

不食胃虛冷熱分二神思食強起

二神思食強起

二神思食強起

二神思食強起

在六神湯中

殺勞詩

殺勞食已即食眠者在胃虛氣不前肘後椒薑大麥所沉香湯取善益

食亦者飲食不為肌膚言取食亦若飢也內經云大腸移熱于胃舌食而瘦謂之食亦夫胃為水穀之海所以化氣味而為榮衛者也若乃胃受熱邪消灼穀氣不能變化精血故善食而瘦之又胃移熱于膽亦名食亦以膽為陽木熱氣炎之則燥土而消穀宜甘露飲主之

食亦詩

食亦皆因胃熱未雖能納殺勞瘧腸瘕雲若骨垂甘露

甘露

黃疸證已食如飢但欲安卧一身面目及小便俱黃是也此為胃熱脾寒寒則生濕或胃停風而熱將得寒而濕濕然內鬱則時臥之氣不化勝主一身之肌表不化氣則濕熱無去路而成疸矣金匱沒注意之意詳今惟以陰陽提其大綱凡黃疸色暗如黃黃短氣小便自利腹中虛宜理中湯建中湯之類主之陽黃疸色明如橘主之近小便不利證多宜用厚朴湯枳子柏皮湯之類主之又有從虛事而得者身黃而面黃上黃微汗出于足心然名女勞疸其類人月經不和

血燒反室瀉瀉方寸七日再服過三日必愈然金匱注不可不讀此書已維現于表而醫者則或于理致列于理致
黃疸皆由濕熱成色分點濡與鮮明陽熱也理中小建中陰黃主陽證茵陳湯于辨行

傷寒法

傷寒麻黃湯桂枝湯證未寒也三陰寒化證用理中四逆真武吳茱萸湯裡寒也頭痛項強惡寒又黃疸逆腹脹痛
未裡俱寒也時法用五積散

傷寒證詩

麻桂桂枝二湯去表寒理中四逆裡寒者若違表裡皆寒投五積東方中叩兩端

霍亂吐瀉乃中氣虛寒陰陽離錯寒多不欲飲水者理中湯主之夏月伏陰在內最多此證若霍亂頭痛發熱身疼痛熱
多欲飲水者以五苓散主之霍霍正氣散者滿飲不可輕用若大汗出內寒外熱四肢厥冷脈微欲絕者宜通脈四逆湯
若大吐大下厥逆煩躁手足拘攣者通脈四逆湯加豬膽汁人尿以急救之

經脈為曰足太陰厥氣上逆則霍亂氣交變大論曰或上不及民病泄霍亂六元正紀大論曰不通氣則其主熱至
則身熱吐下霍亂太陰所至為中滿霍亂吐下王醫之秘為吐霍亂

霍亂詩

吐瀉交來霍亂名陰陽離錯理中湯平瀉而思水五苓散服脫筋攣四逆程通脈四逆

結論

凡大吐大瀉一疎緊一疎者其人必汗出如兩身冷如水目瞤筋跳聲音低小鼻唇指甲青黑手足攣急甚至一身肌
肉為大汗大下清脫不留或但吐而不瀉或但瀉而不吐六脈沉伏或六脈無形者救之之法生元緩急止重頃刻若
遇時兼證者霍亂寒熱尚未分清先以陰陽湯探之或以霍亂門之藥方如霍霍正氣散六和湯金小樸正氣散及
吳茱萸木瓜炒鹽為末之類和之而不知元陽暴脫回與不同止在呼吸之間若用前方權延半刻則追之無及矣更
有冒昧之徒凡遇此證必令先吞糖而痧藥不知痧是伏暑之證欲吐不吐欲瀉不瀉心腹絞痛竅道閉而不開如以

總初喉而元故燭而丹皆用辛香走竅之品而佐以龍腦麝香為實證大開大泄之峻劑若上吐下瀉室中之極紐
將斷反以此約投之則立斷矣余嘗語同道曰天災流行若輩奉天之令而行則故母言而病家必信不然此證而用
芍藥其與吐瀉亦異其哉且誤食砒礞以黃土水綠豆漿西瓜汁之類尚可解散若煎燒西藥則無可解散矣仲景
偽寒論主以理中湯其四逆湯通脈四逆湯散脈四逆加豬膽汁湯以補理中之未達如吐瀉初起雖用理中若吐瀉
甚而煩躁則用吳茱萸湯吳茱萸湯治肝氣上逆而嘔吐者若吐瀉汗出甚熱急寒四肢厥冷而拘急者宜四逆湯以救陰
若吐瀉而小便復利內寒外熱脈微欲絕者宜四逆湯以救陽然又恐力量不及必以通脈四逆湯為主而多服之然
余更有一言以告明醫曰凡亡陽證宜以生附乾薑直透使還不可加入人參之類若多服反礙藥力如浪子輕
去其家未達其回于館舍中投以寒室則其歸不果矣後陽歸其宅而後為受謀及家室猶陰以維陽則陽不復脫
矣且通脈四逆加豬膽汁湯起手必不可驟加豬膽汁半日開接過散主四逆刺厥冷稍瘳惟手足之寒急已甚始加豬
汁以殺其淫液又加入人參以助之據云神劑否則人參與膽必加之太早而陽反不能回學者不可不知也 又有服
理中白通四逆輩乾薑加至一兩附子加至二兩厥回利止惟微汗續未止者是陽已回而無陰以維之恐陽不久
而俱脫蓋陽以陰為家如童子初回無家可歸隨復逃脫量至五錢論所謂無妻夫必為斯言却粗中有細也宜于前
方倍加人參甘草或人尿豬膽汁之類救陰以固其陽或下利既止其氣反逆于上嘔噦復作呃逆不止宜橘皮竹茹
湯加參門冬代赭旋覆花湯之類高者抑之或火格于上湯水入口即吐宜芩黃連黃芩人參湯太早大苦以開之
降之若身熱口渴思水宜竹葉石膏湯以滋補之且此方能治虛歲少氣多嘔為大病後清補第一方此皆病勢向愈
未後收功之法時並發余應驗之方誤認為開手治法又以私臆推廣令其間服涼水生薑梅水西瓜汁甘蔗汁竹瀝陰
陽滿之類殺人無算且此證初起時勢緩者尚輕而易治若一陣緊一陣則肉則唇青指甲青黑自汗不止身冷如水
目上視而不能轉睛之危證並見再加痰涎漉瀉氣喘喘喘角不半刻元矣若利止而手足漸溫人漸安能不耐可愈若
利止而大煩大渴欲引冷水者是從太陰而出于陽明經云陽明之上燥氣主之宜白虎湯竹葉石膏湯之類以清其
燥或初由太陽頭項強痛證未用桂枝湯解肌醫者固執而灰下之間有未服藥而遽然下利不止者係邪不外出而
用內攻則為喘喘則皮毛閉發而為汗診其脈急數之中時見一止名之曰促因此而知邪雖內陷其氣仍欲外出自

當以葛根黃連黃芩湯乘機而施升發使內有外之陷者舉之此為太陽陽熱下利涼解之一法也又或太陽頭項強
痛病未周桂枝湯以解肌醫者齒井而數下之間或未經脈約而自利利甚則胃虛而生寒中氣無權既不能推託邪
熱以解肌遂協同邪熱而下利下利不止則胃愈虛而陰氣愈逆于上而為心下痞按宜桂枝人參湯解其表裡此為
太陽陽熱下利溫託之一法也又或利止而忽然寒熱往來口苦胸痞多嘔此邪氣欲從少陽而出陽者生陽持三陽而
機以利導或四逆散以順接陰陽一服而手足即溫此為少陽樞轉之一法也先聖所謂從陰出陽者生陽持三陽而
言也若夫吐利不止四逆水冷冷不回理中四逆吳茱萸之類隨脈隨經而治俗名直腸洞泄此胃脾俱敗而主同前卦
取諸剝此太陽內陷之危證也若吐止利斷而咽痛聲啞兩足攣連是邪從太陽而傳及少陰經云少陰之脈循喉嚨
繫舌本又云少陰之脈循足陰股是也傷寒論云少陰之為病脈微細但欲寐凡此為少陰寒化熱化俱有之證宜細
辨而用大劑可救十中之一二或回赤如木下寒而真陽上脫名為戴陽或身冷自汗但躁不煩欲臥于泥水之中內
寒而熱散于外名為格陽二證為陰盛陽亡真寒假熱之證非白通湯通脈四逆湯姜附用至一二兩水浸冷飲或間
加人尿豬膽汁日夜服五六劑不能救之或吐利後虛煩不得眠反得頻倒心中懊憹者為少陰之水火不交宜梔子
豉湯此煩躁兼見之中而煩重于躁為少陰熱化之稍輕者若心煩而至于不得卧手足躁動不安宜黃連阿膠湯此
煩躁兼見之中而躁重于煩者為少陰熱化最重之證至于熱一證則利止厥一證則又利即厥陰之厥熱相間證不
以目計而以時計得其意而變通可也大抵熱多厥少為順厥多熱少為逆若體厥無熱不可為矣又須參傷寒論消
渴氣上撞心中與熱飢而不欲食食則吐就等證以定為真陰陰證蓋此證以風木為本以陰寒為標以少陽之火
熱為中見所以然者三陰至厥陰為陰之已極故不從標本而從中見也寒熱二證最宜細辨如不得中見之化則為
寒證陽寒論謂脈微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不達者死若欲于死證求生含通脈四逆湯兼以灸法蓋無生理如中
見之化太過則為熱證傷寒論謂渴欲飲水者少少與之愈又謂脈滑而厥者裡有熱也白虎湯主之又謂下利脈沉
弦者下重也喻嘉言借用小柴胡湯又謂熱利下重者白頭翁湯主之又謂下利後更煩按之心下濡者虛煩也宜梔子豉湯余合前後各條
之又擇下利諸證者有燥屎也宜以小承氣湯又謂下利後更煩按之心下濡者虛煩也宜梔子豉湯余合前後各條
而細詳論中之旨厥陰為陰之極若不得中見之化其死倍速于他經故吳楚炎湯傷寒論本篇只治乾嘔吐涎沫頭

痛之病而余則以大吐大瀉不止若是吐瀉而厥者恐其極元力量有限用此方加烏梅九箇往往獲效此又他
外之法言外之方也先聖謂從陽入陰者死陰指三陰而言也此言甚微非熟于陰陽大論及傷寒論者不足以語此
門人問曰庚辰年之歲吾聞惡此而死者不少然皆起于五月或于六月七月至白露後漸輕而易愈且辰辰入震大旱
而熱甚人謂病由熱過年已入夏大瀉而寒甚人謂病由寒侵而兩感病形如一其故何也余曰此問工不可少內經
云春傷于風夏生飧泄又曰久服生飧泄此為伏氣乘時而發之病蓋五月建午陰生于午也六月建未陰生未而歲
也春夏之時脾土當旺脾為陰中之至陰陰盛生內寒魚以受侮日久中見無繼純是陰寒用事故吐瀉多起此兩月
亦有發于前後者蓋之來去逆逆主之也至白露後則為大瀉泄又當別論其不以早寒熱分者以病自內出在熱則
之氣化不在有形寒熱之類也病形略同處時而作所以謂之時疫門人等退而喜曰小子等承傳而知此證之所以
然又于夫子引春傷于風等句而知其然矣乃一方不止為嚴陰證言也蓋脾坤土也胃艮土也吐瀉無度四腹逆冷
是脾敗而胃亦敗兩土同病其為周易山地剝之象乎今得吳泰岳湯藥東方之生氣而可興足太陰脾土足陽明胃
土合德土木無忤其為周易地雷復之象乎此湯能轉剝為復所以為此證之神劑

錄千金按真人治霍亂吐下治中湯

道光三年家君年七十一歲于三月初旬石歸之客主一瘧病大約有二指長不及一吋其痛時竟如刀刺城中諸外
料無不延而診之每數藥而痛更甚端平後肌肉漸消飲食亦漸減再復一月日間只飲稀粥多過一二茶鐘斯秋
以後病轉劇煩躁不寧日夜不得安枕水米不能沾牙者十餘日不得已急備僕事忽于中秋夜半略醒以米湯
半杯飲之更覺飽脹思天下豈有半月絕穀之人尚能生存之理婉勸家君每日強飲稀粥數匙三日後覺早晚可
進一茶杯精神甫定即命曰我數年所著之書尚未完備即霍亂吐瀉二條亦須重補前三年患此病而死者十有
八九其實為元子約霍亂一證今有無知輩以絞腸痧疾食穀則死之定證妄名為霍亂以傷家霍亂證名為霍
亂兩字相峙其病互相通用貽害豈止一二人乎余錄仲景理中湯藥真人治中湯一以正羣言之夫亦以見古人立
法之純也

治中湯

人參

乾薑

白朮

甘草

三

石四味咬咀以水八升煮取三升分三服不瘧服三劑連行防霍亂

法之純也

上海大華書局印行

依前作凡如梧子大服三十丸如作散服方寸匕酒服亦得若轉知者加石膏三兩于忍石膏味薄并加三兩合煎成
六兩此方治心下痞滿上唇赤黃口乾舌燥大便不通或下利或嘔吐或泄瀉或發熱或惡寒或身重或身輕或身熱或身冷或身痛或身不痛或身不仁或身不識人

張路玉曰經云清氣在陰濁氣在陽榮氣順行衛氣逆行清濁相干亂于腸胃則為霍亂多由寒邪侵入下焦中焦致
食因之不知是即形寒飲冷者三焦傷也然實有陰陽偏勝病有寒熱非誤所以傷寒論首言熱多欲飲水者五苓散
寒多不欲飲水者理中凡千金更名治中列之三焦理是理寒熱不和治是治濕霍亂與經取並重之平溫以散寒參
朮之健運行甘草之舒緩與五苓散中用桂之溫不殊雖寒熱多少不同而溫散之理則一朱本議加青橘二皮以治
飲食所傷千金又增轉筋一則轉筋寒論之未備經世知轉筋用木瓜煎散收夏收之微熱傷脾此因清氣在陰而
走時胃氣用乾薑濁氣在陽而轉筋脈故用石膏主于理中凡加減諸法並宜確導嘔吐利止而身痛不休者宜桂枝
湯小和之及四逆湯通脈四逆湯甘草瀉心湯附子梗米湯等方端不出傷寒全書匯收氣逆上諸治也

微脈證且食積而起者宜胃苓湯加半夏乾薑五般虫木瓜以麥芽打糊為丸陳米湯送下三錢因熱而起者亦用前丸
如黃連為佐此皆實證易治也惟有虛證必用聖藥煎加附子守服四五十劑方效即單服附亦不外此法更有因于吐
酸而起者宜理中如黃連者連理凡以制約變者不受胃變此喻善言秘法也心下結聚如盤者宜桂枝湯去芍藥加麻
黃附子細辛日服二劑夜服一劑取微汗令大氣一轉其結乃散即以枳實湯送下泄其滿此仲景聖法也此病屬寒者
多故列于寒證

秘腹中論曰有病心腹滿且食則不能為食名為鼓脹治之以難矣理一劑知二劑已水脹為常曰鼓脹何如岐伯曰腹
脹身重大大與腹脹等也色蒼黃腹初起此其候也陰陽應象大論曰濁氣在上則生腹脹經脈篇曰足太陰虛則鼓
脹而中寒則腹滿本神篇曰脾虛則腹脹腎虛則腹至其要大論曰諸氣腫滿皆屬于脾諸腹脹大皆屬于熱太
陰陽明論曰食飲不節起居不時陰受之陰受之則入五臟入五臟則脹滿此實真法方宜論曰北方者其民樂野處
而食食寒生滿病按治此病必以經旨為主取用仲景之方方可全愈唐以後各書皆隨斷裂難不可姑試方書謂
單服腹為鼓脹以外望中宜其象如鼓也又名蠱脹以血氣結聚不可解散其毒如蠱也

散脈詩

雖然散脈胃寒渴虛證當知聖方病起吐酸連理妙桂甘祿附細辛導

蓋脈詩

蓋脈由來少的方山園卦內得津液貝安止息能均解其有如一子正張則順從無弗揚此

法方得治法廣而云在通生機原主動其心也書須知大氣本乎剛新也道中三日在丁謂明也此周易治

之通也今醫用之不一法仲師心下如盤訓宜苦宜辛二法詳此理不出方脈天地之知示人理其通

病氣者羣凡腫大而痛也大抵屬肝任脈與肝經之病而他經亦有之七病之名亦不必拘後賢于此證如一氣字可知

治此證以調氣為主統以五苓散作湯加小茴木香木通金鈴子主之如痛甚者瀉防其清瀾加金銀花為君再加乳香

沒藥為佐如麻木不痛者惡其為癰疽難治數年後如升如斗宜加桃仁附子薑椒沙參蘇蜜丸滋湯送下此證多屬

寒氣凝滯故列于寒證

經骨空論曰任脈病男子肉結七疝女子帶下癥聚督脈生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝長刺節論曰病

在少腹腹脹痛不得大小使病名曰疝得之寒經脈篇曰足厥陰肝病丈夫瘕瘕婦人少腹腫肝所生病為瘕泄狐疝陰

陽別論曰三陽為發寒熱其傳為癰疝邪在臟府病形篇曰小腸病者小腹脹腰脊攣攣而痛時客之後大奇論曰

腎脈大急沈肝脈大急沈皆為疝

疝氣詩

疝為任病與肝經面

木小通金鈴子典型合入五苓湯散妙石灰

厥證者四肢逆冷是也傷寒寒厥初病即厥未宜當歸四逆湯裡宜通脈四逆湯傷寒熱厥多見于傳經之後輕者宜四

逆散脈長者宜白虎湯脈沈實大便閉者宜承氣湯詳于傷寒門不贅若內經之論厥多端陽氣衰于下則手足寒亦名

寒厥宜桂附八味丸陰氣衰于下則手足熱亦名熱厥宜六味地黃丸血之與氣並走于上則為大厥厥則暴死氣復還

則生不還則死此不能以藥治當徐候之或半夏末搗鼻取嚏厥回後議前尸厥身脈皆動而形無知宜遠泥湯方用麻

黃

黃

上海文庫書局印行

黃三錢杏仁去皮尖二十五粒炙第一錢水煎服如藥酒不入分病人髮左右提搦按肩引之令服取效或厥者陰虧陽
振心如火燥不必手足逆冷病在于中宜白虎加人參湯厚厥者氣血俱耗相火成厥似大厥而稍輕病在氣血宜生蒲
黃一兩黑豆二兩炒以清酒淋下取數血厥者似大厥而亦稍輕婦人多有之宜白薇湯方用白薇人參當歸各二錢炙
草一錢水煎服氣厥者因怒氣而得宜七氣湯痰厥者痰涎如湧宜二陳湯加蒼朮白朮梨南星竹瀝薑汁食厥者因過
飽而得宜平胃散如痰厥者三錢煎服吐酒厥者醉後發厥宜五苓散去桂加黃連黃芩蘇葛皆足昏不知人而名之
其定為風痙之類近醫于猝倒之厥多誤認為傷寒然厥誤人不少內經寒熱二厥雖手足合言究竟寒熱先從足起知
其陰陽先衰于下不待手寒手熱皆當以厥論也說本張心在附經此證雖寒熱俱有而仲景每指肢冷而言近時稱名
從仲景而不照內經故列于寒證

血脈鮮滿曰內奪而厥則為瘡痂此腎虛也少陰不至者厥也調經論岐伯曰氣之所并為血虛血之所并為氣虛當曰
人之所有者血與氣耳今夫子乃言血并為虛氣并為虛是無定乎岐伯曰有者為是無者為虛今血與氣相失故為
虛焉血與氣并則為是為血之于氣并走于上則為大厥厥則暴死氣復反則生不反則死陽明脈解篇曰厥逆連臍
則死連臍則生按內經論厥不能盡述而此數節可以罕其大綱蓋內者腎也外者脾也也者氣逆也痛者口噤也
非者足靜也今腎虛而厥口不能言以腎脈決古本也足不能行以腎脈循陰股也重者謂血氣並走于上則下之空
虛可知神氣俱失其根所以暴脫欲死三章言連經者病在表故輕而生逆厥者病在根本故重而死人之根本雖
何腎中之水火也三章互相發明大虛者用劉河間地黃散子水虛者用路龍吉接命丹附錄接命丹方用人乳二酒
盞好梨汁一酒盞傾銀匙內重湯燉滾黃連起開香路為度每日空心一服蓋取以人補人之義也

厥症詩

醫書論厥互相換寒熱攸分辨細微裡熱三承脈表四逆
方別氣喘最足逆逆先聖法白微湯又重閉關
內寒通脈
外當歸
同中五異明標本症上異

寒症統論

六症有分經治者有不必分經治者桂枝麻黃湯表寒乾姜附子溫裡寒先活獨活祛表之風寒吳茱萸川芎溫裡之

風寒肉桂去血分之寒香附佐養附陰氣分之寒一陽三反可也理中湯補中土以統治諸厥中和之劑也吳茱萸湯大建中湯宜上焦之陽也真武湯扶下焦之陽以行水也附子湯回坎中之陽以祛寒也四逆湯救四肢之厥冷白虎湯通脈四逆湯更有新開奪命之奇龍骨湯若不宜剛燥之劑小便不利者可用桂附八味凡若已斃天肉從容小茴香沉香補骨脂皆溫補命門之善約與婦傷症相宜

醫學實在易卷四

熱證十條

傷寒頭痛項強發熱惡寒身疼痛而喘無汗而煩燥用大青龍湯溫病發熱不惡寒而口渴用麻杏甘石湯四時感冒時法用九味羌活湯表熱也陽明經身熱自汗而渴或服桂枝湯後大渴飲水用白虎人參湯中熱也不惡寒但發熱潮熱譫語便閉用三承氣湯裡實而熱也發斑語時法用三黃解毒湯犀角地黃湯裡熱也頭痛惡寒發熱而譫語小便短赤大便閉者用防風通聖散表裡俱實俱熱也法詳傷寒門不贅

傷寒表熱詩

太陽煩躁

黃汗大青龍麻杏石甘

溫病宗九味

羌活和

人參易老製能令表熱自肌鬆

傷寒中熱裡熱詩

汗渴心煩白虎湯陽明經熱散中方三黃

解毒

犀角地黃

熱歸裡結實未收此法良

傷寒熱入牙裡而實及表裡熱實詩

瞋潮便結語言狂熱結陽明承氣湯無汗不便表裡實防風通聖有良方

口糜齰爛出血心脾胃之火盛也宜甘密飲主之俗名便單蛾即方書所謂喉痹也便單蛾易治單蛾難治由心腎之火乘肺也宜刺手大拇指出血又以導赤散加桔梗貝母射干治之是為反惡法二證若服涼藥不愈宜用附子片以白蜜煎熟含其汁又以通脈四逆湯加豬膽汁人尿與服又以桂附八味湯加黃連少許水浸冷服是為從治法此證不可純用涼藥恐上熱未除中寒復起至氣乘虛入膈上喘下泄手足厥冷爪甲青口如魚口者死

內經云一陰一陽結謂之喉痹一陰謂心主一陽謂三焦二脈並結于喉氣熱內結故為喉痹

附引三條

咽者嚥也喉者候也咽接三脰以通胃故以之嚥物喉通五臟以系肺故以之候氣氣痰痰咽故然明白千金謂喉喉主通利水穀之道咽門主通振府津液神氣候也喉以納氣故曰喉主天氣咽以納食故曰咽主地氣喉風喉痹皆由腸胃素有痰涎或因七情不節而作火動痰上壅塞咽喉所以內外腫痛水漿不入言語不出可謂危且急矣

口瘡銀燭詩

口瘡銀燭火之災只盼慈雲甘露露喉痹生或潰赤散四逆

吐血咯血飲血鼻衄齒衄舌衄大便血血淋血崩等證皆為血不循經之病經者常也血所常行之路也血生于中焦半

隨衝任而行于經絡半散于脈中而充肌膚皮毛若外有所感內有所傷則血不循經道而行從上而溢則為吐血飲血

咯血鼻衄齒衄舌衄等症從下而溢則為大便血崩血淋血崩婦人血崩等症不必有五臟六腑之分也且五臟有血六腑

無血視則諸臟脈心下夾脊包絡中多血肝內多血心脾肺腎中各有血六腑無血近時以吐血多者謂吐血妄甚凡

吐血五臟血即死若吐血崩下諸症皆是經絡散行之血也謂因五臟六腑之病而致血崩可謂血從五臟六腑之中而出

則不可也余讀本草經內經金匱千金等書別有所悟新刻育竹如一檢隨宜佐以寒熱補瀉之品一服即效所以然者

人身之脈絡不和則充膚熱肉滲滲皮毛之血不循行其常道則上吐衄而下崩中今得竹茹以和之是以竹之脈絡通

人之脈絡而為治也若從風寒得者取黃湯加味可用若從熱毒得者竹葉石膏湯白虎湯六一散可用若從秋燥得者

瀉白散可用諸經之火熾盛者四生凡可用六味地黃湯亦可偶服皆治林之劑也若固元湯之平補理中湯之溫補甘

草乾薑湯之補其上黃土湯之益其中下與補氏遺書所言血難陰難運之者其陽和二句均得各大家不言之秘余于

此證多方保加鮮竹茹三四錢為效甚速或另以大黃桃仁行血破滯之劑折其銳氣滑伯仁云血既妄行遺失故遺不

去血行率則以安為常易以禦之且去者自去生者自生何處之有尤在溪曰去者自去生者自生人易知也療者未去

則新者不守人未易知也細心體驗自見此證不獨屬于熱因內經有不遠熱則熱至血溢血泄之病生句故列于熱證

血證詩

血證詩

血隨氣布四時要經失氣度命腸若近虛寒則麻黃湯以麻黃散血行於經脈功歸澤瀉苓解
到理中湯黃土湯外導行脈絡竹皮青

下血久不止用斷紅丸詩

任血海督司樞常女得秘傳斷三錢同側相虎耳一具斷紅丸一具如黃連散

血證弱極用當歸補血湯詩

血證陰類運陽和內經反者運無黃黃黃用倍多少佐當歸陰得主以陽為主

何促者氣上衝而不得倚息也與痰飲咳嗽哮喘症泰看有內外虛實四證外證為風寒以小青龍湯加杏仁主之內證為

水飲以小半夏湯加茯苓八錢主之實證非氣閉不開即肺脹不約氣閉因支飲壅滿呼吸不能自如以葶藶大寒瀉肺

湯主之肺脹其人喘目如脫狀脈浮大者以越婢加半夏湯主之虛證非脾虛不能轉運即腎虛不能吸納脾虛以六君

子湯加乾薑細辛五味子主之腎虛以真武湯黑錫丹主之亦有氣短為微飲宜從小便主之出氣短者宜苓桂甘水湯

入氣短者宜腎氣丸此症不盡屬于熱肺內經有諸逆上衝皆屬于火句故屬于熱證

喘促詩

喘分內外實虛壅內乾小夏外乾小龍兩路壅氣阻實痰喘危下肺為實壅乾脾施虛而不運六君

好肋虛若根根真武湯逆順飲利便呼吸肺為實壅乾脾施虛而不運六君

哮喘亦發一發則肺胸之寒氣與肺膜之濁痰狼狽相安室塞關隘不容呼吸而呼吸正氣轉觸其痰野動有聲非泛常

之約所能治宜聖濟射干丸主之然瘰癧難為得法及必于潛伏為核之處斷其根株須灸肺腧膏肓天突諸穴此瘰癧

哮喘亦發一發則肺胸之寒氣與肺膜之濁痰狼狽相安室塞關隘不容呼吸而呼吸正氣轉觸其痰野動有聲非泛常

之約所能治宜聖濟射干丸主之然瘰癧難為得法及必于潛伏為核之處斷其根株須灸肺腧膏肓天突諸穴此瘰癧

哮喘亦發一發則肺胸之寒氣與肺膜之濁痰狼狽相安室塞關隘不容呼吸而呼吸正氣轉觸其痰野動有聲非泛常

之約所能治宜聖濟射干丸主之然瘰癧難為得法及必于潛伏為核之處斷其根株須灸肺腧膏肓天突諸穴此瘰癧

哮喘亦發一發則肺胸之寒氣與肺膜之濁痰狼狽相安室塞關隘不容呼吸而呼吸正氣轉觸其痰野動有聲非泛常

之約所能治宜聖濟射干丸主之然瘰癧難為得法及必于潛伏為核之處斷其根株須灸肺腧膏肓天突諸穴此瘰癧

非因熱所致緣內經有諸逆上衝皆屬于火之所致故與喘促均列于熱證

哮喘

寒伏胸中哮喘根射于凡科是喘謂再將天突膏膏灸陳敏新邪絕靈

五淋者小便短數淋瀝不斷並痛是也澀閉者小便數澀不通澀閉欲死是也二症皆膀胱之氣不化三焦之液清不行所致宜五淋湯主之尿出如膏為膏加草薢溺血莖中割痛為血淋加桃仁黃金牛膝排膿膏一二厘因勞而得為勞淋加人參黃芪因動氣而得腰膝酸軟為氣淋加紫蘇生參牙沉香下如沙石為沙淋調下黃芩與腦中之石聚灰清石各等分為末三四錢梅開服利水藥不效者即用補中益氣湯服二時許二煎再服即以手探吐此開上竅以通下竅法也或用麻黃三四錢杏仁十四粒加于五淋湯中此通陽氣以達陰氣法也或用天門冬麥門冬桑白皮各五錢人參杏仁紫苑各三錢水煎服此從高原以導水法也或以白菊花根搗汁調白酒服或以海螵皮四兩浸去膠味加茶薢去皮十四個水煎服或陰虛不能配陽以化水者宜滋腎之或元氣自虛不能化水者宜桂附八味丸尤氏謂重陰淫寒地道閉塞推與白濁湯多加蔥白陽氣一至二便之通矣再加人尿一盞尤效又有色慾過度似淋非淋溺短而數莖中痛甚宜肉蓯蓉溫羊寶生杜仲為君佐以白蜜羊脂之類方效與淋閉之法不同此證多係熱結膀胱故列于熱證

秘靈蘭秘典論曰小腸者受盛之官化物出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣宜明五氣為曰膀胱不利為癃不約為遺溺生氣通天論曰陽不勝其陰則五臟受邪九竅不利口閉為曰中氣不足渡便為之變至機真藏論帝曰夫子言脾為孤藏中央土以灌四旁其太過與不及其病何如歧伯曰太過則令人四逆不舉不及則令人九竅不通名曰重強氣厥論曰胞絡移熱于膀胱則癃溺血膀胱移熱于小腸隔腸不便上為口癰經脈篇曰肝所生病者遺溺閉癰足少陰虛則閉癰癰論曰腸痹者數飲而出不得中氣喘爭時發憤泄胞痺者小腸膀胱按之內痛若沃以湯難以小便上為清涕六元正紀大論曰陽明司天之政民病癰閉

五淋

五淋症用五淋湯隨症增加記要詳熱病似淋且割痛莖者生虎寶脂量

癰閉

癰閉似淋點滴無只求利水法全近柴升補中益氣湯探吐鐵機轉麻杏仁行湯法氣滿腎氣龍膏澤自

通關此方雲合兩時數二冬告完此方白此方探吐鐵機轉麻杏仁行湯法氣滿腎氣龍膏澤自

濁病皆濕熱之病濕勝熱則為白熱勝濕則為赤初起宜二陳湯加蒼朮白朮黃柏草薢主之赤濁再加丹參如若未效

宜固其精通利其水道用草薢分清飲或久而不愈宜補其心氣用四君子湯加遠志二錢或水虛火旺而為濁宜六味

火加黃柏蒼朮益智仁之類或火衰氣不攝精宜桂附八味凡加虎標車前之類濁出精微異井出溺數不同總以治腎

為主然起初多由于濕熱故列于熱症

此至真要大論一頭轉反戾水液渾濁皆屬于熱太陽之勝陰中乃陽陽曲不利互引陰股痿論曰思想無窮所願不得

意淫于外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫口問篇曰中氣不足溲便為之變玉機真論冬脈不及則令人

小腹滿小便變按宜參歷明遺濁各章文瀆證詩

濁由濕熱二陳湯加水蒼朮白朮草薢砂朮本此方水道全書此方遠志此方入心家入氣家氣足為主水關

地黃湯可嘉備用遺精封髓法時方却不停長沙

呃者噦字從濕濕者水也口中出水而無食也吐者吐字從土土者食也口中吐食而無水也呃吐者水與食並出也噦

者口中有穢味也又謂之乾呃者口中有穢味未有不乾呃也呃逆者氣衝有聲聲短而頻也昔人亦謂之噦時言分別

多誤今特正之統用二陳湯倍半夏加生薑為主以統治之熱加黃連鮮竹茹鮮蘆根寒加吳茱萸人參大棗食積加六

神曲妙山查麥芽乾姜噦加旋覆花人參代赭石呃逆加竹茹四錢倍用橘皮如久病發呃為脾胃之氣將絕用人參一

兩乾姜附子各三錢丁香沉香各一錢可救十中之一以上諸症皆陽明氣逆之病故一方可以統治惟吐逆宜去

甘草加川椒人參吳茱萸黃連黃柏乾姜高樛肉各一錢治之此症不盡屬熱經內經有諸逆上衝皆屬于火之訓故列

于熱證

嘔吐噦呃逆詩

四證再漢王二陳湯寒濕虛寒其因若由虛呃人參附子乾姜通梅椒相連

吞酸病多屬于肝宜以左金丸連理湯加陳半為主方小葉胡湯平胃散等之

上海大華書局印行

版至其要大論曰諸嘔吐酸暴下迫皆屬于厥又曰少陽之勝嘔酸善飢

吞酸詩

吞酸連理為左金丸平胃燥滯胡可亦可安寒熱補消寒變用病機指示屬于肝

三消證上消者口渴不止也治以人參白虎湯中消者食入即飢也治以調胃承氣湯下消者飲一溲二也治以腎氣丸趙養葵云無分上中下先以治腎為急以六味丸料一斤入肉桂五味子各一兩水煎六七碗意意冷飲熟睡而疾如失此以其溫約引其真水以滋上中下之燥也此為火病故列于熱證

三消詩

上消以白虎湯中消以承氣湯下消以腎氣丸可貴趙氏治時經三消地黃丸料一斤桂心五味子各一兩

附錄張隱若消渴論

病陽明之燥熱而消渴者白虎湯主之此外因之渴也胃氣弱而津液不生者人參湯主之此內因之渴也有脾不能為胃行其津液肺不能通調水道而為消渴者人但知以涼潤之藥治渴不知脾喜燥而肺惡寒試觀泄瀉者必渴此因水津不能上輸而惟下泄故爾以燥脾之藥治之水液上升即不渴矣故以涼潤治渴人皆知之以燥熱治渴人所不知也

人參湯方解性理中湯原方有乾薑甘草

程郊倩云參尤炙草所以因中州乾薑中必假之始釜新而騰陽氣是以投入于陰長氣于陽上輸垂蓋下撫州都五臟六腑皆以受氣矣此理中之旨也

續論

消渴證醫者喜用麻板蜜甲元參枸杞子天門冬麥門冬天花粉五味子生地黃熟地黃玉竹女貞子石斛蛤蚧牡蠣之類開口便云戒口苦急生津液約品惟取中和求效勿期旦夕斯語也近情近理雖最道其非者而不知似是之言最為誤事治病如治國國中不悉有真小人惟患有偽君子也蓋彼既以津液為重亦知津液本吾身之真水乎水不自生一由氣化一由火致黃六一湯取無化為水之義也惟氏腎氣丸取火能致水之義也七味白朮散方中有