

時病論卷之四目錄

夏傷於暑大意

傷暑

冒暑

中暑

暑風

暑溫

暑咳

暑瘧

霍亂

痧氣

穢濁

疰夏

熱病



霉溼

擬用諸法

祛暑解毒法

增損胃苓法

清暑開痰法

卻暑調元法

清離定巽法

清宣金臟法

甘鹹養陰法

治亂保安法

挽正回陽法

芳香化濁法

金水相生法

二活同祛法



備用成方

藿香正氣散

六和湯

縮脾飲

香需飲

新加香需飲

桂苓甘露飲

竹葉石膏湯

人參白虎湯

六一散

三石湯

清營湯

來復丹

介賓玉女煎

生脈散



清暑益氣湯

漿水散

冷香飲子

大順散

痧疫回春丹

行軍散

絳雪

紫雪

黃龍湯

臨證治案

陰暑誤用陽暑之藥

驟然中暑

暑風急證



暑溫過服大寒致變

暑熱劫絡致成暑瘵

陰寒霍亂熱補而瘳

陰虛疰夏

熱病化燥傷津

霉溼時病



南京中醫藥大學
1954
南京中醫藥大學圖書館版權所有

時病論卷之四

安州劉賓臣先生鑒定

三衢雷 豐少逸手著

受業

新安程曦錦雲
盈川江誠抱一

叅訂

夏傷於暑大意

夏傷於暑者。謂季夏小暑大暑之令。傷於暑也。其
時天暑地熱。人在其中。感之皆稱暑病。夫暑邪襲
人。有傷暑冒暑中暑之分。且有暑風暑溫暑咳暑



瘵之異傷暑者靜而得之爲傷陰暑動而得之爲傷陽暑冒暑者較傷暑爲輕不過邪冒肌表面已中暑者卽中暈也忽然卒倒如中風狀暑風者須臾昏倒手足遂抽暑溫者較陽暑略爲輕可暑咳者暑熱襲肺而咳逆暑瘵者暑熱劫絡而吐血又有霍亂之證因暑氣夾風寒溼食擾亂於中痧氣之證因南方體弱偶犯沙穢之氣穢濁之證因暑氣夾穢而襲人卽俗稱爲齷齪也此皆季夏由暑

氣所傷之證也。更有春末夏初之疰夏。孟夏之熱病。仲夏之霉溼。亦當論治。蓋病夏者。因時令之火。爲病熱病者。因名時之伏氣爲病。霉溼者。入霉之後。梅雨淫淋。感其雨溼之氣。爲病。斯三者。附論於茲。則夏令之病。皆全備矣。

傷暑

長夏傷暑。有陰陽之別焉。夫陰暑之爲病。因於天氣炎蒸。納涼於深堂大厦。大扇風車得之者。是靜而得

之之陰證也。其脈浮弦有力，或浮緊，頭痛惡寒，身形拘急，肢節疼痛而心煩，肌膚大熱而無汗，此爲陰寒所逼，使周身陽氣不得伸越，宜用辛溫解表法，減去防風，益以香薷，藿香治之。嘔逆加茯苓，半夏，便瀉加厚朴、木香。又有陽暑之病，緣於行旅長途，務農田野，烈日下逼得之者，是動而得之之陽證也。其脈浮洪有力，或洪數，面垢喘咳，壯熱心煩，口渴欲飲，蒸蒸自汗，此爲炎熱所蒸，使周身中外皆熱，宜以清涼滌暑。

法去扁豆通草加石膏洋參治之嘔逆加竹茹黃連
便瀉加葛根荷葉更宜審其體實體虛而藥之自無
不當耳

張介賓曰陰暑證或在於表或在於裏惟富貴安逸
之人多有之總由恣情任性不慎風寒所致也陽暑
證惟辛苦勞役之人多有之由乎觸冒暑熱有勢所
不容已也然暑熱逼人者畏而可避可避則犯之者
少陰寒襲人者快而莫知莫知則犯之者多故凡有

病暑者、陽暑多不見、而陰暑居其八九、今之人治暑者、但見發熱頭痛等證、則必曰此中暑也、而所用無非寒涼、其不達也亦甚矣、

江誠曰、介賓先生謂陰暑多於陽暑、最爲確切、今人治暑、不別陰陽、一見發燒、遂投涼藥、若此貿貿、則害人匪淺矣、

冒暑

冒暑者、偶然感冒暑邪、較傷暑之證、稍爲輕淺耳、夫



北京中醫藥大學圖書館版權所有

暑熱之邪。初冒於肌表者。卽有頭暈寒熱汗出咳嗽
等證。宜以清涼滌暑法加杏仁。襲殼治之。其證雖較
傷暑爲輕。然失治入裏。此又不可以不知也。如入於
肉分者。則周身煩躁。頭脹體燒。或身如針刺。或有赤
腫等證。宜以祛暑解毒法治之。如入於腸胃者。則有
腹痛水瀉。小便短赤。口渴欲飲。嘔逆等證。宜以增損
胃苓法佐黃連治之。然冒暑之證。雖謂爲輕。亦必須
防微杜漸耳。

中暑

卽中暍
附暑厥

潔古曰、靜而得之爲中暑、東垣曰、避暑乘涼得之者、名曰中暑、其實二說皆是陰暑之證、而無中字情形、似不可以中暑名之、考中暑卽係中暍、中暍之證、可以不必另分、蓋中暑忽然而發、如矢石之中人、也不似傷暑初則寒熱無汗、或壯熱蒸汗之可比、是病忽然悶倒、昏不知人、軀熱汗微、氣喘不語、牙關微緊、亦或口開、狀若中風、但無口眼喎斜之別、其脈洪濡、或

滑而數緣其人不辭勞苦赤日中行酷暑之氣鼓動其痰痰阻心包所致宜清暑開痰法治之如果手足厥冷名曰暑厥宜蘇合香丸化開灌之或以來復丹研末白湯灌之或以蒜水灌之或剝蒜肉入鼻中皆取其通竅也俟其人事稍甦繼進卻暑調元法爲治

暑風

暑風之病良由暑熱極盛金被火刑木無所畏則風從內而生此與外感風邪之治法相懸霄壤若誤汗

之變證百出矣。夫木既化乎風而脾土未嘗不受其
所制者。是以卒然昏倒、四肢搐搦、內擾神舍、志識不
清、脈多弦勁或洪大、或滑數、總當去時令之火、火去
則金自清、而木自平、兼開鬱悶之痰、痰開則神自安、
而氣自甯也。擬用清離定巽法、佐以鬱金川貝治之。
倘有角弓反張、牙關緊閉者、宜加犀角羚羊、痰塞喉
間有聲者、宜加膽星天竺、服藥之後、依然昏憤者、宜
加遠志菖蒲、然而證候至此、亦難治矣。

暑温

考暑温之證，較陽暑略爲輕可。吳淮陰曰：温者熱之漸，熱乃温之極也。其名暑温，比暑熱爲輕者，不待言矣。在醫者務宜畱心慎藥，弗使温盛成熱耳。夫暑温之初病也，右脈勝於左部，或洪或數，舌苔微白，或黃而潤，身熱有汗，或口渴，或咳嗽。此邪在上焦氣分，當用清涼滌暑法，加杏仁、蘆薈治之。倘汗少而有微寒，或有頭痛者，宜透肌膚之冒，於本法內去扁豆、瓜翠。

加藿香香需治之。如口不渴者，乃兼溼也。加米仁半
夏治之。如舌苔黃燥，渴欲喜飲，宜清胃家之熱，用涼
解裏熱法治之。如舌苔光絳，傷於陰也，宜用清熱保
津法。加西洋參、北沙參、元參治之。總當細究其因，或
夾冒，或夾溼，或胃熱，或陰傷，按證而分治之，未有不
向愈者。

暑咳

暑咳之爲病，獨在暑月也。良由暑熱下逼，先傷乎上。