

明醫雜著



明醫雜著卷五

吳郡後學薛已註

臍風

小兒初生百日内臍風方書率用南星殭蚕等
風藥多不効當作胎毒瀉陽明火邪馬牙亦是
胎毒用針挑破桑樹白汁塗之桑汁主小兒驚
口及口瘡舌上瘡神効初生小兒時時與看頻
傳桑汁不然舌硬緊漸至撮口難治

愚按曾世顯云嬰兒一七之內腹肚脹硬臍
畔浮腫口撮不開攢眉而叫名臍風或因剪

臍帶少短或因束縛不緊牽動風入臍中或因鐵器斷臍冷氣入內傳於脾絡致舌強唇青手足微搐不能吮乳啼聲似鴉喉痰潮響急搗破口泡去其毒水以艾灸臍中亦有復生者治法多端無如灸法或以天南星一錢生姜自然汁調灌爲妙

變蒸

小兒不時變蒸變者異常也蒸者發熱也所以變換五臟蒸養六腑須待變蒸多遍氣血方榮骨脈始長

愚按錢仲陽先生云小兒在母腹中乃生骨
氣五臟六腑成而未全自生之後即長骨脉
五臟六腑之神智自內而長自下而上故生
後三十二日一變蒸始即智意異前蓋人有
三百六十五骨除手足中四十五碎骨外有
三百二十數自生下骨一日十段而上之十
日百段三十二日計三百二十段爲一變亦
曰一蒸骨之餘氣一自腦分入齦中作三十
二齒則齒數當與變日相合然而齒有不及
三十二數者由變不足其常也有或二十八

日即止長二十八齒已下倣此但不過三十
二之數凡一周遍乃生虛熱諸病如是十周
則小蒸畢也計三百二十日生骨氣乃全而
未壯也故初三十二日一變生腎生志六十
四日再變生膀胱其發耳與聾冷腎與膀胱
俱生於水水數一故先變主之九十六日三
變生心喜一百二十八日四變生小腸其發
汗出而微驚心爲火火數二一百六十日五
變生肝哭一百九十二日六變生膽其發目
不開而赤肝主木木數三二百二十四日七



變生肺聲二百五十六日八變生大腸其發
膚熱而汗或不汗肺者金金數四二百八十
八日九變生脾智三百二十日十變生胃其
發不食腹痛而吐乳此後乃齒生能言知喜
怒故云始全也太倉云氣入四肢長碎骨於
十變後六十四日長其經脉手足受血故能
持物能立能行也經云變且蒸謂蒸畢而足
一歲之日也師曰不汗而熱者發其汗大吐
者微止不可餘治全嬰方云變蒸者長氣血
變者上氣蒸者發熱也輕則體熱虛驚耳冷

微汗唇生白泡三日可愈重者寒熱脉亂腹
疼啼呌不能乳食食而即吐哕五日方愈其
候與傷寒相似但以唇上白泡驗之亦有受
胎氣壯實不熱不驚或無證候而暗變者竊
謂此症小兒所不能免不必服藥古方以黑
散子紫丸子主之非惟臟腑不能勝受抑且
反傷氣血慎之慎之嘗見一小兒至二變發
熱有痰或治以抱龍丸一粒卒至不救可以
驗矣然父母愛子之心勝稍有疾病急於求
醫而醫者不究病情率爾投劑殊不知病因



多端見症相類難以卒辨況古人稟厚方多峻厲之劑緩服可也

潮熱

小兒潮熱或壯熱不退多是變蒸及五藏相勝不必用藥又多是飲食停積鬱熱由中發外見於肌表只理其中清陽明之熱而表熱自除不可認作外感輕易發汗用小柴胡輕利等藥重傷其內又潮熱不退恐是出痘亦當審察勿便用藥

愚按前症若因飲食停積或腹痛吐瀉或肚

腹膨脹宜用保和丸以消導健脾若飲食既
消或腹痛不食或肚腹膨脹宜用四君子以
保養胃氣若因誤行汗卜損傷元氣宜用參
耆歸朮陳皮甘草以補中氣大凡傷食脾胃
必損宜固胃氣庶無變症若寅卯辰時熱者
屬肝經也巳午未時熱者屬心經也申酉戌
時熱者屬肺經也亥子丑時熱者屬腎經也
當詳其虛實而治之凡屬虛熱實熱投以攻
補之劑其病既不增減乃是病根深固而藥
力未能及耳須宜多服功力既至諸病悉退

切不可改爲別治設或藥不對症禍在反
慎之○李閣老子患潮熱飲食如故自申
時甚至子丑時方止遍身似疥大便秘結小
便赤澁熱渴飲冷余以爲脾胃實熱傳於肺
與大腸先用清涼飲四劑結熱始退又用四
物湯加柴胡黃連數劑其瘡漸愈彼欲速効
另用槐角丸之類諸症益甚遂求於施院長
亦用四物湯加柴胡黃連加桃仁赤芍藥至
百劑而愈

施院長名鑑字
銀臺弟

大小便白

小兒大小便時時審看小便如米泔或澄停少
頃變作泔濁此脾胃濕熱也若大便泔白色或
如魚凍或帶紅或色黃黑此積滯濕熱也宜
脾消滯清中宮去濕熱節飲食若忽然變青此
是變蒸也不必用藥若久不愈用補脾制肝藥
一二服亦不宜多用

愚按小便如泔或大便泔白宜用肥兒丸若
積滯黃黑宜用四君子加黃連木香若色青
日久不復或兼泄瀉或兼腹痛當用六君子
加木香芍藥若肌體色黃小便不利髮黃脫

落鼻下瘡痍嗜土少食大便秘青褐色者須用
梔子茯苓湯

詳見治疳要藥下

小兒病多屬肝脾二經

小兒病大率屬脾土肝木二經肝只是有餘有
餘之病似重急而爲治却易見効亦速脾只是
不足不足之病似輕緩而爲治却難見効亦遲
二經爲病惟脾居多用藥最要分別若肝木自
旺則爲急驚目直視或動搖手足搐搦風痰上
壅等症此爲有餘宜伐木瀉肝降火清心若脾
胃虛而肝木來侮亦見驚搐動搖諸症但其勢

微緩名曰慢驚宜補養脾胃不可錯認將脾經誤作肝經治也

愚按急驚乃風火之症脾土受制肝經實熱者用瀉青丸徑伐其肝或導赤散以瀉其子肝經虛熱者用六味地黃丸以滋腎水補中益氣湯以養脾土則風木自息脾土自安矣若因乳食不調脾胃虧損木來侮土似慢驚而見抽搐搖頭劄目咬牙等症宜用六君子加釣藤鈎若脾胃虧損寒水反來侮土成慢驚而見前症用前藥加姜桂如未應更加附

子多有復甦者○舉人杜克宏子發熱抽搐
口噤痰湧此肝膽經實火之症即急驚風也
先用瀉青丸一服又用六味丸二服諸症頓
退乃以小柴胡湯加芩歸山梔釣藤鉤而安
却用補中益氣湯而愈

急驚

急驚是有餘之症屬肝木心火陽邪太旺宜直
瀉之降火下痰是也五藏俱有陰陽如肝氣爲
陽爲火肝血爲陰爲水肝氣旺則肝之血衰矣
火妄動則水被煎沸不寧矣陽旺陰消風火相

搏陰血走散勢所必至也故亦宜養血急驚雖屬肝心然木火旺則肺金受虧不能平木木來尅土斯損矣故亦宜養脾況治驚諸藥大率祛風化痰瀉火峻厲及腦麝辛散之味易於消陰血損脾胃者故治有餘急驚之症先須降火下痰一二服後加養血安神之藥若飲食少大便溏或吐瀉則當兼補脾胃若脾胃原虛當於直瀉藥中加補脾藥若屢作屢服利驚驅逐之藥便宜認作脾虛血散治驚藥內加養血補脾藥不可用溫熱丁香等藥恐助胃火宜參朮芍藥

等以補脾中氣血麥門冬黃連以清金制木

愚按前症若肝經風熱抽搐目瞤筋急痰盛
等症用四物湯以生肝血釣藤鉤以清肝火
更用四君子以補脾土若肝經血燥發熱驚
搐眼瞤痰盛筋攣用六味丸以滋腎水生肝
血用四君子加芍藥以補脾土生肺金若肺
金尅肝木用六君子以實脾土芍藥木香以
平肺金若屢服利驚之藥而脾胃虛寒者須
用六君子以補脾胃加丁香木香以培陽氣
若脾土虛寒腎水反來侮土而致中寒腹痛

吐瀉少食等症者用益黃散以補脾土而瀉
寒水庶幾不致慢驚矣治當審察虛實凡症
屬有餘者病氣也不足者元氣也故有餘當
認爲不足思患預防斯少失矣

急驚變慢驚

急驚屢發屢治用直瀉藥既多則脾損陰消變
爲慢驚當主以補脾養血佐以安心清肺制肝
之藥

愚按前症多因吐利脾胃虛損肝木所乘或
腎水反來侮土所致故似搐而不搐先用鈞