

校正醫學入門

五 上海掃葉山房印行



補註醫學入門外集卷之五

丹溪朱先生雜病纂要 詳格致餘論局方發揮丹溪心法纂要日用醫按及今附餘併
各名家方書如巢氏病源好生書儒醫纂要惜乎未之見也

雜病提綱 外感 風 寒 暑 濕 燥 火
內傷 脾胃氣血痰鬱積熱諸虛痼冷

外感

風 口舌 頭痛 面風 痺風 耳 鼻
牙齒 痛風 斑疹 遊風

中風卒倒分真似

為風為百病長善行數變為卒中昏倒為竄視渴解為搐搦反張或為寒中或為熱中或

胃氣相搏則不仁與榮氣相搏則半身不遂入經癱瘓入絡膚頑入腑即不識人入臟即舌強吐沫挾熱

口眼喎斜語話難

大艾三五壯外反緩正氣反急牽引口眼喎斜或左或右急搗人中拔頂髮灸耳垂珠粟米

去內用正舌藥白附子姜蠶全蝎等分末酒調服二錢○不語有數端有風中心脾者資壽解語湯有

風中心經者小續命湯去桂附加葛蒲有痰塞心竅者導痰湯加葛蒲人參竹茹或苓連有舌本強硬語

言不正者用蝎稍二錢半茯苓一兩薄荷二兩為末酒調服二錢或擦牙尤妙又有風 痰塞喉中聲噤

熱壅者有血虛氣虛者有腎虛及老人忽言不出者十全大補湯去桂加葛蒲遠志 半身或只不遂此

同上卒倒歪斜不語名風癱身軟有汗者生汗不出者十全大補湯去桂加葛蒲遠志 半身或只不遂此

偏枯言不變智不亂病 四肢癱此名風痺智亂不能言者難治其症身體無痛錢則四肢不舉急則一身

在膚湊之間溫取汗 四症 偏枯痺風 全無 換骨丹黑虎丹神仙飛步丹有脾實者膏梁之疾非肝腎虛痿 又有五痺類風狀見四症偏枯痺風全無

莫浪猜 傷寒中寒中濕痰厥氣厥食厥熱厥虛暈等症皆卒倒不語但風必有歪斜搐搦之症為異雖內



上海中醫藥大學圖書館藏

中似實虛主火問河主氣東或王濕丹內傷兼中似盡相須三子所主雖殊而實同也況濕則中氣不

也氣衰賊邪容易襲傷元氣壯盛膝理緻密邪不能入惟中年氣血始衰膝理空疎加以七情勞後飲食內

病也有醉後當風頭面多汗善渴者名曰漏風宜黃芪六一湯加參朮牡蠣乾葛有房勞中風下體多

日內風十全大補湯加附子防風又名夾食中風久則為下血有傷食變為暴厥亦類中風但得食則病

耳久則為陽風食後曰胃風又類中風當分消以瀉濕毒有內傷熱症似中風者有雜病虛症似中風

悶須探吐及理脾胃有酒濕病亦類中風脈沉身涼無疫涎為異耳如思慮內脫憂愁肢體悲衰筋脈拘攣

者均不可火動氣中無涎汚盛怒腰膝即河間所謂將息失宜五志過極則心火暴甚腎水難制氣逆

以風治中無涎汚真中中腑着四肢脈手足拘攣或中身前身後身側可治

氣散合星香散虛者八味順氣散實者四七湯正中臟開塞九竅多昏危中臟開塞九竅多昏危

湯或排風湯風從汗散通因通用是也如脈浮不語者用中臟開塞九竅多昏危

防風黃芪煎水一担置牀下薰入鼻中良久能言進藥中臟開塞九竅多昏危

口閉肝絕眼閉脾絕手散肺絕痰如拽鋸腎絕遺尿或大吐大瀉下血吐血者皆死宜三化湯後風

順氣丸麻子仁丸凡攻裏忌腦麝牛黃引風入骨花甘遂損傷氣血如汗多尿少者忌利榮竭無以

制火煩熱愈其候熱中血脈絡也則歪口眼或近於臟內亦有六經形症則從小續命湯加減微利又有中

退汗止小便自利中血脈絡也經亦要知內阻無便溺外無六經症從中治不可汗下蓋風本於熱熱勝則風動宜養血以勝燥大秦羌湯

微利愈風湯加大黃中腑雖宜汗多則亡陽中臟雖宜下下多則口不能言肢不持手足不能運動乃

亡陰若臟腑兼見者或先汗而後利或表裏兼攻者防風通聖散口不能言肢不持

舌左為死血留滯與少血四物湯少加防風羌活痰與氣虛身右居則痰火流注於右而為痰急治則愈

久則痰火鬱結難治痛者為實先以二陳省風之類治痰後以防風通聖散瀉青丸之類瀉火不痛為虛

血虛者四物湯俱薑汁炒過加竹瀝羌汁肥人濕痰少如附子行經瘦人火動加黃柏氣虛者四君子湯

虛其遺尿聲嘶睡者濃煎參芪加附子薑汁勞傷者補中益氣湯加竹瀝兼通治開關化涎沫開關散

治右痰咳盛者二陳湯加薑汁竹瀝能食者換荆瀝此丹溪雜病通法也通治開關化涎沫開關散

嚏可治無嚏者死牙關緊急入藥不得者用南星五分龍腦一字端午日午時合每用一字至五分擦牙

熱自開痰甚者宜量虛實吐之虛者稀涎散微微吐出冷涎實者用水蒂炒黃末五分或一錢入全蝎末

半分吹入鼻中吐如不吐用酸薑汁調下如再不吐用熱薑汁投之此藥不可輕用吐後宜服降火利氣安神定志之藥吐清見傷寒但中風大吐涎出久則手足骨節皆枯不能轉動清利以藥壓下再得首節可也小兒**順氣活血風自祛**真氣漸復痰飲漸消或尚有風邪未退羌活愈風湯調之實者則活

散虛者萬寶回春湯未可全以風治也抑論舊以西北風高真中宜分臟腑經絡調治東南地濕氣重中宜分氣血虛實痰火多少調治然真中兼中南北互有且治臟腑者不可不分氣血之虛實治氣血者又不可不分臟腑經絡之邪多少乎大抵外感重而內傷輕者先須分表裏祛風祛風為主次用氣

肌蠕動風覺手足麻木肌肉蠕動者風之兆也宜右心抑憤亂宜烏藥**預防之法亦堪推**樂風丹五參散文國

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通膀胱最易感冒新咳嗽惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

苦茶調散痰多者金沸草散扶熱人參敗毒散升麻葛根湯扶寒十神**挾內慎勿專攻外**服食過厚素有

湯挾寒濕消風百解散挾濕神水散扶暑香葛湯時行柴胡升麻湯

流涕聲重咳嗽暑被外感則甚者防風通聖散或大黃黃芩等分丸白水下素虛者只用防風羌活川

勞役傷氣者補中益氣湯加羌活防**重則傳變輕不傳**風重傳裏一久其能為氣血害風能燥血散氣故

風風虛甚者羌活九加味烏荊丸**湯久不愈者只宜三白湯加減飲之切**同傷寒治法

忌疎泄雖初起非寒月無汗麻黃禁**寒**咳嗽一霍亂腹痛

中寒無汗肢僵仆傷寒循經漸入中寒不問冬夏或當風取涼或坐地受冷肅殺之氣自皮膚卒入臟腑

逆無手足溫煖則生外極冷唇青厥**急分三陰煖下元**倉卒難分經絡急煎姜附理中救之次審中脫疼痛

或臍腹疼痛五積散加吳萸小腹痛中厥陰者當歸四逆湯加吳萸或五味子如陰盛煩燥熱藥

冷飲或加些涼藥為引溫中散冷補煖下元陽氣復而寒自消矣切忌吐下方兼補血者寒泣血故也**感冒尋常和表裏**西北苦寒中傷者多東南溫和中傷者少尋常感冒表症見者九味羌活湯芫花香蘇散

寒入腸胃者霍亂轉筋河泄下利乾嘔吐逆藿香正氣散或五積散挾食停痰者人參養

胃湯夏秋暴寒折熱於裏者調中湯微下之凡帶漏遺精痰瘧疝瘕脚內傷補益加平溫內傷勞役感寒氣腰膝冷虛勞陰痿諸痛皆寒所為也挾風眩暈不仁挾濕四肢腫痛內傷補益加平溫困倦補中益氣湯如內傷房室感寒厥冷四逆湯脈脫三建湯煉臍法

暑

暑熱汗渴審實虛。暑病身熱自汗口渴渴面垢而已餘症皆後傳變或兼內傷必先問其人素虛胃弱經絡最難拘。靜居高堂大廈得病似熱症屬心脾經者名中暑陰症動作田野道路得病似傷風者名中暑。白口鼻牙頰達手心主胞絡以火從火故古法暑還取冷水灌漑勿嚥入肝則眩中。傷。輕重。中者歸心神昏卒倒傷暑肉分周身煩燥或如針刺或有赤腫蓋天氣浮於地表故人氣亦浮於表也冒暑入腸胃腹痛惡心嘔瀉伏暑即冒暑久而藏伏三焦腸胃之間熱傷氣而不傷形旬月莫覺變出寒熱不定霍亂吐瀉膨脹中滿瘧痢煩渴腹痛下血。暑風暑厥又何如。即暑暈症但以手足搖擗等症但暑病多無身痛間有痛者或為濕浴水濕相搏耳。暑風暑厥又何如。即暑暈症但以手足搖擗傷寒與暑病同黃連香茹散暑風乃勞役內動五臟之火與外火交熾則金衰木旺生風香茹散加羌活或六和湯合消風散素有痼疾因觸暑動發熱生風者六和湯合星香散若道途卒倒湯藥不便忍氣脫難治急扶陰涼處不可臥濕冷地搦道上熱土後騰上撥開作窠令入尿於其中待求生美或蒜嚼爛以苓散燈心同煎入硃砂末調服有汗加黃芪因酒引暑入腹尿血者去桂加黃連或神。痰火絞腸俱可吐。昏驚悸妄言用益元散量加硃砂新汲水調服二錢降胃火治煩熱利濕止渴之要藥。痰火絞腸俱可吐。暑毒痼疾火室塞胸中量體虛實吐之火鬱發之義也如痰喘氣急痞塞入藥不得者急煎六和湯調服二釐服。絞腸痧腹痛不可忍或連心痛展轉在地手足亦有冷者乃腸絞縮在腹須臾能死急用熱湯調鹽一兩灌入即安或再用陳艾陳樟木陳壁。祛暑和中。利濕消。兼以消導汗多者忌滲。○祛暑。土各等分水煎連進三四服刺血法見急救。祛暑和中。利濕消。兼以消導汗多者忌滲。○祛暑。香茹散黃連解毒湯清肺生脈散白虎湯加參朮寒熱不定小柴胡湯。寒鬱其暑須反治。伏陰在內之時。○和。中。大小調中湯。荖湯。杜杞葉散。胃荖湯。桂苓甘露飲。六和湯。寒鬱其暑須反治。伏陰在內之時。暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加參芽。

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook

砂仁或大順散或二氣丹冷水下丹丸皆治因暑傷冷
非溫散治暑之謂也誤服發黃發斑蓄血悶亂而死
涼之劑暑重尿赤者清暑益氣湯暑輕力倦者補中益氣湯
或為丸中賜暫加香茹扁豆陰虛者滋陰降火湯腎氣丸
至秋方凝其預防不獨羨香如時常禦暑體實者香茹散益元散虛者忌用蓋皮虛者不必因暑勞役
則化水而死預防不獨羨香如時常禦暑體實者香茹散益元散虛者忌用蓋皮虛者不必因暑勞役
去升柴加黃柏芍藥五味子麥門冬有痰加半夏末夏初頭痛腳軟食少體熱名注夏病宜補中益氣湯
也如氣衰精神不足煩渴懶食者生脉散誘行丸通用謝傳萬病無憂散

濕

痞滿

泄瀉

赤白濁

腰痛

黃疸

水腫

脚氣

疝痛

脚氣

水腫

脚氣

水腫

脚氣

水腫

脚氣

水腫

脚氣

水腫

脚氣

水腫

脚氣

水腫

脚氣

濕氣覺來分內外

風寒暑濕傷人便覺濕氣薰襲人多不覺有自外入者長夏鬱熱山澤蒸氣冒雨行濕
汗透沾衣多腰脚腫痛有自內得者生冷酒滯脾生濕鬱熱多腹肚腫脹西北人多

內濕東南

人多外濕內外又分上下中下宜利二便或升提初入身沉重多困倦或肢節痛或一身盡痛甚則濕
人多外濕內外又分上下中下宜利二便或升提初入身沉重多困倦或肢節痛或一身盡痛甚則濕

上黃喘咳

花苓首如蒙首位高氣清濕薰則如有着脾黃腫脹硬或臍下大便泄湯求附湯三白着腎脚腰
物以蒙之也單蒼朮膏妙着脾黃腫脹硬或臍下大便泄湯求附湯三白着腎脚腰

小便濃

濕下先受之故腰脚攣痛獨活寄治外微汗通經絡微汗防已黃芪湯或羌活勝濕湯無汗者五
生湯當歸拈痛湯腎着湯青娥丸治外微汗通經絡微汗防已黃芪湯或羌活勝濕湯無汗者五

丹治內滲

便利大為妙工滲劑五苓散黃加茵陳一倍身痛加羌活一倍濕盛脚脹者又當以車前木通
便利大為妙工滲劑五苓散黃加茵陳一倍身痛加羌活一倍濕盛脚脹者又當以車前木通

鬱肢脹

或遍身浮腫者皆自內而出四氣相兼兼感濕熱其除濕湯兼風合桂枝湯或古附湯兼暑合五苓散
或遍身浮腫者皆自內而出四氣相兼兼感濕熱其除濕湯兼風合桂枝湯或古附湯兼暑合五苓散

也量虛實

利之不敢利者退黃丸妙四氣相兼兼感濕熱其除濕湯兼風合桂枝湯或古附湯兼暑合五苓散
利之不敢利者退黃丸妙四氣相兼兼感濕熱其除濕湯兼風合桂枝湯或古附湯兼暑合五苓散

大抵百病兼風

則必惡風有汗眩暈兼寒則必惡寒無汗或攣痛兼暑則必面垢煩渴兼濕則必腫滿沉
則必惡風有汗眩暈兼寒則必惡寒無汗或攣痛兼暑則必面垢煩渴兼濕則必腫滿沉

倦四氣互相兼併

惟寒濕濕熱為病濕熱尤多以尿亦有渴為濕熱多黑瘦膏粱之人以便清不渴為寒
惟寒濕濕熱為病濕熱尤多以尿亦有渴為濕熱多黑瘦膏粱之人以便清不渴為寒

濕多肥白淡食

之人昔有專用五積清熱燥濕兼補中此治濕熱法也凡內傷勞役七情飲食不化鬱為痰
之人昔有專用五積清熱燥濕兼補中此治濕熱法也凡內傷勞役七情飲食不化鬱為痰

治寒濕

風通聖散治濕熱宜哉清熱燥濕兼補中此治濕熱法也凡內傷勞役七情飲食不化鬱為痰
風通聖散治濕熱宜哉清熱燥濕兼補中此治濕熱法也凡內傷勞役七情飲食不化鬱為痰

積甚則腹脹

浮腫實者下之虛者補脾利濕消導兼通用內外燥脾并升散燥脾板木丸大安丸單蒼朮
浮腫實者下之虛者補脾利濕消導兼通用內外燥脾并升散燥脾板木丸大安丸單蒼朮

以清熱

清燥湯是也濕勝筋痠熱勝筋縮者尤効濕熱燥脾并升散燥脾板木丸大安丸單蒼朮
清燥湯是也濕勝筋痠熱勝筋縮者尤効濕熱燥脾并升散燥脾板木丸大安丸單蒼朮

或平胃散

加桑白皮為主濕在上焦加羌活蒼朮微汗有熱加黃芩中焦濕加猪苓澤瀉滲利熱加黃連
加桑白皮為主濕在上焦加羌活蒼朮微汗有熱加黃芩中焦濕加猪苓澤瀉滲利熱加黃連

下焦濕

加升麻防風升提熱加防己黃柏龍胆草肥人多濕加蒼朮滑石瘦人多熱加芩芍沉困加參朮
加升麻防風升提熱加防己黃柏龍胆草肥人多濕加蒼朮滑石瘦人多熱加芩芍沉困加參朮

醫學入門

卷五 暑濕 三 上海埠葉山房校印

又四製蒼柏
丸三精丸
實者大便可攻
元氣實而濕熱甚者導
水丸或除濕丹舟車丸

燥消渴
燥結

燥有內外屬陽明
大便不利時值陽明燥令久晴不雨黃埃蔽空令人狂惑皮膚乾枯屑起內因七情火燥或
助火邪消
總來金被火相刑
六氣風熱火屬陽寒燥濕屬陰但燥雖屬秋陰而反同風熱火化益火成則
燥血液
為風癰或手足癱瘓偏枯或十指反而莫能搖舉或為雀目內障入心則昏冒僵仆語言蹇澀入肺則喘
滿不食或善饑而瘦或傷積變為水腫腹脹入肺則毛焦乾疥癩鬱咳嗽入腎則津液竭而煩渴及骨蒸
秘結總皆肺金所主
敏勁渴秘雖風熱表裏俱宜潤衛榮
表病皮膚皴揭四物湯去川芎合生脈散加
陽明與肺為表裏也
大秦羌湯○裏病消渴活血潤燥生津飲○燥結因肝木自旺或肺風入大腸者曰風燥搜風順氣丸因
臟腑積熱或久病鬱熱者曰熱燥四順清涼飲當歸龍薤丸因脾胃伏火便閉不食者曰血燥搜風順氣丸因
大黃桃仁或為丸服大便偏秘者導滯通幽湯小便偏秘者導氣除燥湯陰虛火燥者曰虛燥單黃柏丸
補陰丸腎氣丸勞役氣虛燥者補中益氣湯通用四物湯去芍為君天麥門冬為臣水萋為佐升麻紅花
甘草為使風加秦光或牛膝熱加黃芩血倍生地渴加天花粉五味子閉結加大黃郁李仁麻仁氣虛量
加參芪陰虛加柏大抵宜甘寒潤劑忌辛香動火及一切發汗之藥經曰燥者潤之養血之謂也蓋燥
則血澀而氣液為之凝滯潤則益旺而氣液為之流通由內神茂而後外色澤矣然積液固能生氣積氣
亦能生液當用氣虛者瓊玉膏津虛者單五味子膏血虛者地黃膏凡病遇天燥亦宜量加此等潤劑

火
小腸痛
小便不禁
夢遺
脫肛
小便不通

火因內外分虛實
外因邪鬱經絡積熱臟腑此為有餘之火內因飲食情慾氣盛似火此為有餘
常主病多
火病死人甚暴變化無常一動便傷元氣偏勝移害他經內經病機十九條而屬火者五劉河
問推廣五運為病屬肝者諸風之火屬脾胃者諸濕痰火屬心肺者諸熱實火屬腎者諸虛之

火散於各經浮遊之火入氣分無根之火入血
實火渴閉熱無間
實火內外皆熱口渴渴虛熱有間口無何
分消陰伏火故曰諸病尋痰火痰火生異症
實火渴閉熱無間
實火內外皆熱口渴渴虛熱有間口無何

虛火潮熱有
瀉實補虛升且降
實火因外感邪鬱在表者九味羌活湯半表裏小柴胡湯入裏大承氣湯
問口燥不渴
瀉實補虛升且降
實火因外感邪鬱在表者九味羌活湯半表裏小柴胡湯入裏大承氣湯

瀉實補虛升且降
實火因外感邪鬱在表者九味羌活湯半表裏小柴胡湯入裏大承氣湯
問口燥不渴
瀉實補虛升且降
實火因外感邪鬱在表者九味羌活湯半表裏小柴胡湯入裏大承氣湯

狂者黑奴丸○虛火氣虛火感因勞傷胃無力身熱宜保元湯補中益氣湯加芍藥黃柏或四君子湯
疹之如大病及吐瀉後身熱如焚命門脉脫為陽衰之病宜以辛熱溫養其火則熱自退附子理中湯
應散主之○血虛火動因傷色慾午後發熱宜四物湯滋陰降火湯加味逍遙散腎氣丸人中白散若
水受傷生地玄參煎膏主之相火旺甚氣從臍下起者正氣湯湯坎離丸如氣從湧泉穴起入腹者虛極
治四物湯加白馬膠骨降陰火以代芩連或人中黃亦好外用附子末津調塗足心亦有濕熱者
食鬱火因內傷生冷及飲食不化抑遏陽氣於脾土四肢熱如燠以升散之劑發之升陽散火湯
瀉陰火升陽湯○七情五志火起宜隨各經調之大起火起於肝則手掉目眩清肝湯加龍膽草
丸醉飽火起於胃則痞塞腫滿瀉黃散戊己丸單石羔丸悲火起於肺則氣逆膈滯白帶加黃芩
懸單黃芩丸單苦參丸房勞火起於腎則骨蒸潮熱大補陰丸滋腎丸單黃柏丸心火輕則頭暈目赤
瀉心湯重則自焚面青發躁脉絕暴死故曰五志之火動極不治○總論虛火可補實火可瀉惟其性
重者從其性而升之君火正治可以濕伏可以水滅可以直折相火反治不可以水濕折惟其性
之即如實火發狂宜三黃硝黃正治虛火發狂先與姜湯緩後補陰其火自降凡火盛不可猛用涼藥必
酒炒過或兼溫散甘緩又有君相火皆靜且和五行惟火有二心為君火一身之主腎為相火運行於
可發汗者風寒生冷鬱也
天賦不可無者若五志之火則由於人是以內傷火多外
感火少意火不妄動動由於心靜之一字其心中之水乎

內傷

調理脾胃

傷食
痞塊

積聚
蟲瘕

調理脾胃濕熱

脾性濕主乎血陰也胃火化主乎氣陽也太濕則氣滯大乾則血燥濕熱調停則能食
能化而氣血生旺苟或寒濕傷脾則停飲難化或不思食燥熱傷胃則停食不消或善

調理脾胃虛寒

脾性虛主乎血陰也胃火化主乎氣陽也太虛則氣弱大寒則血凝虛寒調停則能食
能化而氣血生旺苟或寒濕傷脾則停飲難化或不思食燥熱傷胃則停食不消或善

調理脾胃勞傷

脾性虛主乎血陰也胃火化主乎氣陽也太虛則氣弱大寒則血凝虛寒調停則能食
能化而氣血生旺苟或寒濕傷脾則停飲難化或不思食燥熱傷胃則停食不消或善

調理脾胃食傷

脾性虛主乎血陰也胃火化主乎氣陽也太虛則氣弱大寒則血凝虛寒調停則能食
能化而氣血生旺苟或寒濕傷脾則停飲難化或不思食燥熱傷胃則停食不消或善

調理脾胃熱病

脾性虛主乎血陰也胃火化主乎氣陽也太虛則氣弱大寒則血凝虛寒調停則能食
能化而氣血生旺苟或寒濕傷脾則停飲難化或不思食燥熱傷胃則停食不消或善

調理脾胃苦寒

脾性虛主乎血陰也胃火化主乎氣陽也太虛則氣弱大寒則血凝虛寒調停則能食
能化而氣血生旺苟或寒濕傷脾則停飲難化或不思食燥熱傷胃則停食不消或善

調理脾胃加山

脾性虛主乎血陰也胃火化主乎氣陽也太虛則氣弱大寒則血凝虛寒調停則能食
能化而氣血生旺苟或寒濕傷脾則停飲難化或不思食燥熱傷胃則停食不消或善

和丸○燥濕二陳湯六君子
湯理中湯生胃丹單蒼朮膏
瀉黃散清胃散調胃承氣湯
丸附子理中湯丸補真丸脉
緩濡無力或時隱伏正氣虛
而損也四君子湯參苓白朮
散脉沉細寒邪所乘益黃散
人參養胃湯

氣滯
氣刺痛

諸氣皆因火作孽
行榮衛生養臟腑惟七情火
炎傷肺閉塞清道以致上焦
不納中焦不運下焦不流

濁火盛薰蒸津液成痰痰鬱
成積初起宜四七湯七氣湯
辛溫消散稍久宜二陳湯加
芩連山梔或當歸

龍蒼丸木香檳榔丸辛涼以
折之最忌辛香助火耗氣之
劑雖木香亦好上升必佐以
知母黃柏丹溪云

上升之氣自肝而出中挾相
火間傷生冷與寒熱丁香肝
積食生冷嘔逆積痛者治中
湯加木香或蟠越

其熱為甚自覺其冷非真冷
也遇飢胃脫痛者四君子湯
加木香○挾寒則膝理密而
氣欽於中五積散人參四逆
湯挾風分心氣

風寒犯腦羌活附子湯挾寒
濕五苓散五苓能升降諸氣
通利三焦非特分利而已凡
此熱劑明知口傷

遇飢胃脫痛者四君子湯加
木香○挾寒則膝理密而氣
欽於中五積散人參四逆湯
挾風分心氣

遇飢胃脫痛者四君子湯加
木香○挾寒則膝理密而氣
欽於中五積散人參四逆湯
挾風分心氣

遇飢胃脫痛者四君子湯加
木香○挾寒則膝理密而氣
欽於中五積散人參四逆湯
挾風分心氣

遇飢胃脫痛者四君子湯加
木香○挾寒則膝理密而氣
欽於中五積散人參四逆湯
挾風分心氣

遇飢胃脫痛者四君子湯加
木香○挾寒則膝理密而氣
欽於中五積散人參四逆湯
挾風分心氣

遇飢胃脫痛者四君子湯加
木香○挾寒則膝理密而氣
欽於中五積散人參四逆湯
挾風分心氣



痺泄瀉心腹絞痛流氣飲子主之或木香芍藥
散施美飲古芫連丸施黃丸清膈蒼沙丸選用
秘傳降氣湯燥者麻子仁丸熱者小承氣湯如
氣閉胸滿百藥不効者五香連翹湯小便閉者
復元通氣散○痰壅則氣逆順氣導痰治分痰
湯蘇子降氣湯其者稀涎散微吐之
起五味之偏無日不積此丹溪河間力主為火
為火故以降火化痰消積分治量其所稟厚薄
合黃連解毒湯加知母枳殼疫多合二陳湯積
我戒寒加官桂吳芫便閉加木香檳榔男子血
虛及婦人胎產氣疾合四物湯

血

吐血 便血 陽氣藏毒 咳唾咯

諸血先須分各經逆則上行順下行
陽威陰虛錯經妄行火載則上升挾濕則下行
咳唾參入腸間從下諸而出為血病結於腸胃
血脾也略血氣腎也溺血小腸膀胱也下血大
血從舌出者謂之舌衄心與肝也從委中穴出
有潮夜反重日輕夜重者有潮者重潮感脈大
則滑氣寒則凝故涼血必先清氣知血出某經
當先去瘀而後調氣則其血立止或元氣本虛
涼反致停瘀胸

外感積瘀宜涼
火之鬱鼻衄者金沸草散去麻黃加桔梗枳
暑毒攻心嘔血者枇杷葉散去丁香香加黃連
熱吐膿者陽毒升麻湯○積熱因飲酒炙搏蓄
熱蘇丸四生丸大金丸槐角丸○瘀血因打撲
補大自平內傷七情暴喜動心不能主血暴怒
治宜開痰行氣二陳湯加酒紅花升麻歸身黃
連虛者加參朮及附子一片熱者加山梔牡丹

醫學
氣血
上海婦葉山房校印

皮苗草生地木香氣急者加瓜蒌仁桂梗勞心無汗者茯苓補心湯有汗者歸脾湯素鬱者清肝解鬱湯
氣壅者蘇子降氣湯如失血後被七情四物湯加木香檀榔陰虛者去木槓加玄參黃柏枳壳○內傷飲
食生冷滯胃清道氣濁血亂者理中湯加乾葛川芎○內傷勞役氣虛火盛者單人參湯或四君子湯加蒲黃人乳藕節傷
者四君子湯加乾葛川芎○內傷勞役氣虛火盛者單人參湯或四君子湯加蒲黃人乳藕節傷
吐血者猪肝煎白芨末食或花藥石散內傷氣散汗出汚衣甚如紅染者黃芪建中湯妙香散或男婦
燒灰倉之臘血十全大補湯○內傷思慮色慾血衰火燥者滋陰降火湯加味逍遙散散節齋四物湯
九
吐嗟男女血為疾人知百病生於氣而不知血為百病之胎也凡寒熱躁鬱痺痛癰疹痿痺好老好狂
涼血心加黃連小腸山梔仁木通肺加枯芩大腸實芩肝加條芩膽加黃連腎膀胱加黃柏脾加白芍胃加
加大黃三焦地骨皮心胞絡壯丹皮清氣心與胞絡加麥門冬肺加枳壳肝加青皮柴胡脾加白芍胃加
石羔乾葛大腸三焦加連翹小腸赤茯苓勝脫滑石琥珀瘀血加升麻引血歸經血止後加炒黑龍薑引血
加薄荷玄參以散之血不止者加蒲黃京墨茅根久不止者加升麻引血歸經血止後加炒黑龍薑引血
還元血虛加龜板血燥加人乳**保全脾胃可長生**血病每以胃藥收功胃氣一復其血自止他如嘔吐後發熱及傷
板血燥加人乳**保全脾胃可長生**血病每以胃藥收功胃氣一復其血自止他如嘔吐後發熱及傷

痰喘 嗜睡 惡心 嘔吐 顛狂 驚悸 怔忡 健忘
膈噎 關格 痰癰 呃逆 咽候

痰分新久內外邪 痰乃津血所成隨氣升降氣血調和則流行不聚內外感傷則壅逆為患新而輕者形
但痰症初起頭痛發熱類外感表症久則潮咳夜重者黃濁稠粘凝結咯之難出漸成惡味酸辣腥腫鹹苦
注肢節疼痛類風症但痰症胸滿食減肌色如故脈滑不勻不定為異耳

知痰病尤多生於脾多四肢倦怠或腹痛腫脹泄瀉名曰濕痰若因飲酒乾嘔噎膈腸痛又名酒痰升於肺多毛
留於胃脘多嘔吐吞酸嘈雜上衝頭面烘熱名曰火痰若因飲酒乾嘔噎膈腸痛又名酒痰升於肺多毛

焦面白如枯骨咽乾口燥咳嗽喘促名曰燥痰久為老痰鬱痰又七情痰滯咽膈多胸膈痞滿名曰氣痰
迷於心多怔忡顛狂夢寐奇怪名曰熱痰動於肝多眩暈頭風眼目瞶動昏淚耳輪接癢癢脇肋脹痛左癱

右癱麻木痿跛奇症名曰風痰聚於腎多足膝酸軟腰背強痛肢節冷痺骨痛名曰寒痰又名虛痰凡
身習習如蟲行或身中結核不紅不腫或頸項結核似瘰非瘰或走馬喉痺或胸腹間如有二氣交紐噎

塞煩悶或背脊中常有一點如冰冷痛或心下水冷時痛或四肢腫硬似痛非痛或骨節刺痛無常處或吐
冷涎綠水黑汁或大小便膿或關格不通以至癆瘵注再婦人經閉小兒驚搐皆須先去敗痰然後調理

他如關家胸骨撲傷刺痛不已散血之劑因功續以此**風青寒黑濕色白**風風痰外感賊邪或腎枯木動或內
自己小便飲之須臾吐痰其痛立止百病兼痰如此

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

龍虎丹風熱小省風湯搜風化痰丸回神丹竹瀝膏○寒痰因形寒飲冷色深青黑如灰善唾或喘輕者
五精散藿香正氣散重者溫中化痰丸古半硫丸○濕痰或外感濕滯或停飲不散色白喘急者千縷湯
心痛者單半夏丸或神市丸濕熱色黃者**熱黃其則帶紅紫**則帶血或紫清氣化痰丸煎服大金花丸
中和丸清膈蒼莎丸在裏者青礞石丸

痰火鬱稠粘氣如絮○痰因飲食不節過厚火蒸津液成痰稠濁二陳湯加芥連山梔或抑上丸潤下丸
火清金潤肺緩以治之節齋化痰丸謝傳清金丸單貝母九霞天膏○氣痰七情鬱成略之不**食痞酒**
出嚥之不下形如破絮或如梅核四七湯久者換蘇子加黃芩山梔海石三仙九千金指迷丸

脇痛加食痰因飲食不化結成痞塊橘半枳木丸痰壅喘急者水薑實丸山查麥芽煎湯下痞者黃白
丸傷水心中堅大如柱者名氣分枳木丸料煎服痰病便如柱時有水聲者神保丸也皆因飲

中湯香附水**痰飲有五因只一汗吐下溫用莫差**府從食脫吐出五飲六症留氣伏飲食為一也皆因飲
羹青黛丸

水及茶酒停蓄不散耳加外邪生冷七情相傳成痰即酒痰久而濕勝者與傷寒水症大同脈多弦滑或
伏眼下皮如反黑○痰飲水停腸胃腹響轉輒有聲令人暴肥暴瘦懸飲水流在脇咳唾則痛懸懸水

溢飲水流四肢身體重痛支飲水停膈上脘逆倚息短氣留飲水停心下背冷如手掌大或短氣而渴治
肢歷節疼痛脇痛引缺盆咳嗽轉甚伏飲水停膈滿嘔吐喘咳發熱惡寒腰痛背痛淚出或身惕顫仲景治

諸飲在皮裏膜外表分者大小青龍湯汗之在胸膈者瓜蒂散吐之在四肢經絡脇助者五苓散分利之
在腸胃裏分者十棗湯下之此皆治標之霸道也從經汗以參蘇飲吐以二陳湯加防風桔梗探之分利

五飲湯下劑開結枳朮丸中間以小半夏湯古葶藶散枳朮丸**常法順氣與分導**古法順氣為先分導
溫中化痰丸清氣化痰丸半夏溫肺湯隨虛實加減不必太泥

氣動者曰痰氣順氣導痰丸因火動者曰痰火清熱導痰湯因濕動者曰濕痰導痰湯王之通用二陳湯
能使大便潤而小便便長尤為分導要藥風加南星皂角白附子竹瀝寒倍半夏加姜附姜汁火加石羔青

黛濕加蒼朮白朮燥加灰薑杏仁老鬱痰加海石芒硝水薑食積加山查神麴麥芽停水加檳榔痰在脇
下加白芥子以行之痰在四肢加竹瀝痰在經絡用此探吐痰在皮裏膜外生白芥子竹瀝姜汁氣實用

荆墜下溫中潤肺家痰原於腎動於脾客於肺水升火降脾胃調和痰從何生○陽虛腎寒不能收攝邪
水冷痰溢上或昏暈夜喘上氣者八味丸三味安腎丸黑錫丹以鎮墜之如痰壅發

厥者蘇子降氣湯三生飲古疏永丹○脾虛不能運化者宜補中焦開塞清道者仍宜溫中燥脾二陳湯氣
失升降者補中益氣湯加半夏竹瀝姜汁○氣血虧乏痰客中焦閉塞清道者仍宜溫中燥脾二陳湯氣

虛合四君子湯血虛合四物湯○陰虛腎火炎上肺燥者二陳湯合四物湯去川芎半夏加貝母麥門冬
瓜蒌仁桔梗潤而降之或腎氣丸三一腎氣丸語云痰無補法且老痰凝滯膠固非暫用溫藥引導必有

痰

上海掃葉山房校印

與氣類參看寒鬱如心脾腹痛火鬱如脇痛
跌撲癰疽瘡瘍濕鬱如腰脚疝痛分見各類

則血不行血鬱則食不消而成癥

所有

順氣為先降火化痰消積分多少治與諸氣久則升散三焦通鬱本病久及解石服藥
六鬱與痰火有則急治於此無則依雜症治雜亂而成又有鬱久而

生者俱宜升提如鬱在中焦以蒼朮川芎開提其氣以升之如食在胃上提其氣則食而升矣升提之藥邪在下二便下利者二陳湯加升麻柴胡川芎防風以升發之熱鬱升陽散火湯火鬱火鬱湯主之當看

又五鬱治法見第七卷
氣痰滿胸血能食
湯料參之此雜病治法總要也
氣鬱胸滿脇痛脉沉滑如木香

二陳湯為主食鬱噎酸惡食黃疸鼓脹痞塊氣口緊盛加山查神麴麥芽傷冷食胃脘痛加草豆乾薑濕

鬱週身關節走疔首如物蒙足重亦然遇陰寒便發脉沉濡加白朮倍蒼朮熱鬱目蒙口乾舌燥小便不利濁脉沉數加黃連倍山梔連翹六鬱不言風寒者風寒鬱則脫營遇者眠食廢先順後逆雖不中邪病從

為熱故也。但諸擬拔風加防風。苦參。拔寒加吳茱萸。附片。鱉甲。一。四。生。合。人。節。作。料。木。肌。瘦。名。曰。脫。營。內。服。交。感。丹。外。用。香。鹽。散。臨。臥。擦。牙。有。鬱。結。在。脾。半。年。不。食。或。午。後。發。熱。西。戌。時。退。或。煩。渴。如。區。或。因。風。向。裏。坐。亦。喜。向。暗。處。婦。人。經。水。極。少。男。子。小。便。點。滴。皆。憂。思。氣。結。治。宜。溫。膽。湯。

或二陳湯加參朮紅花炭火甚者以有志養陰神自充
痰藥吐之下之後用越鞠丸調理利平人上納下化水穀滋沛身中陰氣自生如失名

上焦不行下脘不通而腎熱薰胸中則內熱宜養陰降火三白湯加陳皮蒼朮川芎山梔香附枳壳甘草煎熟入姜汁少許熱服以散其鬱加當歸黃柏沙參或玄參以養其陰痰加其心夏加麥門冬冬加補

骨脂盡當歸隨參補血白芍隨二朮除穀因食冷物鬱遏陽氣於腹土中多因血虛而得之故用炒黑山梔解五臟結蓋少陰血若不早治復忽酒色癆瘵之由也

積熱

積熱三焦。審實虛。口乾煩渴。大便窒。

實熱因口服金石炙燂夜臥熱炕或火烘衣被久則蘊積熱毒在上焦則咽乾口渴而具舌糜唇瘡在中焦則胸滿乾嘔作渴在臟腑則

大小便閉法當清心解毒上熱涼膈散中熱調胃承氣湯下熱八正散三焦俱熱三黃湯大金花丸○虛熱因消燦腎水相火炎上口渴煩燥精神短少心悸自汗懶於動作夜臥睡語法當降火滋水三補丸主之或只清之

實分氣血清各經 氣分實熱白虎湯或敗毒散加荊芥青皮白朮血分實熱四順清涼飲潤之而已

黃散肺熱瀉白散腎熱滋腎丸小腸熱導赤散胃熱瀉胃湯大腸熱瀉白湯膀胱熱加味石莖湯然諸熱皆屬於心熱甚則能傷陰宜硃砂安神丸以清鎮之

蓮子飲甚者龍腦雞蘇丸久者宜升陽以散之小柴胡湯合四君子湯升陽益胃湯補中益氣湯或中益氣何以治熱孰不知熱因熱用溫能除熱之理蓋大熱在上大寒必伏於內溫能退寒以助地氣也

氣者在人乃胃之生氣使真氣旺而邪熱自退○血分虛熱四物湯加荊芥連山梔或為丸服及則滋陰以降之秦光扶羸湯或古歸芪湯滋陰降火湯蒸熱者加味逍遙散散坎離丸○氣血俱虛熱升陽滋陰兼用

十全大補湯人參養榮湯俱加知母黃柏然虛風疫濕熱常相兼變症多端難執一治風熱或氣虛生風熱久必脾胃不和三白湯參苓白朮散調之

者治其熱而風自消凡頭目腫痛眩暈眼目昏赤耳聾鼻塞口燥舌乾牙宣牙腫斑疹之類皆風熱或當之所為也初起上攻者川芎茶調散至寶丹四神丹上清丸久而下注血衰者腎氣丸加知母黃柏或當

歸龍蒼丸四生散心疫熱者因疫生熱或因熱生疫凡因痛喉閉膈噎胸痞顛狂驚悸怔忡健忘之類皆疫火滯中之所為也地調中湯大調中湯○濕熱者因濕生熱或因熱生濕凡見瀉下痢水腫鼓脹黃疸

遺精白濁痺痛腰痛脚氣之類泄濕熱下流之所為也治見各條丹溪治濕熱上焦黃芩虛者天麥門冬代之中焦黃連虛者白朮茯苓葛根代之下焦草龍胆防已黃柏虛者肥人蒼朮南星滑石瘦人牛膝檳榔

柳桃仁紅花經曰治病必求其本此風熱疫熱濕熱乃百病之根本也

諸虛 惡寒 瘧瘵 求嗣 盜汗 養老 痿 癆瘵 求嗣 盜汗 養老 痿

諸虛專要辨陰陽 血陰而氣陽也有暴虛而無傷損者易復有虛而虧損者亦可補益惟久虛而傷壞者弦而微為血虛脈濇而微為血虛甚或寸微尺大而緊者陰虛

有火多汗又形肥而面浮白者陽虛形瘦而面蒼黑者陰虛**食少神昏精不藏腰背胸脇筋骨痛潮汗**

痰嗽是其常 此虛症也但外因新損容易復於外因感寒久則損陽自上而下一損於肺則皮聚毛落二損於心則血脈虛少不榮臟腑婦人月水不通三損於胃則飲食不為肌膚治宜辛甘若淡過於胃則不可治矣感熱久則損陰自下而上一損於腎則骨痿不能起於

壯者死二損於肝則筋緩不能自收持三損於脾則飲食不能消冠治宜酸苦若鹹過於脾則不可治矣

醫學 卷五 諸虛 七 上海埭葉山房校印

又不內外區焉而奪精汗出於心則損脈走恐懼汗出於肝則損筋搖體勞苦汗出於脾則損肉飲食
飽甚汗出於胃則損腸持重遠行汗出於腎則損骨治宜酸苦若辛散於心則不可治矣抑論心脾
色應汗多者為陽虛肝腎損而形痿汗多者為陰虛經云損其肺者益其氣損其心者補其榮血損其脾
者調其飲食通其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精是以古方肺損症見四君子湯心損症見
湯加龍骨牡蠣四股煩熱酸疼心忤腹痛者小建中湯汗多力少筋骨拘急者黃芪建中湯汗多脈暴
者炙甘草湯湯暴損氣虛有汗潮熱者茯苓補心湯暴脫血者益胃升陽湯潮汗痰嗽者黃芪益損湯加半夏
人參養榮湯血虛無汗潮熱者茯苓補心湯暴脫血者益胃升陽湯潮汗痰嗽者黃芪益損湯加半夏
病後食減盜汗者參苓
白朮散加黃芪當歸

勞慾久虛成內傷

內因五勞六極七傷積虛成損損成傷經年不愈者謂之久
虛而面無血色驚悸夢遺盜汗極則心痛咽腫汗勞盡力謀慮則筋骨拘攣極則頭目昏眩脾勞則毛焦
則脹滿少食極則吐瀉肉削四肢倦怠關節肩背強痛肺勞預事而憂則氣乏心腹冷胸背痛極則毛焦
津枯咳嗽開熱腎勞持志節則腰骨痛遺精白濁極則面垢脊痛此五勞應乎五極者也若原因陽虛
以致臟虛臟腑俱虛視聽已衰行步不正名曰精極令人精濁莖弱核小故又曰六極極即傷也七傷者
推原勞極之由久視傷血久臥傷氣久坐傷肉久立傷骨久行傷筋房勞思慮傷心腎則陰虛血虛勞殺
飽傷胃脾則陽氣虛此傷症之至要也○陰虛四物湯二宜丸腎氣丸火動外潮者四物湯加知母黃柏
或滋陰降火湯丸加味逍遙散補陰丸火燥甚者大補陰丸單天門冬膏○陽虛四君子湯保元湯火衰
中寒身冷者鹿茸大補湯從蓉散加減內固丸三仙丹溫腎丸臍胸補天丸班龍丸○陰陽俱虛八物湯
固真飲子或丸人參養榮湯或十全大補湯加從蓉附子半夏門冬或八味丸有火者二至丸異類有
情丸○心虛人參固本丸夢授天王補心丹朱子讀書丸肝虛天麻丸鹿茸四斤丸脾虛參苓白朮散橘
皮煎丸蒼朮膏白朮膏參苓造化糕太和養肺虛單人參膏單調和心腎養脾胃不論陰陽損傷皆因水
五味子膏腎虛小兒絲子丸五兔固本丸三味安腎丸太極丸

調和心腎養脾胃
暢水升則精神充滿或心腎俱虛或心脾俱虛或肝俱虛或肺腎俱虛或五臟俱虛但有寒者究源心腎為
主兼補脾胃則飲食進而精神氣血自生○調和心腎虛中有熱者古蒼心腎丸虛中有寒者究源心腎
丸不受峻補者歸茸丸瑞蓮丸冷補丸兼補
脾胃二神交濟丹還少丹天真丸返本丸

挾熱與氣細酌量

虛者下虛也熱者上熱也又言虛實者正
氣虛和氣實也心勞邪熱則口舌生瘡者正

赤芍脾熱加山施石斛升麻肺熱加知母桑白皮秦艽葶藶腎熱加玄參赤茯苓前子生地更參積熱門
虛炎治法○挾氣者交感丹古蒼云心腎主血心惡熱而腎惡燥則清熱潤燥之藥是補心腎而瀉肺脾
邪熱則尿赤陰瘡耳鳴溺閉三白湯主之心熱加黃連木通麥門冬生地肝熱加黃芪防風當歸龍膽草
溢肌瘦肝勞和熱則脇痛關格不通脾勞和熱則氣急肌痺多汗肺勞和熱則氣喘面腫口燥咽乾腎勞
脾胃二神交濟丹還少丹天真丸返本丸

也肺脾主氣肺惡寒而脾惡濕則溫寒燥濕之藥是補肺脾而瀉心腎也局方藥用平香燥劑以能健脾
進食然陰血消而心腎損以致虛極火炎面紅發喘痰多身熱如火鐵腫瀉泄脈緊不食者死噫凡虛皆
陰血陰氣虛也若
真陽虛亦不可治從來養性延年藥只是中和功更長溫藥峻補之謂也精不足者溫之以氣溫存以養使氣自充非
然之味非膏粱之謂也今人無病貪補而致病者有之有病貪補而不依症用藥反增痰火者有之非惟
不足卻病延年亦非養心養性之道且少年慾火正熾尤宜戒補中年以後必資藥餌扶持者亦有量
寧從緩治不可責効目前反致奇疾大槩腎虛者瓊玉膏還元秋石丸延年益壽不老丹耳其甚者還元
丹四聖不老丹松柏實丸腎虛無火者何首烏丸卻老烏雞健陽丹腎虛有火者八仙添壽丹藏瘦者大
造丸紫河車丹血疾者女貞丹柏葉煎柏脂丸秤金丹風疾胃火者松脂丸松梅丸風疾無火者山人飯
療火溺滋者茯苓煎氣弱者單人參膏血燥者單天門冬膏地黃膏脾虛者白朮膏脾腎俱虛者如味膏
市膏此皆養性延年
之藥亦必因病選用

沉寒痼冷

沉痾大補

人身真陽耗散脾胃虛弱加以食淡生冷嗜慾過度以致臟腑停寒不祇謂之沉寒
積冷不解謂之痾冷宜十全大補湯鹿茸大補湯加美桂雄附以滋氣血補腎下元

若原只因生冷傷脾者四桂散附子理中湯補真丸專補脾胃可也又有陰虛內熱因傷冷藥及將
息失宜變成寒中全以養脾為主只宜理中湯二神交濟丹去白芍或四物湯去芍藥合理中湯

男精

女帶吐瀉奇

或暴下或久瀉或吐瀉俱發宜古半附湯附子理中湯沉香導滯寒肢冷心腹痛腦髓寒者
登胎丸遺精金鎖正元丹究源心腎丸疏苓丸崩帶見婦人門

四肢冷者古姜附湯古桂附湯氣虛冷汗出者古參附湯古芪附湯

通身冷昏暈者三建湯順元背心腹絞痛甚者椒附丸復陽丹挾外感者正氣補虛湯剛劑慢投恐腎

衰金液丹黑錫丹養氣丹返陰丹盡皆金石慢劑陰臟性緩漸服

三建湯治心經之元陽虛者責其無火也大補陰丸治腎經之真陰虛者責其無水也蓋人之所藉以生
者陰陽之氣耳不善調攝偏熱偏寒病未至甚治之不難若夫精熱始而涼和次而寒取寒取不愈則因

熱而從之從之不愈則技窮矣由是辛熱比年而弗止殊不知以寒治熱而熱不衰者由於真水之不足也以熱

之從之不愈則技窮矣由是辛熱比年而弗止殊不知以寒治熱而熱不衰者由於真水之不足也以熱
治寒而寒不衰者由於真火之不足也所以益腎水之不足而制心火之有餘也取之陽所以益心火之不

而有者去無者復至矣故取之陰所以益腎水之不足而制心火之有餘也取之陽所以益心火之不

而有者去無者復至矣故取之陰所以益腎水之不足而制心火之有餘也取之陽所以益心火之不

而有者去無者復至矣故取之陰所以益腎水之不足而制心火之有餘也取之陽所以益心火之不

而有者去無者復至矣故取之陰所以益腎水之不足而制心火之有餘也取之陽所以益心火之不

而有者去無者復至矣故取之陰所以益腎水之不足而制心火之有餘也取之陽所以益心火之不

是以勝腎水之有餘也。火之原者陽氣之根。水之主者陰氣之根。非謂火為心而涼為肺水為腎而主為肺也。此太僕達至理之妙也。又積熱用苦寒藥必姜汁酒製沉寒用熱藥如附子必用童便蜜製蓋寒因熱用熱因寒用恐相達逆故也。

右雜病提綱 雜病者或兼外感風寒暑濕燥火之氣。或挾內傷宿食氣血痰鬱虛實之情。外感者為四中。內傷久則為沉痾。所以提之於前。以見其為百病大綱。其餘症皆由此變出。醫能知此門戶。定能知從頭至足問症之法。第一辨其為內傷耶。為外感耶。外感手皆熱而口能知味。內傷手心熱而口不知味。外感傷風惡風。面光有汗。傷寒惡寒。面慘無汗。傷暑惡熱。煩渴面垢。傷濕惡濕。重者面黃。內傷勞役傷氣。則惡勞而心口不痛。飲食傷脾。則惡食而心胃刺痛。若夫色慾傷腎。則愈好色而骨蒸口多嗜味。陰虛火動。故也。七情思慮傷心與脾。則益善思而恍惚不寐。憂怒傷肺與肝。則愈動怒而痞滿眩嘔。口仍失味。諸氣拂鬱。故也。一切血症。日輕夜重。一切痰症。食少肌色如故。一切火症。性急潮熱。一切水症。脇硬心下怔忡。至於辨症虛實。俱以似傷寒陽症者為熱。且積也。似傷寒陰症者為虛。且寒也。又辨其內外有無相兼多寡。或內不外。而為本經自病。男子必審房勞。女人先問經孕。與所處順逆。及曾服某藥。然後証之以脉。萬無一失。噫。機括熟而門類顯者。惟不脉而藥。可以廣及。然亦難乎其人之妙悟也。病家一時緊急。尋醫辨正。且將此提綱理會。亦不致差門戶。以後分類有言。外因風寒暑濕。內因七情痰血。瘦火食積。而不詳言其症者。正以括之於此也。以意會之。醫門斯可入矣。

雜病分類