

周氏醫學鼓書



舉痛論篇第三十九

憑空說起

黃帝問曰余聞善言天者必有驗於人。善言地者必

有合於今。善言人者必有厭於已。如此則道不惑而

要數極。所謂明也。今余問於夫子。令言而可知。視而

篇大意

可見。捫而可得。令驗於已。而發蒙解惑。可得而聞乎。

一句喝醒

分承

岐伯再拜稽首對曰何道之問也。帝曰願聞人之五

先總發痛原是○在本節總

藏卒痛何氣使然。岐伯對曰經脈流行不止。環周不

提

休。寒氣入經而稽遲泣而不行。客於脈外則血少。客

本節分提

於脈中則氣不通。故卒然而痛。帝曰其痛或卒然而

止者。或痛甚不休者。或痛甚不可按者。或按之而痛

內經平文

止者。或按之無益者。或喘動應手者。或心與背相引而痛者。或脅肋與少腹相引而痛者。或腹痛引陰股者。或痛宿昔而成積者。或卒然痛死不知人。少閒復生者。或痛而嘔者。或腹痛而後泄者。或痛而閉不通者。凡此諸痛。各不同形。別之奈何。岐伯曰。寒氣客於脈外。則脈寒。脈寒則縮蹇。縮蹇則脈絀急。絀急則外引小絡。故卒然而痛。得炅則痛立止。因重中於寒。則痛久矣。寒氣客於經脈之中。與炅氣相薄。則脈滿。滿則痛而不可按也。寒氣稽留。炅氣從上。則脈充大。而血氣亂。故痛甚不可按也。寒氣客於腸胃之間。膜原

之○下○血○不○得○散○小○絡○急○引○故○痛○按○之○則○血○氣○散○故○按○
之○痛○止○寒○氣○客○於○俠○脊○之○脈○則○深○按○之○不○能○及○故○按○
之○無○益○也○寒○氣○客○於○衝○脈○衝○脈○起○於○關○元○隨○腹○直○上○
寒○氣○客○則○脈○不○通○脈○不○通○則○氣○因○之○故○喘○動○應○手○矣○
寒○氣○客○於○背○俞○之○脈○則○血○脈○澀○脈○澀○則○血○虛○血○虛○則○
○純○虛○則○不○知○痛○矣

痛○其○俞○注○於○心○故○相○引○而○痛○按○之○則○熱○氣○至○熱○氣○至○
則○痛○止○矣○寒○氣○客○於○厥○陰○之○脈○厥○陰○之○脈○者○絡○陰○器○
繫○於○肝○寒○氣○客○於○脈○中○則○血○澀○脈○急○故○脅○肋○與○少○腹○
相○引○痛○矣○厥○氣○客○於○陰○股○寒○氣○上○及○少○腹○血○澀○在○下○
相○引○故○腹○痛○引○陰○股○寒○氣○客○於○小○腸○膜○原○之○間○絡○血○
○腹○中○○癥○塊○莫○非○小○

之中血澀不得注於大經血氣稽留不得行故宿昔

而成積矣寒氣客於五藏厥逆上泄陰氣竭陽氣未

入故卒然痛死不知人氣復反則生矣寒氣客於腸

胃厥逆上出故痛而嘔也寒氣客於小腸小腸不得

泄○閉○皆○小○腸○中○事○

成聚故後泄腹痛矣熱氣留於小腸腸中痛痺熱焦

燥結乃至於痛

渴則堅乾不得出故痛而閉不通矣帝曰善此言而

可知者也視而可見柰何岐伯曰五藏六府固盡有

部視其五色黃赤為熱白為寒青黑為痛此所謂視

而可見者也帝曰捫而可得柰何岐伯曰視其主病

之脈堅而血及陷下者皆可捫而得也帝曰善余知

以、提、

跟、定、氣、字○

百病生於氣也

謂不獨諸痛卽百病皆生於氣

怒則

○敘○外○此○此○敘○內○因○

氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收

○先○分○提○後○分○敘○格○調○與○牽○崩○節○

氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結九氣不同何病

○同○氣○之○治○亂○權○在○於○心○

之生岐伯曰怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣上矣

○逐○段○結○句○調○與○前○同○更○見○

喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則心系急肺

○前○後○文○體○相○稱○此○雖○淺○事○而○實○駁○繁○之○捷○法○也○

布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣消矣

恐則精卻卻則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣

不行矣寒則腠理閉氣不行故氣收矣吳則腠理開

榮衛通汗大泄故氣泄驚則心無所倚神無所歸慮

無所定故氣亂矣勞則喘息汗出外內皆越故氣耗

矣。思則心有所存。神有所歸。正氣留而不行。故氣結矣。

氣字是痛字鐵板注脚。色脈二層只是帶說後路。更從氣字推廣言之。以百病皆生於氣也。一句作關捩筆力千鈞。通篇鑄詞一律似少變化而讀去倍覺浩然沛然大氣盤旋真力彌滿。惟此等文足以當之。

腹中論篇第四十

黃帝問曰。有病心腹滿。旦食則不能暮食。此爲何病。
岐伯對曰。名爲鼓脹。帝曰。治之柰何。岐伯曰。治之以
雞矢醴。一劑知。二劑已。帝曰。其時有復發者。何也。岐
伯曰。此飲食不節。故時有病也。病字疑當作發字雖然其病
且已。時故當病氣聚於腹也。帝曰。有病胸脅支滿者。
妨於食。病至則先聞腥臊臭。出清液。先唾血。四支清。
目眩。時時前後血。病名爲何。何以得之。岐伯曰。病名
血枯。此得之年少時。有所大脫血。若醉入房中。氣竭
肝傷。故月事衰少不來也。帝曰。治之柰何。復以何術。

謂何以治其病病愈岐伯曰以四烏鯁骨一蘆茹二

又何術以復元也

物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸爲後飯飲以

鮑魚汁利腸中

林億云別本一作傷中

及傷肝也帝曰病有少

腹盛上下左右皆有根此爲何病可治不岐伯曰病

名曰伏梁帝曰伏梁何因而得之岐伯曰裹大膿血

居腸胃之外不可治治之每切按之致死帝曰何以

然岐伯曰此下則因陰必下膿血上則迫胃脘生鬲

挾胃脘內癰

王冰云生當作出林億云太素挾作便

此久病也難治居

臍上爲逆居臍下爲從勿動亟奪論在刺法中帝曰

人有身體髀股肱皆腫環臍而痛是爲何病岐伯曰

病名伏梁。此風根也。其氣溢於大腸而著於盲盲之
原在臍下。故環臍而痛也。不可動之。動之爲水溺瀉
之病。帝曰。夫子數言熱中消中。不可服高粱芳草石
藥。石藥發癰。芳草發狂。夫熱中消中者。皆富貴人也。
今禁高粱。是不合其心。禁芳草石藥。是病不愈。然則愈此
病者本須用芳草石藥。即當用而不可用。故對病之藥。仍須選擇。不得以對病而遂不察其體性也。岐
伯曰。夫芳草之氣美。石藥之氣悍。二者其氣急疾堅
勁。故非緩心和人。不可以服此二者。帝曰。不可以服
此二者。何以然。岐伯曰。夫熱氣慄悍。藥氣亦然。二者
相遇。恐內傷脾。脾者土也。而惡木。服此藥者。至甲乙

日更論。帝曰：善。有病膺腫、頸痛、胸滿、腹脹，此爲何病？
何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之柰何？岐伯曰：灸之則瘖，石之則狂，須其氣并，乃可治也。帝曰：何以然？
岐伯曰：陽氣重，上有餘於上，灸之則陽氣入陰，入則瘖；石之則陽氣虛，虛則狂，須其氣并而治之，可使全也。帝曰：善。何以知懷子之且生也？岐伯曰：身有病而無邪脈也。帝曰：病熱而有所痛者，何也？岐伯曰：病熱者，陽脈也。以三陽之動也，人迎一盛、少陽二盛、太陽三盛，陽明入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃臍脹而頭痛也。帝曰：善。

逐條分敘不相照顧而敘病源敘治法各具條理
筆力古厚簡峭自有餘味。此與奇病論逆調論
病能論皆彙論證治之文也講醫學者必宜研究

刺腰痛篇第四十一

、分、經、論、治、

逐○段○皆○用○摹○繪○之○筆○是

足太陽脈令人腰痛引項脊尻背如重狀刺其郄中

女字見○聲色○處

太陽正經出血春無見血少陽令人腰痛如以鍼刺

其皮中循循然不可以俛仰不可以顧刺少陽成骨

之端出血成骨在膝外廉之骨獨起者夏無見血陽

明令人腰痛不可以顧顧如有見者善悲刺陽明於

胕前三痛上下和之出血秋無見血足少陰令人腰

痛痛引脊內廉刺少陰於內踝上二痛春無見血出

血太多不可復也厥陰之脈令人腰痛腰中如張弓

弩弦刺厥陰之脈在臑踵魚腹之外循之累累然乃

刺之其病令人善言默默然不慧刺之三瘡解脈令
人腰痛痛而引肩目眈眈然時遺洩刺解脈在膝筋
肉分閒郄外廉之橫脈出血血變而止解脈令人腰
痛如引帶常如折腰狀善恐刺解脈在郄中結絡如
黍米刺之血射以黑見赤血而已同陰之脈令人腰
痛痛如小錘居其中怫然腫刺同陰之脈在外踝上
絕骨之端爲三瘡陽維之脈令人腰痛痛上怫然腫
刺陽維之脈脈與太陽合腠下閒去地一尺所衡絡
之脈令人腰痛不可以俛仰仰則恐仆得之舉重傷
腰衡絡絕惡血歸之刺之在郄陽筋之閒上郄數寸

衡居爲二疔。出血。會陰之脈。令人腰痛。痛上漑漑然。汗出。汗乾。令人欲飲。飲已。欲走。刺直陽之脈。上三疔。在蹻上。郄下五寸。橫居。視其盛者。出血。飛陽之脈。令人腰痛。痛上怫怫然。甚則悲。以恐刺。飛陽之脈。在內踝上五寸。少陰之前。與陰維之會。昌陽之脈。令人腰痛。痛引膺。目眈眈然。甚則反折。舌卷。不能言。刺內筋。爲二疔。在內踝上。大筋前。太陰後。上踝二寸。所散。脈令人腰痛。而熱。熱甚。生煩。腰下如有橫木。居其中。甚則遺洩。刺散脈。在膝前。骨肉分間。絡外廉。束脈。爲三疔。肉里之脈。令人腰痛。不可以欬。欬則筋縮。急刺肉。

里之脈爲二痛在太陽之外少陽絕骨之後

以上分經論治

凡十五條每條用傳神法寫之敘證便不直率不蕭索矣

腰痛俠脊而痛至頭几

几然目眈眈欲僵仆刺足太陽郄中出血腰痛上寒

刺足太陽陽明上熱刺足厥陰不可以俛仰刺足少

陽中熱而喘刺足少陰刺郄中出血腰痛上寒不可

顧刺足陽明上熱刺足太陰中熱而喘刺足少陰大

便難刺足少陰少腹滿刺足厥陰如折不可以俛仰

不可舉刺足太陽引脊內廉刺足少陰腰痛引少腹

控眇不可以仰刺腰尻交者兩髀脾上以月生死爲

痛數發鍼立已左取右右取左

以上十三項據證論治措詞簡捷與前十