

不知需  
必  
需



不知醫必要卷二

廣鬱 梁廉夫 子材著

男

慶祥

紫波

吉祥

嵩生

瑞祥

善卿

# 血症

凡人身之血半隨衝任而行於經絡半行於脈外而充肌腠皮毛若外有所感內有所傷則血不循經從上而湧則爲吐血咳嗽咯血鼻血齒血舌血從下而走則爲大小便血婦人血崩須審其或由血熱妄行或由血寒滯滯或由飲酒過多而咯吐或



南京中医药大学图书馆所有

由怒氣傷肝而嘔血或由憂思過度而損傷心脾或由色慾勞  
傷而隔陽失血各症分明又要問其平日是陽臟陰臟現在  
涼愛熱病係新久人或靜躁小便是清是赤大便或結或稀逐  
一審明然後無誤○又云失血之症無論上下皆是經絡散行  
之血若仍循其經常之道路自愈○除瘀血與傷寒外其餘根  
屬七情饑飽勞力等因可以一味固元湯主之補藥當用溫藥  
亦須急加桂附炮薑隨宜○或血虛煩渴躁熱睡臥不安須服  
聖愈湯剛燥之劑不可用○血氣喜溫而惡寒寒則泣而不流  
倘服寒藥已愈卽宜接服溫補切不可再服涼劑以致不救

○吐血列方

黑神散和

治吐血衄血及口鼻俱出若聲未失無不可救

百草霜

卽鍋底煙要鄉間燒草者燒柴者不可用

研細末每服一錢米飲調下若衄血者兼以少許吹入鼻

○凡血不諭上下用百草霜或煅透黑薑炭或燒蓮蓬殼

存性研細末服均可止之

參地煎

涼補

治吐血

生地六錢

黨參

去蘆

百草霜

二錢研末

水煎○又方藕節七個荷葉頂七個擂爛入蜜一匙煎服



中醫學大辭典

天津大學圖書館版權所有

亦治卒暴吐血

二神散涼

治一切男婦吐血或血崩下血屬熱者

陳槐花炒焦一兩

百草霜四錢

其研末每服三錢白茅根煎湯調下○舌上忽然出血亦用此散摻之

犀角地黃湯大寒治胃火血熱妄行吐衄或大便下血○出斑

出疹皆宜

生地四錢

麥冬去心

白芍

犀角尖朱煎

丹皮各一錢五分

水煎○又方生石糕二錢生地四錢治



南京中医药大学图书馆版权所有

胃火熱甚煩熱作渴頭痛氣壅而吐血

生地元參湯

涼 治色慾過度之人腎火燦金而吐血

生地四錢

麥冬去心

白芍酒炒

丹皮

丹參各一錢

鬱金七分

元參一錢

三七五分

加磨濃墨併童便各半酒杯沖服

加味葛花解醒湯

涼 治飲酒過多而吐血

黨參去蘆

白朮淨

茯苓

砂仁

枳

白蔻淨仁杵葛花各一錢

青皮

陳皮

猪苓

澤瀉

鹽水炒

各七分

神曲



黃連 四分

丹皮 七分

加味四物湯

散血兼補

治血瘀而吐○未吐之前胸必痛及吐血

必紫或黑而成塊

當歸

川芎

丹皮

香附

杵

白芍

酒炒

蘇木

各一錢

生地

酒炒四錢

紅花

一錢

水煎○如紫血盡而見鮮血卽服六君子湯加當歸泡薑  
以溫補之○又菲菜搗取自然汁飲亦善行瘀血

芎歸飲散血兼補治飽食用力或因持重努傷脈絡失血湧吐者○

跌撲打傷令人大吐者亦宜之

川芎二錢

當歸三錢

紅花一錢

桃仁十二粒

杵

獨參湯補

治大吐大衄大崩之後血若稍止卽服此方

聽其

熟睡切勿驚醒則陰血一夜復生

高麗參

一兩五錢

固元湯補 治吐血止後宜服

黃蓍炙

黨參去蘆米炒

白芍

酒炒

歸身各一錢  
五分

炙草一錢

煨薑二片

巽愈湯補

治一切失血症或血虛煩渴燥熱睡臥不甯不宜

剛燥之劑者

炙耆一錢

黨參

去蘆米熟地三錢

川芎

白芍酒炒

當歸各一錢  
五分

水煎○如微有火者去熟地加生地二錢

甘草炮薑湯

熱

治大吐大衄外有寒冷之狀者

炮薑

一錢  
五分

炙草

二錢

北味一錢

水煎○或服附子理中湯加木香亦宜

鎮陰煎

補大熱

治陰虛於下隔陽於上則真陽失守血隨而溢以

致大吐大衄手足厥冷危在頃刻者速宜服之

熟地一兩

牛膝

鹽水炒

澤瀉

鹽水炒各

附子

製

一錢  
五分

一錢



南京中医药大学图书馆版权所有

肉桂去皮另微炙一錢  
八分  
炙草一錢五分

水煎○如兼惡寒者加炒乾薑一錢氣脫倦言軟弱之極者速加炒高麗參隨宜

附子理中湯補大熱

治吐血色黯而非鮮紅或如猪肚色或如紅

米粥水色者○此離位之血非由火逼其人氣息輕微身體不熱乃係脾胃不能攝血虛寒大症若服寒藥必死

黨參去蘆米炒

附子製各二錢

白朮淨炒三錢

炮薑一錢五分

炙草一錢

○○噉血咯血列方

加味地黃湯 涼補 治嗽而有血痰易出者

生地三錢

淮山二錢

萸肉

丹皮

茯苓各一錢

澤瀉鹽水炒

側柏炒成炭研各一錢

水煎。○如嗽而痰少難出者乃係水竭於下液涸於上  
宜加天冬麥冬百合

天門冬丸 治涼

治吐血咯血大能潤肺止嗽

貝母三錢

天冬五錢

杏仁三錢

阿膠蛤粉炒五分

茯苓各二錢

五分

煉蜜爲丸如芡實大每噙化一丸津嚥下

生熟地黃湯涼

治酒色勞傷以致咯出之痰中有血絲者。

此方治鼻衄亦可

熟地

生地各三錢天冬

麥冬去心

貝母

杵

茯神各一錢茜根一錢

甘草六分

水煎○如有火加黃柏知母須自知謹慎不然必日甚

○○鼻衄列方

薑根湯涼

治衄血不止心神煩悶

生地二錢

阿膠蛤粉炒珠

薑根

側柏葉炒黑各一錢五分

甘草炙

加生薑二片煎

柏艾飲涼 治鼻衄

生地三錢 淮山二錢 蓮仁去心二錢 柏子仁去淨油

丹皮

黃肉各一錢

澤瀉五分

鹽水炒一錢

生荷葉一張

乾荷不效

加生艾葉搗汁半酒杯冲服○治法與吐血畧同凡加味  
地黃湯生熟地黃湯及鎮陰煎均可因症選服

茅根湯涼 治鼻血

白茅根一兩

側柏炒成炭二錢

水煎○或用生茅花更勝

地黃膏涼補 治衄血往來久不愈者

南京中医大图书馆版权所有

生地黃

熟地黃

枸杞子

川地骨

各八錢

其熬膏每服一匙蜜湯調下

○○舌血牙血列方

香薷飲散

治舌上出血如孔鑽者

香薷二錢

水濃煎服半茶杯外用槐花或蒲黃炒成炭研末摻之

蘿蔔方

治滿口牙內出血

生蘿蔔一個

用口嚼爛含少頃吐去即愈



竹茹醋 治牙齦出血

生竹茹 五錢無生用乾煩加陪

用醋浸一宿不時含之

荆槐散 治牙宣出血疼痛不止

槐花 荆芥穗

等分爲末搽患處

杞子湯 補 治滿口牙肉出血

枸杞子 四錢

水煎漱之然後吞下○以枸杞綑嚼吞下亦可



○○尿血列方

生地黃飲涼 治血熱小便出血

生地一錢 阿膠蛤粉炒珠 側柏葉各一錢五分

水煎

地黃赤茯散涼 治尿血

生地

赤茯苓

海螵蛸去硬皮

等分爲末每服三錢柏葉車前煎湯調下○此方血淋亦  
治如痛兼以藕汁蘿蔔汁調服

髮灰散和 治尿血及一切血症



南京中医药大学图书馆版权所有

亂髮 洗淨煅透成炭

研細末每服二錢米醋湯調下

珀珠散 微涼 治所溺之血成塊竅滯不利莖中急痛者○此症

因忍精不泄或年老竭慾而成

滑石 飛過 六錢 甘草末 琥珀末 各一錢 珍珠末 五分

加硃砂末五分合勻每服二錢白湯調下○如有熱尿澀以導赤散加牛膝鬱金清之利後仍服此散甚效○導赤散 麥冬生地木通甘草竹葉車前赤茯

○○大便下血列方



南京中医药大学图书馆版权所有